



58. f

19
C
28

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE ME=
DICA MATERIA
LIBRI SEX,
Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



HIS ACCESSIT, PRAETER
Pharmacorum simplicium catalo=
gum, copiosus omnium ferme
medelarũ siue curationum

Bibliotheca Index. *Conuentus*
S. Mariae *de Scala Roma*
Carmelit. *Discalceatorum.*

VENETIIS.
DOMINICVS LILIV
EXCVDEBAT.
M. D. L.



DISCORDS

OF THE



AND

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

NAENIA IN OBITU
RUELLII.

Cesserat è uiuis ad celsa Ruellius astra.

Constiteratq; alti clarus in arce patris:

Cùm perÿsse hominem rata Mors, ait, Ecce triÿphe

Clamet io, cuicui uictima grata cadit.

Vicimus, en nostras toties qui eluserat arteis,

Qui toties mortem uicerat, interÿt.

Ast ubi in ore uirum uersari auditq; uidetq; ,

Hunc magis atq; magis uiuere, uicta fremit.

Cui p.eam, quibus ortus erat mihi redditur astris,

Quemq; putas uictum, bina trophæa refert.

Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:

Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:

Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,

Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.

Cetera quid memorem uicturi scripta laboris,

Naturam & stirpes, pharmacaq; omne genus?

Non uillas, nec equos, nec curam diuitis agri,

Nullaq; uita hominis commoda præterÿt,

Quæ non tractarit, sapientibus edita Graijs,

Quæ non reddiderit, uel meliora suis.

Vtq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis

Amille haud quisquam tanti opus ingenij.

E P I T A P H I V M

Iodannis Ruellij, Diony=
sio Corronio au=
thore .

Hic situs est, in quo uiguit medicina, Ruellus:
In quo naturæ notitia, atque poli.
In quo prima fuit dos, Graium uertere scripta
In Latium, ac Latio scribere digna Ioue .
Olim erat affinis, nunc est conuiua deorum,
Præmiâque illa sui grata laboris habet.

3

PEDANI
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

libri primi præ-

fatio,

Ioanne RVELLIO Suefsionensi
interprete .



VANQVAM, amicissime
Aree, complures non ueterū mo-
do, sed recentiorum quoque, de
medicamentorum compositio-
ne, uiribus, atque probatione cō-
mentati sunt: nobis tamen nec
uanum, nec à ratione abhor-

rentem impe-
tū animi ad

hoc opus incessisse, tibi ostendere tentabimus: quòd
eorum nōnulli absolutum nihil ediderūt, alij quā-
plurima, quæ auditu percunctando didicerant, scri-
ptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas & He-
raclides Tarentinus, omissa prorsus herbarum tra-
ctatione, rem sanè quā paucis perstrinxerunt.
Neg; uerò omnes illi de metallicis quicquam rebus

DIOSCORIDIS

aut odoramentis memoria prodiderunt. Cratenas autem herbarius, & Andreas medicus, qui ceteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprimè utiles, herbasq; haudquaquā adnotatas, reliquerunt. Veruntamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiada omnes, medicinale materiam vernaculam cognitamq; vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mādaretur: & ut medicamentorum vires probationesq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemq; controuersiarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascētis in Italia, chamaeleæ succum esse contendit: androsæmonq; eandem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloë in Iudæa fossilem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euidentia, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine ydem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nullaq; conuentione coniunctas vireis collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes,

quò facilius memoria mandarentur, genera & eo Dioscorum effectus à sua cognatione disiungentes. Nos ue dis corò ab iuuentute, ut ita dicam, iuuenta iugi desiderio gnoscere cognoscendae materiae allecti, permultis regionibus, dorum peragratis (nec enim nescis nos militarem uitam simpli exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros cum st contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi dium. gratitudine obsequentes, ob eum, quo nos prosequeris, affectum. Etenim natura cum in omnes eruditione excultos, tum uerò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquantò peculiarius. Enimvero non parum praebet tuae probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter vos beneuolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in uerbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima visu ipsi exactissimè cognouimus: quaedam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percuratationeq; rerum apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differentia ab alijs ordine tradito, genera medicinarum uiresq; describantur. Quòd autem necessario sit me dicamentorū ratio, nemo est fermè qui ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta sit, vniuersisq; eius pars

DIOSCORIDIS

tibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quàm plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiã uernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verùm in primis curam impedere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur. certè pro horum ratione aut ualent uiribus, aut euanido nulloq; munere funguntur. Serena igitur cœli constitutio demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longè ualidiores intelliguntur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cæterisq; locis à uento silentibus enascuntur, plerunq; degenerant, & minus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec ante, opportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandũ, sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clemẽtia, maturius aut serius adollescere. Nõnulla propria ui, hyeme florèt, et folia parant: quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergētibus, adultis & senescentibus adesse. Nã qui pullulanti herbe dūtaxat

adstiterit, adultam cognoscere non potest: neq; qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiare notas, nonnulli, qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magna in errore uersentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinquefolium, & tusilaginem emittere florem, fructum et caulem negant. Ergo qui saepius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiam non conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis educare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae uerò fruticosa sunt, sicut stæchas, trixago, polium, abrotonum, seriphum, absynthium, hyssopum. & alia id genus semine praegnantia demetantur flores quoq; antea, quam sponte sua decendant. fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est. & semina, ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lacryma excipiantur, inciso per summum adolescentiae uigorem caule. Radices, & linguamenta, corticisue ut recondantur, eximere conuenit cum herbae suis folijs exuuntur. Sic cantur etiam expurgatae inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsitae,

DIOSCORIDIS

aqua elui debent. Flores & omnia quae iucundum odorem efflant. arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur: et lignea, praesertim è buxo: sed aenea vasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs, quae aceto, pice liquida, aut cedria cõponuntur. Adipè autè & medullas stagnæis vasis recõdi cõuenit.

Iris.

Cap. I.



IRIS à cœlestis arcus similitudine nomē accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, et pinguiora. Flores ī caule æqualibus inter se spatijs distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, * lutei, purpurei, aut

ε μη λιο
ι, nō με
αυα.

* cœrulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris speciei, quæ idam cœlestis arcus imago representari videtur. Radices solides subiacēt geniculate, * duræ, odoratæ: quæ frusta statim dissectæ, in vmbra siccantur, & traiectæ li-
no reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissimas, quæ pumila ferè et rēw, id densa constat radice, frangenti contumax, subru-
st, gu- fo colore, * gustu amaro, odore perquàm sincero, su fer- ita ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum tun-
entiore. ditur, sternutamenta mouet. Secundum locum har

bet Africana, candicans, gustuq; amara. Teredines in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excalfactoria, extenuans, contra tussim efficax: humorum qui a grè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentinum ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horribus, & quibus genitura effluit: menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earum, sceminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxand aq; in eis venarum spiracula. ischiadicis infunditur, fistulas, ac finus carne explet. Radices ex melle glâdis modo subditæ, partus extrahunt: quin etiam coctæ & illitæ, strumas, veteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant. nudata ossa corpore operiunt doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lêtigines et uitia cutis in facie à sole cōtracta emaculat: pessis, malagmatis, et acopis inferuntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

A N N O T A T I O.

Censetur Galanga officinarū. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam uulgus herbariorum hoc nomine solet indicare.

DIOSCORIDIS

Acorum.

Cap. I I.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo caespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: item torminibus, uulsi, ruptis: lienem absomit, urinae stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insistentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur, oculorum caligines succo discutit, antidotis radix magno usu commiscetur.

Meum.

Cap. I I I.

Meon, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, & anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quae feruesfacta ex aqua, uel trita citra coctionem, praclusorum renum uesicaeque; sarctae uitia potu leniunt, urinae difficultati medentur, stomachi inflationes discutunt. Torminibus, affectae uulvae, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in eclegmate auxiliantur, sanguinem

per menstrua pellunt, defectionibus seruefacta: in-
fantibus autem illita imo uentri, urinas mouent:
quod si plus quàm deceat ex his bibatur, caput do-
lore afficiunt.

Cypirus. Cap. IIII.

CYpirus, quem aliqui erysiceptrum, vt aspalan-
thum appellant, folia fert porraceis proxima,
sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubi-
talem aut maiorem angulosum, in cuius cacumine
minuta folia cum semine exoriuntur: ra- lices, qua-
rum in medicina est usus, coherentes inter se, oleis
oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauis
odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-
tis enascitur. Optima est grauissima, densa, fractu
contumax, plena & aspera, odoris cum quadam
acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, &
que à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis
inest. Venarum spiracula laxat, urinam ciet, ad cal-
culos aquamq; subter cutem utilissimè bibitur, ad-
uersus scorpionum ictus remedio est, perfrictioni-
bus vuluæ et præclusionibus fotu prodest, pellit mē-
ses. Contra ulcera oris etiam si depascent uorētq;,
farina eius efficax est. Malagmatis calfacientis-
bus, et unguentorum spissamenti bene adijci solet.
Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingibe-
ris effigie, quod manducatum croci uim reddit, gu-
stu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri-
tum exhibet.

DIOSCORIDIS

Cardamomum. Cap. V.

Cardamomum optimum est, quod est comagea
ne, Armenia, Bosphoróque deuehitur: in Indis
quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet plenum,
frangenti contumax, occlusum, sanctumq; (quod
enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gu-
stu acre, subamarum, & odore caput tentans. Ex
calfactoriam uim habet, potumque ex aqua facit
ad comitiales, ischiadicos, tusses, nervorum resolutio-
nem. Item ad rupta, uulsa, tormina: latas uentris ti-
neas excutit. Ex uino autem potum, renihus, diffi-
cultati urinae, à scorpione ictis, neq; non omnibus ue-
nenum uiibrantibus, auxilio est. Cum cortice radi-
cis lauri epota drachma calculos cōminuit, partus
suffitu enecat, scabiem ex aceto illitum adimit. Es-
ad unguentorum spissamenta additur.

Nardum. Cap. VI.

Duo nardi genera: unum Indicum, alterum Sy-
riacum appellatur, non quod in Syria proue-
niat, sed quod montis, in quo oritur, pars una ad
Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Sy-
riaci genere precipuum est recens & leue, largam
gerens comam, flauum colore, perquam odoratum,
ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore, lin-
guam siccante, quod diu in sua odoris gratia perma-
neat. Ex Indicis autem nardum quoddam Gangis
tis uocatur, à fluuio Gange, apud quem nasci-
tur, montem præterfluente: quod genus ob multam

loci, in quo prodit, uliginem, uiribus infirmius est, atque procerius adolescit, plures ferens spicas ab unica radice comosas, unaque conuolutas, ac grauius olentes. Montanum autem odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero uicino, ceteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum uirus supra modum redolente: quod improbat. Madefactum uendi solet: quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, * nulloq; puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua, aut palmeo uino, inspissationis ponderisque causa inspirato. Intueri autem oportet si lutum radicibus insideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim habent exca lfactoriam, & exiccantem. Vrinam mouent, aluum potu sistunt, vulue profluvia, sanienique apposita supprimunt. Nausee ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rofionibus, inflammationi, iocineri, regio morbo, renum uitijis. Aquae autem incoctae fotu ad infessum, vulue inflammacionibus medentur: ad glabras oculorum genas ualent: si quidem eas ad densiorem pilum reducunt. persusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in fictili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

* καὶ μὲν
ἐχέει το
χρόνῳ, ἰ
ἐστὶν, &
quod m
tina ca
reat la
nugine.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, salumca patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suauitas: unde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidē utile, cum aceroso, alienoq; propter humoris uim, nō excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus uocatur, ab odoris gravitate, sed facilis cognitio: nāq; herba cādidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neq; odorata, uti uerum nardum est. Itaque radices, atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum pollet: sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos iclus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

Montanum nardum. Cap. VIII.

Montanum nardum, quod ab aliquibus thylacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, furculo & folijs eryngis similibus, minoribus, minimè tamè spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulae regiae, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florè profert. Ad eadem, ad quæ Celticum, efficax.

ANNOTATIO.

* Minoribus. } Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendum suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, minoribus habet quod sanè utrunque herbae, quàm aptissimè quadrat.

* Cyrino hyoscyami. } Id est, flori hyoscyami, qui ueri cyrini, quem domesticæ punicae florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, ut in eius descriptione auctor est Dioscorides.

Asarum.

Cap. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ folijs & minoribus multò, rotundioribusq;, fluribus & cyrino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicè emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. } Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles } radices numerosas, geniculatas, te Græco.

DIOSCORIDIS

nues, obliquas, gramine non dissimiles, longe tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, & quæ linguam uehementer mordent. Excalfactoriam uim habet: urinam cit, hydropicis & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsæ potæ, menses trahunt, & ueratri albi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosiss montibus provenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia. Illyrico, & Italia Iustinienfi agro.

A N N O T A T I O.

* Maioribus } Rectius forte minoribus legas, ut Ruellius quoque monuit. Flores siquidē Valerianæ nūc dictæ, quam Phu esse omnes ferè suspicantur, Narcissum esse figie expressissime quidem referunt, eo tamen longe sunt minores: ni fortè soli diuersitati id imputandum censeas.

Phu.

Cap. X.

* Hippo
selini.

P Hu, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio * colusatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcissi proximis, * maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius addigiti minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa in nigri ueratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescentibus, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum emul-

lantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca pos-
tui detur. Decoctum eadem præstare potest, ad la-
teris etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis in-
seritur. Adulteratur radice rusci ammissa: sed ma-
lescium deprehenditur quoniam hæc dura est, &
frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Malabathrum. Cap. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indici
nardi folium, falsi quadam odoris cognat-
ione: per multa enim nardum olent, quemadmo-
dum plu, asarum, niris. secus autem res se habet.
Næque malabathrum folium, sui generis est, quod
Indice gignunt paludes, lentis palustris modo inna-
tans aquis, sine radice. Id collectum statim lino
transsuatur, & siccatum reconditur. Tradunt sic-
catis æstiuo feruore, aquis, humum aridis frutici-
bus uri: quo ubi non euenerit, ne amplius quidem
renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, in-
tegrum, nec fragile odore caput feriens, quod diu in
sua ui odore permaneat, et nardū sapore imitetur,
nullo salis gustu. Infirnum uerò & minutim con-
tusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum
est. Easdem nardo sortitur uires, sed efficacius om-
nia præstat. Urinam uehementius ciet, ac stomacho
magis prodest malabathri uis. Lippitudinibus, in-
flamationibusq; tritū et in uino feruesactum cōmo-
dè illinitur: subditū linguae, oris halitū et suauitatē
commendat. Vestium quoque odorem interpositum

DIOSCORIDIS

seruat, & ab erosione tuetur.

A N N O T A T I O.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Cassia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs ueteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Cassia.

Cap. XII.

Cassia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris coralli amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordēs & * cum aliquanto seruore adstringens, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasto, id est germi-

* μετὰ
πολλῆς
id est, cum
multo.

* Græ- cognomen est. Reliquæ uiles, & quæ * aphemum dicitur, asy- phemon. quæ darca, & citto uocitatur barbaro nomine. Similior, huic est pseudocassia, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candidas,

scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet cal faciendi, urinæ nam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstanda claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lætigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra uiperarum ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflammationes omneis et renum uitia, pota proficit. Fœminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem uulvæ. Ea duplo pendere medicamentis mista, cinnamomi uicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

Cinnamomum. Cap. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uiridioso in cinereum uergens, leue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olēs, Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cū optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadatenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut fricāti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculum. facilius est huiusmodi probatio: namque fragmenta miscel

DIOSCORIDIS

lancea quedam esse videntur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur. olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam suauiter olet. nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, candidans. aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè representat. Quintum genus, odore nares feriens, subrusum & cortice fulvæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus nervosum, densa radice firmatum. his quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suavitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicem, ut inutile reijcito. Est etiam unum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris, solutarumq; virium. Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, præbens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit, et concoquit, urinam ciet. tam menses, quam partus potum aut ex myrrha impositum pellit, contra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaq; conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit.

crassitiem extenuat, lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tussēs, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum uitia, & urine difficultatem efficax est, unguentis pretiosis inseri solet: & in summa, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbraque siccatum, quo diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod alii qui pseudocinnamomum appellant, perquam denso atque crasso sarmento, longe tamen invalidius cinnamomo, & odore, & gustu.]

Desunt
in Graeco.

Amomum. Cap. XIII.

Amomum exigue fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum, flore, ceu candide uioleae, paruo: folijs & uitis albae similibus. Laudatur quam maxime Aemeniacum, & fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus, & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uero subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum uel subrubrum, quod nec adstrictum cohaereat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur: seminis plenum, uuis paruis simile, graue, ualde odoratum, modo cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnum al-

* bryonia.

* Χουοις
ἔσ τῇ
χρῶα, id
est, colore
aurei
imitans.

DIOSCORIDIS

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflā-
 mationes, & meliceidas concoquit, discutitq; : iu-
 uat quos scorpis percussit, ex ocimo illitum, & po-
 dagricis oonfert, inflammationes oculorum, uisce-
 rumq; lenit ex uua passa, ad uuluarum uitia in pes-
 sis, aut in sefionibus utile est. Decoctum iocineri, re-
 nibus, podagra, potu cōuenit. Antidotis immiscetur,
 & pretiosissimis unguentis. Adulteratur amomū
 herba simili, que amomis uocatur, sed sine odore, si-
 ne fructu. Nasctur in Armenia flore origani. Qua-
 re in huiusmodi probationibus fragmenta fugien-
 da sunt: eligēda autem, que ab una radice integros
 furculos emittunt.

Costus.

Cap. XV.

PRacellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odo-
 ris suauitate. Secundum locum sibi uēdicat In-
 dicus, leuis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriac-
 us, grauis, colore buxeus, et odore feriens, Optimus
 est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à te-
 redinibus non erosus, sine graueolentia, gustu caliz-
 dus ac mordens. Vis ei excafactoria: urinam ciet,
 menses pellit, uitijs que uulnam malè habent, tam
 impositu quàm fotu & fuffitu auxiliatur. Contra
 uiperarum morsus sextantem bibere prodest: item
 aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex
 uino & absynthio. uenerem ex mulso stimulat, la-
 tas uentris tineas ex aqua pellit, horroribus ex oleo,

ante febrim accessiones, & nervorum resolutionibus oblitur: vitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. Sūt qui admittis helenij comageni præderis radicibus, adulterēt, quod deprehensu facile est: si quidem neque gustu feruet helenium, neque ualidū odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Odoratus iuncus. Cap. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathea, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij tuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rose odorem emit, ignee mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Vim urina ciunde habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggranat, modicè adstringit, comminuit, excoquit, ac uenarū spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum miscetur antidotis. Radix adstringētiore est, ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, draohma una cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uulue inflammationibus, ad desidentium fetus, utile est.

Officin
squina
tum.

Calamus odoratus Cap. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur: melior est sulcus, dense geniculatus, & qui

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet: quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter cuem fusa morbo, renum vitij stillicidio vrinæ, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffusionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. Cap. XVIII.

* Mar-
cello lo-
cus hic
suspe-
ctus.

Balsamum, arbor, & albæ violæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium rutæ proximum longe candidius, perpetuò virens: in ludæa solum quadam valle & Aegypto nascens, his differens modis: scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristiæ vocant, quasi demessibile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestius sub ortu Canis arboribus, arboribus vnguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tantæ exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quam semi septemue congi cogantur, inibiq; pòdus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, levis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè utiatur, misto ab aliquibus

terebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: item sus-
 no, metopio, melle aut Cypria ceraliquida. quod
 maleficiū facile deprehenditur. Nāque merus in
 laneam uestem fusus, neque maculam facit, neque
 si eluatur notam relinquit: vitiatu autem inheret,
 & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non
 efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celer-
 rimè liquatur, coloreq; lactescit: vitiatu verò olei
 modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum
 diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq;
 redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pes-
 sum ire, & ad ima sidere arbitrantur, postea dissi-
 patum supernatare. E ligni genere, quod xylobalsa-
 mum vocant, probatur recens, sarmento tenui, foliū
 odoratum, quadātenus opobalsamum spirās. Ne-
 cessarius etiam seminis erumpit vsus, quare eligas-
 tur flauum, plenum, grande, pomerosum, mordens
 gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens.
 Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra
 oppilo defertur. Sed coarguitur magnitudine, inas-
 nitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissi-
 ma vis inest succo, & quā maximè calfaciens:
 abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offun-
 dunt, medetur perfrictionibus vuluæ cum rosa-
 ceo cerato appositus: menses quoque, secundas
 & partus extrahit, horrores illitu discutit, vl-
 cera sordida expurgat: & cruda concoquit. vri-
 nam potu ciet, egre spirantibus prodest: datur

DIOSCORIDIS

in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidotis.
In summa, precipua autoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semen commodè potui datur
doloribus lateris, pulmonum vitijs, tussi, ischiadicis,
comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae diffi-
cultati, torminibus ac serpentum moribus: ad ma-
liebres suffitus perquā utile est: uulnam aperit in de-
fessionibus balnearum decoctum, & humorem euo-
cat. Lignum easdem habet vires, aliquātò minores.
Ex aqua potum cruditatibus, torminosiss, uulsis. ue-
nenatorum ictibus opitulatur, urinā cit, ad capitis
uulnera cum sicca iri conuenit, squammas ossium
extrahit, & ad unguentorum spissamēta additur.

Aspalathus. Cap. X I X.

ἡ ἀλκὴν
id est, li-
gnosus.**A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est
surculosus, multis spinis horrens, nascitur in
Istrio, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad
unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur.
Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in
purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu ama-
rus. Est & alterum genus candidum, lignosum, si-
ne odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cū
adstrictione obtinet. unde decoctum cum uino ad te-
tra oris ulcera colluenda conuenit, ad nomas geni-
tium, & sordida ulcera infunditur, subiectum in
pesso, partum extrahit, aluum sistit eius decoctum:
& sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae diffi-

cultatem inflationesq; discutit.

Musculus.

Cap. XX.

Bryon, id est musculus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, et quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populeum: in quo genere candidum et odoratius prestat, nigricans improbatur. Adstringendi uim habet. Decoctum insidentium uulnus utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur, thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Agallochum.

Cap. XXI.

Agallochum. lignum est, quod ex India atque Arabia deportatur, thugie ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens, cum quadam amaritudine, cute uerius quam cortice uestitur, aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto oscollitur, commendandi halitus gratia. Sudores arceat toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia, & imbecillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisue dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Putatur
lignum
aloes offi-
cinari.

Narcaphthum.

Cap. XXII.

Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile sycomori libro: quod iucundi odoris gratia sufficitur. Miscetur thymiamatis com-

DIOSCORIDIS

positis: constrictiōibus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. Cap. XXIII.

Videtur **C** Ancamum Arabici ligni lacryma est, myrrha quibus = Quodammodo similis, virosi gustus, quam ad dā Lac = suffimenta usurpant. Vestes eo, additis styrace & ca officii = myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere exte- narum. nuandis obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto, plusculos dies ebibatur: lie- nosis datur, comitialibus, & suspiriosis. menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confe- stim emendat, uino madefactum medetur eorum- dem hebetudinibus, aduersus gingiuas humore præ gnanteis, doloresq; dentium, nō aliud efficacius.

Cyphi. Cap. XXIII.

C Yphi odorati suffimenti compositio est, dicata dūs, qua abunde Aegyptij sacerdotes utun- tur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Per multa componendi rationes, qua- rum una hæc est: Sumito cyperi dimidium sexta- rium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: vuæ passe pinguis, exemptis uinaceis, minas duos decim resine repurgatæ minas quinque: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrha duodecim: uini ueteris sexta- rios nouem, cum duabus mellis minis: vuam pas- sam detractis uinaceis tufam, cum uino & myr- rha subigito: cetera tusa & cribrata adijcito, die uno humorem combibere finito, dein mel coquito

dum sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatā resinam accuratē permisceto cum reliquis diligenter contritis, & inficibile vas recondito.

Crocum.

Cap. XXV.

CRocum, optimum in medendi usu Coryceum. Recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum à quo detractum est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm, redoleat, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis nō est, aut uetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ cōtermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinum inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sæpe subtilitus: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficium declarat insidens pulvis, præsertim si desutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse uoluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habes: urinam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passo

biberint, crapulam nō sentient: oculorum fluxiones illitū cum humano lacte, cohibet: additur in positiones, quæ interancorum causa temperatur: ad uulue etiam sedisq; cataplasmata, utiliter inditur: uenerem stimulat, uergentes ad ignem sacrum inflā- mationes mulcet, auricularijs collectionibus utile.

Quō facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomag-

*Re= ma uocant. Optimum est odoratum, modicè myr-
 Etius rham olens, graue, nigrum, ligni expers, laue, suba-
 Marcel = marum, quod madefactum croci colorem reddit, gu-
 lus ali = statumq; uehementer dentes, ac linguam inficit, &
 quot ho = multis durans annis, quale est quod à Syria defer-
 ras per = tur. Habet suas uires ad delenda quæ caliginem oculi
 manente lis obuersant: urinam cit, calfacit, concoquit, &
 colore. emollit. uires croci proportionē quadam tenus repræ-
 Vulgò sentat, quandoquidem plurimam croci partem sibi
 Enula crocomagma uendicat.

cāpana. Helenium. Cap. XXVI.

* & o'gu
 ci, xai
 H Elenium folia habet uerbasci angustioris for-
 lly, asperiora, oblonga, caulem quibusdam in-
 ariis, id locis non emittit, radicem subalbidam, interdum
 est, in subrusam, odoratam, subacrem, uegetam, ma-
 montosis gnā, ex qua agnatæ propagines liliorum aut ari-
 ac opa = modo seruntur. * Montibus in umbrosis, siccoq; so-
 cis. lo prouenit. Foditur æstate radix, particula-
 timq;

timq; dissecta siccatur. Potum radice decoctum mē-
ses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex melle pro-
dest tussi, orthopneæ, ruptis, conuulsis, inflationibus
& serpentium moribus. In summa excalfaciens.
Folia ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur.
Helenium Stomacho vtile in passo conditum: si qui-
dem salgamarij paululum siccata radice, mox
decoctam, et frigida aqua madesactam, in sapam
coniiciunt, & ad vsus recondunt. Trita potaq; ad
cruentas excreationes efficax est. Alterum helenij
genus in Aegypto gigni Crateuas tradit: herba est
cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repē-
tibus, folijs lenticule circa ramos, sed longioribus cre-
brisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per
ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nasceitur
in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota,
contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleum. Cap. XXVII.

Oleum, quod ex immaturis oliuis exprimitur,
ad multos vsus rectè valentibus accommoda-
tissimum: omphacinum id appellatur. Prestat recēs
odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum
compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vti-
le est, quod adstringat: gingiuas contrahit, dentes
firmat, si contineatur in ore, sudores cohibet, et quò
vetustius ac pinguius, eò ad medicamenta aptius
est. Et (vt reliqua in commune dicantur) omne oleū

pus tuetur, ipsūque promptius ad obeunda munera reddit, aluum emollit, vlcera venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, assidue potum redditumque vomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisanæ succo aut aqua potum, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, ventris animalia pellit idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si vetusti non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut vetustatem representet.

Oleum sylvestris oliuæ. Cap. XXVIII.

Oleum, quod sylvestres oliuæ fundunt, uehementer adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, fursures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit: tardius cautionē sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec amiculo ueustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centio heminarum mensura, & sub solem mediæ quaque die concha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidue deuolutione, ictūque agitatam respumet: octaua die fornū græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madesactum donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ue-

extrillet aqua: postea teile præpinguis piceæ, assulati-
tim cese æquale pondus adicitur, & transactis
oëto diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem
contraxerit, in uas nouum netere uino affusum re-
condi debet, substratis sertule campanæ corollis
drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pō-
dere sin minus, rursus Soli mandandum, & idem
munus obeundum, usque dum inalbescat.

Sicyonium. Cap. XXIX.

Sicyonij componendi ratio hæc est: In lebetem
oris lati stamio inductum, funditur olei albi
quod crude oliuæ reddiderunt, congius unus,
aque semicongius: leui id igne coquitur, leuiter mo-
uendo: at ubi bis efferbuit, & subtracto igne refri-
xit, innatans oleum concha decapulatur, et adiecta
noua aqua conseruescit, et reliquis, ut diximus, per-
actis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit,
Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactoriam ad
quendam usque modum uim habet. Febri ac nervo-
rum uitijs prodest. fæminæ ad commendandum fa-
ciei nitorem eo utuntur.

Strigmenta balneorum. Cap. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt,
discutiunt: ad sedis rimas & condylomata
illuminantur. Alla uero que ex palestris puluerē
sibi ascinerunt, in sordis speciem reducta, articulorū
no. los imposita adiuant: ischiadicis in fotus aut
malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.

DIOSCORIDIS

Deraſe gymnaſiorum parietibus ſimulacruſq; ſordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad coctionem perducuntur, diſſipant: deſquammatiſ et vlceribus ſenum proſunt.

Elæomeli.

Cap. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, oleum melle craſſius, ſapore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, ſextario cū vna aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcunt & viribus deſiciuntur: quod minime vereri oportet, verum crebro excitare, ne veterno preſſi ſomnos capient. Fit & oleum è pinguitudinè ſurculorum oleæ optimum vetuſ, craſſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorū illinitur: lepras, neruorumq; dolores illitum emēdat.

Cicinum oleum.

Cap. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi ricini, qua voles quantitate, torrido ſole flacceſcunt, & vuarum more inſtrati tantisper inſolantur, dum veſtiens cortex fractus decidat. Caro colligitur. & coniecta in pilam diligenter tunditur poſtea in lebetem ſtanno illito, qui aquam habeat, demittitur, ſubiectoq; igni ferueſcunt: & vbi inſitum prorſus humorem reddiderunt, ſublato ab igni vaſe, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, vbi largior increbuit uſus, longè ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ricinos male mandant, & accurate molitos per ſportulam tor-

talo exprimunt. Tum quidem ematurauerunt ris-
 cini, cum continentibus orbiculis exiuntur. Ad
 psoras, & vlcera capitis manantia valet. pro-
 dest sedis inflammationibus, vuluis conuersis at-
 que præclisis: item indecoris cicatricibus, & au-
 rium doloribus: emplastra efficaciora reddit ad-
 ditum, potu aquam aluo extrahit, ventris animae
 lia pellit.

Amygdalinum. Cap. XXXIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium
 vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nu-
 cibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo le-
 niter tunditur in offas, aquae, quae ferbuerit, sexta-
 rius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hau-
 serit, vehementius quam antea tunditur, mox tabel-
 lis premitur, & quod digitis haesit, concha excipi-
 tur. Pressis nucibus rursum hemina aquae insper-
 gitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequen-
 dum. Singulas heminas reddunt singuli modij.
 Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersio-
 nes, & eorundem locorum inflammationes efficax
 est: vrys renum, calculosis, difficili vrinae, suspiriosis,
 lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem audi-
 tus, sonos incertos, timitusq; discutit: maculas &
 vitia cutis tollit e facie, & eam erugat cum melle,
 radice lilij & Cyprii cera aut rosaceo cerato, &
 oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis ma-
 nantia & fursures cum vino abstergit.

DIOSCORIDIS

Balaninum.

Cap. XXXIII.

Simili modo fit balaninum oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Aluum soluit, Stomacho aduersatur,
contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio
est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesami
in ratio. Fit etiam e nuce iuglandis oleum, quod caryi-
num vocant. Eandem vim habet quam balaninum.

Hyoscyaminum.

Cap. XXXV.

Huoscyaminum sic fit: Semen candidum,
recens ac siccum tunditur, et calida asper-
gitur aqua, ut in amygdalino diximus.
dumque insolatur, siccatur, quae sub manu sunt, partes
cum reliqua massa permisceantur: hoc in ante fieri
oportet dum nigrescat & grauius oleat: mox pres-
sum atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores
efficax est, pestis miscetur, ad emolliendum utile. Fit
& e grano gnidio purgato & tuso. Vis ei aluum
soluere potius. Non secus cucinum oleum temperatur:
cui facultas eadem est, quae facto e gnidio grano,
verum inualidior. Rhabdanthum e raphani semine
fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala vale-
tudine contractas tollit, scabritias entis in facie eme-
dat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem
quod rhabdanthum potest. Tritum sinapis semen,
& calida aqua madefactum, adiecto postea oleo
exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est, trans-
fert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Myrtei faciendi ratio hæc est: E myrto nigra syluestri, aut satina, foliorū mollißima quæq; tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carbonibus inferuescūt, donec concoquantur, innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio: Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum. Adstringit & indurat, ideò medicamentis misceetur, quæ cicatricem obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularū eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores compescit, & omnia quæ adstrictionem inspissationemq; desiderant.

Laurum fit hoc modo: Lauri bacce cum mature sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinē reddunt, quæ manibus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquunt alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit, alij styracem & myrtum addunt.

DIOSCORIDIS

Optima laurus ad id latifolia & mōtana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quoque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei. excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus neruorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuuantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. Cap. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, vt in laurino diximus. Hoc scabiem iumentorum canumq; sanat: vtilissimum pessis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinū fieri solet, quod refrigerat & adstringit.

Mastichinum. Cap. XXXIX.

Mastichinum è trita sit mastiche, quod contra omnia vulue mala efficax est: mediocriter calfacit, adstringit, & emollit, Aduersus prominentes Stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, et colorem nitidum facit. optimū in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. Cap. XL.

DE ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidem ea in nonnullis corporum vitijs, aut medicamentis mixta, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt: in quorum probationibus consule

re naves oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur odore cæteris prævalentia: vt in amaracino & crocino, teüno, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Rosaceum. Cap. XLI.

Rosaceum sic fit: Iunci odorati quinque libras & bessēm tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincunce subinde mouendo, coquito, dumq; percolaueris, in olei libras viginti & quincuncem, adijcito rosas non madesactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, interdiu premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & vbi recrementum pessum ierit, mutato vase, in craterem melle illitum recõdito. Cæterum rosas, quæ antea presse fuerunt, in labellum demitto, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsque, quartasue persusiones insundens exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium: & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si vero secundum infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle præmadesactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto simili modo exprimens facito, totiesq; recentis roseis detractis unguibus im-

DIOSCORIDIS

mittito: fiet enim ita oleum multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detrahitis unguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosæ quæ selibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut assalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anthusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim adstringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet & mulcet, quæ cacoethe vocantur: ulceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficax est, ad lacescita interanea & concitatas vulvas utilissimè subijcitur.

Elatinum.

Cap. XLIII.

FRACTA elate tusa et scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent utriusque portiones, dein mūdo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: aluum tamen non mollit.

Melinum hoc modo temperatur: Olei congius decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijcitur elatæ pulmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquantur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetusta tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper imbi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decem dierum spatio operimentis inuolunt, vt contineatur odoris suauitas, nec evanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Ad vim refrigeratorem & adstringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quæ serpūt, ac fursures, perniunculosq; effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur, citatam vrinam sistit infusum, sudores cohibet, cōtra cantharidas, buprestim, puorū erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Oenanthini compositio.

Cap. XLV.

Oenanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluitaq;: et cū biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Adstringit proximum rosaceo effectum præbens: sed alium non r. soluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore oenanthem refert.

DIOSCORIDIS
Telini componendi ratio.

Cap. XLVI.

Foenigræci libræ quinque, calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris nouē, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Alioqui pro calamo cardamomum substituunt, et cypiri loco xylobalsamum macerāt. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, omnibus vuluarum duritijs magis conuenit, fœminis difficile parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenasmo subditum prædest, vlcera capitis manantia fursuresque expurgat, ambustis, et pernionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod non uehementer fœnigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum indicatur.

Sampsuchini compositio.

Cap. XLVII.

SErpylli, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrij, frondium myrti, sampsuchi singule portiones, quædam pro viribus ipsorum coniectatione, una tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euincat: hæc post quatrimum exprimuntur. Denuo noua alia, simili mensura, &

æquali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones cōuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, uluæ strāgulatus recreat, lumborum inguinumq; dolores lenit: sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, vulsorumq; cataplasmata utilissimè additur.

Ocimini compositio. Cap. XLVIII.

Ocimum oleum fit ut cyprinum: Ocini folia decerpta librarum undecim, & beßis pondo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito,colato: cumq; exhausseris quallum, rursus parem olei modum fundito, exprimito, Vocatur autem id secundarium: nam terciæ perfusionis nō est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tāto temporis spatium maduerit, exprimitur, et oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper per ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio. Cap. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorū abrotoni libras octo die no

Et uq; madefactas premito. Quod si in longum tempus oleum velis asservari, eiectionis prioribus solijs, nonna appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vulvae duritias preclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. Cap. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim et besssem, maceratas in oleo die una, manibus premito & recõdito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vulvarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Susinum. Cap. LI.

Susinum, quod alij lilinum appellant, sic temperatur: Olei libræ novem cum quincunce, calami libræ quinq; & quadrans, myrrha vncie quinq;, permisto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & celesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq;: tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur: mille lilia decerptis solijs, in latum, non tamen profundum, labelum demittuntur: iniectionum oleum, manibus melle perunctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressi fuerat, coto incerni oportet. (non enim, ut rosaceum, moram to-

lerat: nam concalsactum feruet & computrescit: quare saepius decapulandum) vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes vasis faucibus hesit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum trās fuis, rursus olei prius odoribus imbuendi, quod primū pondus aequet, & cardamomi tusi drachmæ decem coniunguntur. Hæc manibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertiò eadē infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madesactis. Lōgè optimū erit, quod prius exprimitur: secundum, quod sequitur: tertium locū sibi vendicat, quod nouissimū prodit: Denuò in mille lilia euulsis folijs expressum primò oleum infunditur: tum eadem ratione proseguendum, idemq; faciendum, vt prius, addito cardamomo, dein expresso: & quò frequētius recentia lilia maceraueris, eò validius vnguentum efficies. Deniq; cum factum abundè videbitur, singulis compositionibus miscere cōuenit myrrhæ quàm optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta: croci vero & ciuamomi pares portiones tūduntur, et cribrate in lutrā cū aqua demittuntur, expressūq; primò vnguentū infunditur, et paulo post excijūtur vasculis siccis, myrrha aut gummi antea per fuis, et croco, melle et aqua madesactis. Eadē fuit in altera aut tertia exp̃ssione. Aliqui simplex ex balanino, aliōne oleo, et lilijis cōponunt.

Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit vulvæ præclusiones, & collectiones, aperit, vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emendat: vibices cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluū extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum.

Cap. LII.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ aspalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncis quinque assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur. quo exempto, calamus quinque libris, & bessa adijcitur, cum myrrha gleba contunditur, cribrataq; ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum q̄s efferverit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellū mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniunguntur, quibidui spatium (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapuladum, si quidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vulvæ duritias, præclusionesque sed capitis dolores facit.

Crocium.

Cap. LIII.

Crocium componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus,

deribus, & mensuris: cuius olei libras treis & semissem, croci vnciam vnā assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die, quā hoc assiduo peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adijcito, moue triduo, dein contuse myrrhe atque cribrata drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitatum recondito. Alioqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abunde crocum spirat, in medendi vsu expetitur. Proximum, quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit, quare persepe phreniticis subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, ulcera purgat, contra vuluæ duritias atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit enim, emolli, humectat, & permulcet: ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem proportionē respondent butyrum, onychinum & styracinum: quæ & si nominibus distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum. Cap. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aque celestis tantundem cum semisse, cuius vna parte oleū diluitur, altera adijciendis odorametis admiscetur: dein assumptis assalathi libris quinque, & semisse, calami libris sex, & semisse, myrrhe libra vna, cardamomi libris tribus, & dodrante, olei libris no-

DIOSCORIDIS

uem, & vncijs quinque. Aspalathus tusus, et aqua
affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myr-
rrha autem vno vetere odorifero subacta, cōtusūq;
simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempta
aspalatho immittuntur. & vbi efferbuerint subla-
to atheno, oleum percolatur. Cardamomum tussum
reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agita-
tur, nulla, dum refrigerit, interpellatione. Posthæc co-
lato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri,
quod cyprum vocant, sex & quadraginta libra cū
bessè instillantur, quæ sufficienter madefactæ per
sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desidere-
tur, idem recentium florum pondus iniectum simili-
modo prematur: & iterum aut tertio si quis velit,
madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eli-
gi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares
feriat. Aliqui cinnamomum addūt. Calscit, emol-
lit, ora venarum adaperit, vuluæ neruorumq; vitijs
conuenit, pleuriticis, fractisq; per se vel cerato im-
mistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotoni-
cis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinū
opitulantur. item in acopa adiicitur.

Iri spissamentum. Cap. LV.

Spathe quàm minutissimè contusæ sex libras cū
bessè, in tribus & septuaginta libris & quin-
cunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis
incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulā
melle oblitācolato: ex eo aromatibus imbuto oleo,

irinum primò temperatur, iride ex oleo inspissato
 macerata, vt scripsimus. Sed alia est componēdi ra-
 tio: In olei septuaginta libris & quincunce, xylo-
 balsami (vt dictum est) contusi, libras quinque &
 sextantem excoquito, postea detractc xylobalsamo
 nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhe
 glebam vetere vino odorato perfusam, et in olei ita
 odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tuse
 iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenue
 & vehementer dstringito. Quòd si vis validius fie-
 ri, par pòdus iterum ac tertio similiter maceratum
 exprimito. Lōgè optimum est, quod solam irin olet,
 quale est in Perga Pamphylie, et Elide Achaie na-
 tum. Vim habet calfactoriam atque emollientem,
 crustas adimit, sordida vltera & putrida purgat:
 confert fœminis vulue causarijs: item inflamma-
 tionibus eiusdem atq; præclusionibus, partus eijcit,
 hæmorrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex
 acceto, ruta et amaris nucibus prodest: diuturnis de-
 stillationibus, naribus illitum, & contra graueolen-
 tia earum vlcera, quas oxenas vocant, auxiliatur:
 aluum purgat cyathus epotus, facit ad ilei crucia-
 tus, vrinam mouet, difficileis vomitiones adiuvat,
 perunctis eo digitis & immisis, vel ijs quæ ad vo-
 mitum ciendū induntur: angine etiam illinitur, aut
 ex aqua mulsa gargarizatur: item contra arterie
 scabritiam. datur etiā ijs, qui cicutam, coriandrū,
 aut venena fungorum hauserunt.

DIOSCORIDIS

Gleucinum Cap. LVI.

Gleucinū absolute constat orphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celticanardo, spatha, aspalatho, sertula campana, costo, & musto: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & neruorum vulnēq; vitij auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

Amaracinum. Cap. LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyxico fieri solet ex omphacino & balanino, spissimè est ex xylobalsamo, iunco odorato, et calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassie, carposbalsami et myrrhæ odoribus. Aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & uinū assumuntur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quā vtile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, et tetra vlcera, quæ theriōmata vocāt, rumpit: difficili vrinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vulue subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vulue tutores discutit, vulneratis neruis, & muscu

lis confert, laneo centunculo modicè madefactum
& impositum.

Megalinum. Cap. LVIII.

FActitabatur olim megalinum, sed nūc composi-
tio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad
historiæ complementum meminisse non fuit alienū.
Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exi-
perabat, hac tantū ratione differens. Quare leni-
ter mollit. Resina vnguentis, neque tutelæ neq; volu-
ptatis gratia alijcitur, sed coloris crassamētiq; cau-
sa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius
coquendæ ratio declarabitur, dum de resina disse-
remus.

Hedychroum. Cap. LIX.

Quod hedychroum vocāt, in Co fieri solet: eisde
preditum viribus & misturis, quibus ama-
racinum, sed suauius spirat.

Metropium. Cap. LX.

Est in Aegypto vnguentum, quod metopion pa-
trio nomine appellatur, propter galbani mistio-
nem: nam lignum, in quo galbanum nascitur, me-
topion vocant. Constat amaris nucibus, omphacino
oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino,
myrrha, balsami semine, galbano & resina. Proba-
tur pingue, graui odore, quod magis cardamomum
& myrrham, quàm galbanum respiciat. Calfacit
vehementer, & adurit, atque extrahit, ora venarū
aperit, vlcerā purgat, extrahitq;: ad præcisos ner-

DIOSCORIDIS

uos, & muscalos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inferitur, horribus, conuulsisq; , præsertim quibus ceruix in scapulas diiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur: sulores ciet, vulue spiracula recludit, & eiusdē duritias laxat: in summa, molliendi naturam habet.

Mendesium. Cap. LXI.

MEndesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. A iqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Staete. Cap. LXII.

STaete vocatur pinguitudo recētis myrrhæ cum exigua aqua tusa, & organo expressa. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentū per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur, quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio cōpos est viriū plurimarū. Vim calfactoria myrrhæ et calidis vnguentis respōdentē habet.

Cinnamominum. Cap. LXIII.

Cinnamominum confit ē balanino oleo, & xylō balsami, calami, iunci odorati spissamētis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudatur non

acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit. resina enim neque amaritudinem præbet, neque ullam odoris gratiam adijcit. Vim habet admodum acrem, amarâ, & calfacientem. Itaq; ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus. attrahit, caput aggrauat, cōtra vulue vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonia exolescit, & quadam emolliendi vis contrahitur. alioqui adurit, et præ omnibus crassis vnguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas & vlcera, quæ putredinis vitium senserūt. item ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores, tremores, gangrenasq; cum cardamomo: aduersus serpētium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. Cap. LXIIII.

Ratio nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunque autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aride aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam

DIOSCORIDIS

simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo
& nardo.

Malabathrinum. Cap. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini habet,
in super myrrha plusculum additur: qua de
causa calfacit, crocino aut amaracino viribus re-
spondens.

Iasminum. Cap. LXVI.

Apuđ Persas fit, quod iasmini cognominatur,
ex albis floribus vlolæ: quorum sextās in Ita-
licum sextarium sesamini olei demittitur, violis, vt
in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas
inter epulandum vsurpatur odoris causa. Nam toti
corpori cōuenit, præsertim cū in balneas descensum
est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionē,
laxationemq; desiderāt: grauius enim spirat, quā-
m vt libenter a plerisque recipiatur.

Myrrha. Cap. LXVII.

Myrtha lacryma est arboris, quæ in Arabia
gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: e cu-
ius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes,
alia circum caudicem contrescit. Dicitur ex his ali-
qua pediasimos præpinguis, quæ expressa, statte
emittitur. Alia gabirea pinguißima, leto & pingui
solo nascens, ea copiosam sudat stattem. Omnium
prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto co-
gnomine a loco, in quo prouenit: splendens, subuiri-
dis, ac mordēs. Quinetiam legitur tenuis quedam,

quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mol-
 lis, verum odore grauiuscula, apicis nascens. Alia
 caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra,
 & retorrída. Omnium deterrima, quæ ergasio-
 ma dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris,
 ad gummi imaginem vergens, & viribus eius pro-
 xima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pas-
 stilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è sic-
 cioribus haudquaquam pingues, & inodorati: mi-
 nus odore pollet, quæ olcum non admisit, cum in pa-
 stillos digerebatur. adulteratur macerato gummi
 aqua, in qua myrrha maduerit. Eligendæ est reces,
 squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confra-
 cta venas vnguium modo candidas & leues osten-
 dat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciēs:
 superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei.
 Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur,
 adstringit, vuluam emollit, & præclusum aperit:
 menses & partus celeriter extrahit, cū absynthio,
 lupinorum cremore, vel succo rute admota: tuber-
 culo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnoea, in
 laterum pectorisq; doloribus, in alui profluuiio, &
 dysenteria, horrores discutit, duabus horis ante fe-
 brum accessiones, fabæ magnitudine pota cum pi-
 pere & aqua: subdita lingue liquataq; scabritiem
 arteria expolit: obtusam vocem expedit, ventris ti-
 neas enecat, contra grauem oris halitum mandit-
 ur, & aduersus alarum tedia cum liquido alumina-

ne illinitur: gingivæ & dentes stabilit, colluto
cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutina-
nat, medetur fractis auribus ac ossibus nudatis, per-
runcta cum cochlea carnibus. Item purulentis au-
ribus inflāmatisq; cum meconio, castorio, & glau-
cio: ad varos autem cum cassia & melle illinitur,
impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum
ladano & vino myrteo illita, firmat: diurnas de-
stillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum ul-
cera complet, albugines tollit, caliginem discutit, sca-
briem laugiat. Fit è myrrha, perinde atq; thure,
fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conue-
niēs. Bæotica myrrha, dissecta radix est arboris cu-
iusdam in Bæotia nascentis. Melior est, quæ myr-
rham odoris suavitare representat. Vis ei calfacto-
ria inest, emollit discutitq; suffimentis commodissī-
mè inferitur.

Styrax.

Cap. LXVIII.

Λιτταρὶς
id est, pin-
guis.

STyrax lacryma est arboris malo cotoneæ simi-
lis. Præfertur ✱ sordescens, flavus, resinofus, al-
bicantibus grumis, quàm plurimum in sua odoris
gratia permanens: qui dum mollitur, melleum liquo-
rem reddit: qualis è Cataballis, Pisidia, & Cilicia
deuehitur. Deterior niger, surfurifus, friabilis, ca-
nôque situ obductus. Ceterum lacryma inuenitur
gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ emu-
la: verum perpauca manat. Adulteratur ligni sco-
be, quàm vermiculi erodentes excusserunt, melle, &

iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos expriment, venundantq; styracem hunc { quoniam in vermiculorum speciem contrahatur } scolecicem cognominant, tanquam syncerum imperiti approbant, nō animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: si quidem acer admodum est, qui ad ulte rationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, rauedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluæ præcluse duritiæ laboranti conuenit, cit menses potu appositūque, aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisque. Adoletur autem & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq;, & soporem adfert.

Adicellū
ab inter-
prete.

Bdellium.

Cap. LXIX.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madelcon: lacryma est * saracenice arboris. Probatur * Vex gustu amarum, translucidum, taurini glutinis adulteri in morem intus pingue, liquefcens facile, ligni na Marac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile. cello.

DIOSCORIDIS

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offas cōvolutum, assalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra opido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum nō perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec vsque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humiditasq; hernias discutit, cum ieiuna salua dilutum: vuluæ spiracula laxat appositum & suffitu, & partus humiditatesq; omneis extrahit, calculos potu comminuit, vrinam mouet, tussientibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos prosunt: contusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

Thus. Cap. LXX.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidum, cū frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicium

* Jæd vero * fuluescit, & colore liuet, sed rotundum induit id strias factitant: nam in quadrāgulares formas differt, subru sectum fictilibus versant, donec rotunditatem consumum est. trahat: verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum

locum habet * Arabicū, & in Smilo nascens, quod * ὁ Ἀραβικὸς
 aliqui copiscum vocant, minus multo & fuluius. Βίαι καὶ
 Est & genus aliud, cui amomite cognomē est, alio= ὁ ἐν σμίλῳ
 qui candidum: quod dum mollitur, mastiches more id est, A=
 digitis cedit. Adulteratur * in itinere, pini resina et rabias di=
 gummi, quod faciliē deprehendi potest: si quidem suffūm, et
 fitum gummi flammam non ei aculatur, & resina quod in
 in fumum euanescit, thus vero statim ardet: idem Smilo
 maleficium odor prodit. Ad calfaciendū & adstrin= prouenit.
 gēdum pollet, oculorum caliginem discutit, cava vl= * μέθο=
 cera complet, et ad cicatricem perducit, cruenta vul= δεινός,
 nera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eru= id est ar=
 ptiones, etiam si cerebri membranis effluat: vlcera, tificiosē
 que cacoethe vocantur, & sedis & reliquarū par confor=
 tium permulcet tritum cum eo. & lacte linamen= matum.
 tum, formicātes verrucas inter initia, impetiginesq; Sic Ma=
 ex aceto & pice illitum, tollit: ambusta igni, per= re.
 mionesq; cum suillo adipe aut anserino, & vlcera in
 capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: pa=
 ronychys cum melle, auribus fractis cum pice, me=
 detur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino in=
 funditur, inflammata à partu mammae cum cimo=
 lia & rosaceo magna vtilitate perunguntur, addi=
 tur ad arterie viscerumq; medicamēta, prodest san=
 guinis excreationi potum: sed in secunda valetudine
 haustum insaniam mouet, & largius cum vino po=
 tum interficit. In fictili mundo thus crematur, fla=
 grante glebula succensum à lucerna, donec exura=

DIOSCORIDIS

tur post perfectam vstionem operire oportet, vsque dum restringatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, vt in eius mentione mox ostēdemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam non viuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporēque emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. Cap. LXXI.

Prefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, laevis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est, si quidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modo vritur, et vis eadem quæ thuri, sed validior adstringentiorq;. Quare potu cruentis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pessa confert, ad cicatrices oculorum, et causa sordesq; efficax est. tostus scabris lipputudinibus auxiliatur.

Manna thuris. Cap. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris cōtusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque

enim æquè suffitu aeriū vaporem, se.l fuliginosum
& impurum expuit, & permistum suauolentie
halitus virus habet.

Thuris fuligo, Cap. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis
accensas singulatim thuris glebas, in nouam fio
etilem ollam concauam imposito: & æreo vase in
medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito:
alteram admoneto, ex altera eius parte aut vtraq;
subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis,
quò facilius perspici queat, si vrantur: & quà lo-
cus capax fuerit, glebular alias supponito, et antea
quàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam im-
ponito, donec sufficientem fuliginem videaris coegis-
se. Continuo tamen externæ aramenti partes spon-
gia aqua frigida, madesacta, abstergātur: ita enim
temperato aris feruore, fuligo omnis inherebit: quæ
alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus admi-
scetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris
seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfac-
tum tibi videtur, obeundum. Oculorum inflamma-
tiones mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat,
caua explet, carcinosmata sistit. Simili modo è myr-
rrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo exci-
pitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. Cap. LXXIIII.

Pinus & Picea generi eodem adscribuntur, sed
quandam flagitant specierum distinctionem,

DIOSCORIDIS

arbores vulgò cognita: quarum cortex adstringit,
prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus sum-
mum corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma
argenti & marna. Vlcera delicatulorum acrimo-
niam recusantium, cerato myrtino exceptus, ad ci-
catricem perducit: tritus cum sutorio atramento ser-
pentia cohibet, suffitu partus & secundas eijcit, po-
tus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita
& illita inflammationes leniunt, vulnera ab in-
flammatione vindicant, trita autem & decocta
aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent:
hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut
mulsa pota. Pinæ nucis cortex & folia potu idem
præstant. Teda earum particulatim secta si in ace-
to coquatur, & decocto dens colluatur, dolores ieu-
nat. Ex his etiam fit spatha acoporum pessorum-
que compositionibus idonea. Quinetiam earum
crematarum fuligo ad librarij atramenti confe-
ctionem excipitur: ea circumlutionibus efficacissi-
mè imponitur, quibus palpebras ornant, colorē ma-
que mentiuntur, callibrephara Græci vocant: arro-
sis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, &
collacrymationibus opitulatur. Pityides appellantur
Pinorum piceæq; fructus, qui in conis inueniun-
tur. Vim adstrictoriam habent, et aliquantiū excal-
facientē tussi & pectoris vitijs auxiliantur, per se,
aut ex melle sumpti. Nuces pinæ cū stroboli repur-
gate māduntur, aut cū passo aut cucumeris semine
bibuntur,

Pityides.

Libuntur, vrinam cient: acrimonias in renibus & vesica hebetant, Stomachi rofiones leniunt: data cū portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerptæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussi acta bitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus.

Cap. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest adstringendi: semini: emini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liquamentū autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, et vbi abundè cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuò coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem representat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinam pellit, motus dentium collutione stabilis. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, & quod prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lē Mastix tiscina cognominatur, Mastix & ab aliquibus, officinis.

DIOSCORIDIS

mastiche. Pota utilis est sanguinem reijcientibus,
 & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum
 mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad
 nitorem cuti conciliandum. Palpebras oculis incom-
 modas replicat, manducata halitum oris commens-
 dat, gingivas contrahit. Optima & copiosissima in
 insula Chio prouenit. Præfertur { nitedule mo-
 do { resplendescens, & candore Tyrrhenicæ cere
 similis, adulta, retorrida, friabilis, odorata, stridorem
 edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris
 resineq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. Cap. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, &
 semen, & cortex adstringunt, & ad eadē ad-
 quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sum-
 ptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersa-
 tur: excalfacit, urinam mouet, venerem excitat, cō-
 tra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibi-
 tur. Resina eius ex Arabia Petraea defertur. Proue-
 nit etiam in Iudæa, Syria, Cyprio, Aphrica & Cy-
 cladibus insulis: sed præualeat candida, perlucida, vi-
 treo colore, & in caruleum vergente, odorata, tere-
 binthum olens. * Terebinthina resinas omnes an-
 tecedat. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete:
 has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Na-
 tura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurga-
 re. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate
 ex melle, vitia pectoris expurgant, urinam cient,

Insertū
 ab inter
 prete.

* Offici-
 nis, Ter-
 pentina.

cruda concoquunt, ventrem emolliunt, palpebras commodissime replicant, lepras tollunt, cum erugine ac sutorio atramento, nitroq;: auribus sanient emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium vtilis: malagmatis, acopisq; admiscetur. Laterum doloribus per se, illitu, & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. Cap. LXXVII.

Liquidam resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atq; olim à Colophonē petebatur: hinc Colophonē sibi cognomen vendicauit. A Gallia quoq; subalpina: quā vernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linetu, & per se, magnopere prodest iussu veteri. Colore inter se distant: siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ vero aridarum generi adscribuntur, quedam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrida, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abietæ resinæ ceteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores à Pitrysa insula deferuntur, quæ secūdu Hispaniā sita est. Sed quæ è picea, nucibus, pineis & cupressomanarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potitur. Veruntamen eorundem gratia, quorum &

DIOSCORIDIS

illæsumi solent. Lentiscina terebinthinae respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui insunditur: itaq; resinæ congius, in duobus aquæ pluviæ coquitur, subiectis leuibz prunis, resina assiduè mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Cæterum vbi refrixit, in fictile nõ picatum, quod aconitum vocant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò se culenta sordes excernatur. Vrintur quoq; sine aqua, primùm lento igne & vbi coire cœperunt, maior carbonum strues superponitur, et triduo citra intermissionem discoquuntur usq; dum antedictas nature suæ notas exuerint: mox, vt dictum est, reponuntur. Aridas vnius diei spatium decoxisse satis est. Vstæ odoratis malagmatibus, et acopis, & vnguentorum colorationibus magnopere vtilis sunt. Et resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circunlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. Prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisque oculorum angulis. ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida.

Cap. LX. XVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, è pinguisissima pini piceaq; lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, lauis. Contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficilè em-

tusiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vna inflammatio nes, anginaq; vtiliter perunguntur: purulentis auri bus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus: adiecta verò pari cera scabros ungues extricat, impetiginesq; emendat: vulue duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinaq; hordeacea & pueri impubis vrina decocta, Strumas rumpit: cohibet vlcera, quae serpunt, cum pineo cortice, aut sulfure, aut furfuribus illita. Cae terum cum thuris manna & cerato profundos vlc erum sinus conglutinat, rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum vna passa, & melle carbunculos, et putrida vlcera emarginat, disrumpitq;: erodētibus medicamentis, quas septas vocant, probe imiscetur.

Picinum oleum.

Cap. LXXIX.

E Pice fit quod pissileon appellant, separato li quore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lacti, Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra Hec dec cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; halitu sunt, eius exprimuntur in vas. * Quas pix liquida praebet utilitates alopecias capillo replet cum farina καὶ τὸ αὐτὸ hordeacea illitum, quibus & liquida pix medetur, ταὶ ἐφ' ὅ σου ἀνι χρονον αἰσάται.

Fuligo liquide picis. Cap. LXXX.

It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua, quae ellychnium habeat, nonnihil picis

DIOSCORIDIS

Incendito ; lucernamq; fictilis vase in clibani specie
conformato, superius in angustum fornicato, infe
rius perforato, vt clibani esse solent, operito, & ado
leri simto : consumptoq; liquore nouum infundito,
quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei
adstringens, acrisq; . Vsi est ad pigmenta, quibus
palpebras linunt & venustant, & ad circunlitio
nes. Item vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad
imbecilles lacrymososq; oculos, insuper ad eorunde
ulcera non inutilis est.

Pix arida. Cap. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vo
cant aliqui palimpissam. quo in genere quedā
visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sic
ca est. Probat purā, pinguis, odorata, subrufa, re
sinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul
naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura
emollit, pus mouet, tubercula pannosq; discutit, vlc
cera replet, vulnerarijs medicaminibus commode
permiscetur.

Zopissa. Cap. LXXXII

Zopissam aliqui aiunt derasam nauibus resi
nam cū cera, quam alij apochyma appellāt.
Ea dissipadi natura habet: quoniā marino sale ma
cerat a sit. Alij pineā resinā hoc nomine vocauerūt.

Bitumen. Cap. LXXXIII.

Bitumen Indicum ceteris anteponitur. Cuius
probatio est, vt purpure modo splendeat, sitq;

ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrū autem & sordidū, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sidone. Liquidum inuenitur in Acragantino Siciliæ, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinātur, qui id Sicilicū oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. Cap. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurū, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, & stuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. Cap. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colorem, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transfiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines vtilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impositu: emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagate lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit, tussim veterem & anhelitum adiuuat, serpentium moribus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur celiacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum discutit sanguinem concretum, dysen-

DIOSCORIDIS

tericis cum ptisana liquatum infunditur, destillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum, ceterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum: concalsactum autem, et cum farina hordeacea, nitro & cera illitum podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

Cupressus. Cap. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & adstringit. Cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismus, & urine difficultati auxiliantur. Pilule autem ex vino tusa in dysenteria, alui fluxione, tussi, et orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, convenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdè præbet effectus tusa cum fico duritias emolliunt, naariumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detrita scabros vngues eijciant, hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilule cum arboris coma suffite, culices abigere existimantur. Folia trita & imposita, vulnera conglutinant: sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus, quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota cum cerato stomachum corroborant.

Iuniperus. Cap. LXXXVII.
Iuniperi genera duo: altera maior, altera mi-

nor, vtraque acris est. Excalfacit, & vrinam mouet, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnulla nuncis inglandis magnitudine, nonnunquam grandescere, alie & nucem Ponticam equare inueniuntur: ro- * Auella tunde, odorata, in mādendo dulces, sub amara, quae nam in- arceuthides etiam, id est, bacca iuniperi nominatur. tellige. Modicè calfaciunt, & adstringunt: Stomacho utiles contra pectoris vitia, tuſſim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent: ideo tam ipsa, quàm eorum succus, ex vino contra viperarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, leprae eximit. Ramenta ligni deo rata interficiunt.

Herba Sabina. Cap. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cupresso similis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruēs: arbor est coactae breuitatis, quae sese magis in latitudine fundit. huius folijs nonnulli pro suffitu vtuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusq; folia nomas sistūt, collectiones illitu mitigant, et cum melle nigritias sordesq; repurgant, carbūculos cum vino pota rūpunt, sanguinē per vrinā eliciunt, partus apposita extrahunt, et suffitu idē praestant, vngue

DIOSCORIDIS

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas par-
 rit, baccarum myrti magnitudine, rotundas Cedria
 optima est crassa, perlucida, gravis odoris: quæ dū
 Cedrus effunditur, guttatim non dissipata coit, Cui ea vis
 mortuo= inest vt defuncta corpora conseruet, & viuentia
 rum vi= corrumpat: quæ ex causa mortuorum vitam aliqui
 ta dicta. appellauere. Vestimenta quoque, & pelles eximia
 calfaciendi & siccandi dote, corrumpit: magni ad
 ocularia medicamenta vsus, quippe illita oculis cla-
 ritatem affert, albugines cicatricesq; detergit: instil-
 lata autem cum aceto vermes aurium necat, cum
 hyssopi decocto infusa sonitus sibilosq; sedet, canis
 dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Idem
 facit cum ex aceto colluitur: peruncto ante coitum
 genitali abortiuum fieri constat: anginae ea perun-
 guntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est,
 lendes pediculosq; illitu enecat, cerasta morsibus
 cum sale imposita subuenit, contra hausta leporis
 marini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in ele-
 phantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pul-
 monum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbea-
 tur, persanat: vermes & tineas subter inulita ne-
 cat, & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria
 separatum, dum coquitur, velleribus supra hali-
 tum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia
 vsus: priuatim vehementer perunctum scabiem
 quadrupedum, canum, boumq; persanat: inhe-
 rentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura accepe

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent, Stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, Strangurie: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus.

Cap. XC.

LAurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infessus additum, vuluæ & vesicæ vitii conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum apiumque ictibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri baccae magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate tritæ cum melle vel passo prosunt tibi, orthopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, vitiliginem emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori, et grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adiunguntur, quæ nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocantur: et ad vnguenta, quæ calfaciunt, & discutiunt. Cortex radices calcidos rumpit, partus necat, hepaticis

DIOSCORIDIS

prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Platanus.

Cap. XCI.

TEnerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potæ, serpentium moribus auxiliantur: excepta autem adipe, igni ambusta sanant insidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus.

Cap. XCII.

FRaxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciosam afferre tradunt.

Populus.

Cap. XCIII.

Potus albae populi cortex vnicæ vnius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortivum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum vino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulae, quæ primo foliorum partu exiliunt, illita cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoria prodiderunt corticem albae populi, & nigra particulatim cæsum, & sulcus stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigra folia cum aceto illita, magna utilitate podagris

et doloribus illinuntur. Resinam populus fundit,
 quæ in malagmata additur. Semen potum ex ace-
 to comitialibus utile est. Lacrymam populorum
 commemorant, quæ in Padum amnem defluat, du-
 rari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, ali-
 chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat,
 & aurum colore imitatur: tritum potumq; Stoma-
 chi ventrisq; fluxiones sistit.

De ortu
 electri
 multa li-
 br. vlt. c.
 3. & 4.

Macer.

Cap. XCIII.

apud
 Plin.

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauus
 scens, crassus, gustu perquam adstringens:
 qui contra cruentas excreationes, dysenterias, &
 alui fluxiones bibitur.

Ulmus.

Cap. XCV.

Vlmi & folia & cortex et rami, vim habent
 spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras effica-
 ceter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis
 corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur. nam in lori-
 more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua
 frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa
 celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis aut
 radicis foveantur. Humor in folliculis enascens pri-
 ma germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit,
 faciemq; splendidiorem præstat. Qui dum siccatur,
 in animalia abit, quæ culicū formā gerunt. Folia cū
 tenere scūt cocta, olerū more ad obsonia vsurpantur.

E Lignorum marcor. Cap. XCVI.
 X caudicibus lignisq; veteribus caries conge-

DIOSCORIDIS

ritur, quæ farinæ modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisq; imposita illinatur.

Harundo. Cap. XC VII.

IN harundinum genere quædam nascos, id est, farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia fœmina, qua tiliarum ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula, aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborūq; dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur, panicule lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus. Cap. XC VIII.

Papyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vtilitatis, ad laxandas fistulas: madesacta lino inuoluitur, vsq; dum in aruerit: constricta enim atq; immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq; Aca-

gyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes,
 & mansam expiunt. Ipsi radicibus pro ligno uti
 tur. Cremata papyri cinis depascentia vlcera cum
 omnium partium, tum oris maxime, cohibet: verum
 melius id combusta charta prestat.

Myrica. Cap. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgo cognita Officinis
 est, cum apud pigras & stagnantes Tamari
 aquas enascatur, fructum quasi florem seu.
 ferens compage muscosum. Aegyptus Syriaq; alte-
 ram gignunt mitiorem, syluestri cetera similem.
 Fructum parit gallæ proximum, inaequaliter ad-
 stringentem gustu: quo conuenienter utimur vice
 gallæ in medicaminibus oculorum orisq;. Datur crue-
 tæ excreationi in potu, & celiacis, & contra pro-
 fluvia sceminarum, regium morbum, & phalangio-
 rum morsus: illitus tumores inhihet. Cortex in eos-
 dem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino
 potum, lienem absunit: ad dolorem dentium in col-
 lutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vulua
 opportunis indefectionibus, phthiriasi lendibusq; cir-
 cumsusum prodest, abundantiam sceminarum sistit
 impositus arboris cinis, potorios calices è caudice lie-
 nosis molliuntur, quo datus in his potus proficiat.

Erica. Cap. C.

Erica * fruticosa arbor, myricæ similis, longè * Plin.
 minor: cuius flore apes reprobum mel efficiunt, fruticem
 tum flos quæ coma serpentium ictibus illitus medetur. dicit.

DIOSCORIDIS

Acacalis. Cap. CI.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadantenus similis: cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus. Cap. CII.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens re-
ctos et aculeos in acutæ spinæ modum, folijs
paruis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei
genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq;
folijs constat, & quadantenus rubentibus: cuius
rami quinum ferè cubitorum longitudinem implèt,
spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigen-
tibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuè,

* *κοιμῆς* follicularij specie, * *verticillo* similem. Omnium *φο-
σφοδὲ* = lia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter
λω, id est illuminatur. Fama est ramos huius valuis fenestrisue
asphode = impositos, ueneficia depellere.

li fructui Halimus. Cap. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis
rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus.
nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur
ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta, tormi-
naq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsæ po-
ta: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus. Cap. CIIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, du-
rus, cuius semen pingue & fuliginosum in-
uenitur:

uenitur: quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculus comminuit. serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix adstrictoriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omnes discutit, trita et imposita.

Acuta spina.

Cap. CV.

Acuta spina, quam pyram aut pityanthen aliqui vocant, arbor est pyrastrosimilis, spinarum nosa valde & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, alto descendentem. Huius bacce potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam sceminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriat, aut perungatur.

Rubus canis.

Cap. CVI.

Rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo olivæ simili, qui per maturitatem fulvescit, & flocculos intus continet. Fructus exēptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruesfacti enim ij in vino, mox poti, arteriam infestant.

Ligustrum.

Cap. CVII.

Officium

Ligustrum arbor est oleæ folijs circum ramos Almos similibus, latioribus, mollioribus, & canna.

DIOSCORIDIS

colore viridioribus: flore candidi, muscoso, odorato
 semine scambuci, nigro. Optimum nascitur in Ca-
 nope & Ascalone. Folia adstrictoriam vim habet:
 quare commanducata vlcerebus oris medentur, illi-
 ta feruidis inflammationibus, carbunculisq; pro-
 sunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur, ca-
 pillum rufant trita folia, que in radicle succo ma-
 luerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorē se-
 dat. Cyprinum oleum, quod ex eo fit odoratum, ex-
 calfacit, emollitq; nervos. si que feruēti natura præ-
 dita sint, assumat.

Tilia.

Cap. CVIII.

Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs o-
 lea, nigrioribus & latioribus, fructu * lenti-
 sci, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis
 nascitur. Huius folia adstringunt: ad eadem vtilia
 ad quæ oleaster, cum adstrictione est opus: maxi-
 mē ad oris vlcera, commanducata, aut si decocto
 colluantur: pota urinam ac menses ciēt.

Cistus.

Cap. CIX.

Cistus, quem aliqui citharon, aut cissarō vocāt,
 ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus,
 saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsu-
 tis. flos * masculo vt mali punice, fœminæ albet.

* Vox
 ex Plinio
 reposita.

Vis adstringens: vnde flores in vino austero his in-
 die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illiti
 cohibent, vetustati vlcērū. & igni ambustus cū cœ-
 rato medentur. Hypocistis, orobethron, aut cytinus

à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quedam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liguatur acacie modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; vt in lycio prosequuntur. Vires acacie habet, verū aliquantō magis siccatur, & adstringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus: sceminarū profluuiū et pota et indita.

Ladanum.

Cap. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempore quidam contrahunt pingue. Foliorum vis adstringens, ac eosdem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod ladanū dicitur. Siquidem cum cisti frondes paucuntur capræ, hirciq; pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant: quam depeccantes incolæ, colantesq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij uerò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentore abstergunt, conglomerantq; in ladanū. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitū est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uero Libycumq; uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem continet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricilius decorem redat, cum uino illi-

Colligen-
di lada-
ni mo-
dus.

tum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit, pessis immistum uulue duritiem sanat, in medicamenta que dolorem tuſsimq; finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: aluum sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet.

Ebenus.

Cap. CXI.

Ebenus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus leuore: cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque leniter adstringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tadio. Recens autē ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modicē fuluis, itē frequentibus maculis: ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro ebena veneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas asulas resoluntur nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu preferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres distillationes pustulasq; mirum in modum pollet. si quispiam facta ex eo coticula collyrijs vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentāue vino Chiodie noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolāt, reliquaq; eundē in modū peragūt. Alij pro vino aqua utūtur. Vritur in fichili

nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi
vsti modo, & ita siccis scabrisque lippitudinibus
conducit.

Rosa.

Cap. CXII.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca mul-
to magis. Succus recentibus folijs exprimi-
tur, defectis forfice vnguibus (sic appellantur can-
dida foliorum partes) reliquum in pila premi & te
ri debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad oculo-
rum circumditiōnes recondi. Siccantur etiamnum
folia rosarum, continuò versata, ne muceant, neue
situs in ijs insideat. Aridis rosis & in vino decoctis
expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium,
oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini ac vul-
ue, penna illitus aut infusus. Eadem sine expressio-
ne tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis
stomachi vitijs, igni sacro illini prodest: siccis ac tri-
tis foemina asperguntur. Misceri solent vulnerarijs
antidotis, atque compositionibus, quas antheras vo-
cant. Folia vruntur in calliblephara. Flos, qui in me-
dijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxioni-
bus efficaciter inspergitur. Capita pota citam al-
uum, & cruentas reiectiones sistunt.

Quid vi-
guis in
rosa.

Rosei pastilli Cap. CXIII.

Pastilli, quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nul-
lo antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chmæ quadraginta, Iudice nardi drachmæ des-

cem, myrrha drachma sex, trite digeruntur in pasta
 stillos, qui trium obolorum pondus aequent: sicca-
 tiq; in umbra, in fictili non picato, atque obturato,
 reconditur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iri-
 dis Illyricae totidem, & uinum Chium cum melle
 miscent. Mulieribus monilium uice collo circunda-
 to usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus.
 Tritis etiam uiuntur ad illitiones et diapsasmata,
 quae sunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis in-
 arefiant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium.

Cap. CXIIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan uocant, ar-
 bor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut
 longioribus: folijs buxi, densis: fructu piperis, ni-
 gro, leui, amaro, densoq;: cortice pallido, non disti-
 mili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis,
 lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lye-
 cia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Suc-
 ci extrahendi ratio haec est: Rami cum radiculis
 tuss, & antè per multos dies macerati, coquuntur,
 tum abiectis lignis iidem liquor, donec mellis cras-
 situdo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta deco-
 ctioni amurcae, aut absynthij succo, aut felle bubu-
 lo. Innatans spuma inter coquendum exempta, ocu-
 lorum medicamentis additur: reliquo ad alia utun-
 tur. Simili modo fit lycium semine expresso & in-
 solato. Optimum, quod uri potest, restinctumq; ru-
 bentem spumans ostendit, glebis extrinsecus ni-

gris, intus, cum flegoris, rufis, * odore minimè vi- * Ita ex
 roso, cum amaritudine adstringens, crocino colore Plinio.
 (cuiusmodi Indicum est) ceteris præstantius atque
 efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum
 discutit, genarum scabiem, pruritus, veteresq; flux
 iones sanat: facit ad purulentas aureis, exulcera
 tas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis ri
 mas, attritusq; illitum: celiacis, dysentericis, potiò
 inditumq; conuenit: datur sanguinem excreantibus
 & tussi, ex aqua: contra rabiosi canis morsus in
 catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos
 facit pilos: reduuys, ulceribus, quæ serpunt aut pu
 trent, medetur: fœminarum profluvia appositum
 sistit: rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice * Viden
 catapotij deuoratum, auxiliatur. * Tradunt Indi tur Mar
 cum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato: ea cello quæ
 spinarum generi adscribitur, ramos rectos habens hinc ses
 ternum cubitorũ lōgitudine, maiorẽsue, rubo cras= quũtur,
 flores, à radice numerosos. Fractus cortex rubeſcit, notha.
 folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur. * Nō est
 lienis inflammationibus & regio morbo mederi, genuina
 & fœminarum purgationes elicere. Aseuerant officina
 etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare. riu Aca=
 Semen cyatho dimidio potum, pituitam expurga= cia, quã=
 re: venenis quoque auxilio esse. uis eadẽ

Acacia.

Cap.

CXV.

vi ac na

A Cacia in Aegypto nascitur spina instar ar= tura præ
 boris, fruticosa, non se in rectum attollens. dita.

Florem habet candidum, & semen lupino simile in
 folliculis, ex quo succus expressus siccat in vna
 bra: niger ex maturo semine, subrufus ex viridi.
 Eligatur modicè rufus & odoratus, vt in hac ar-
 bore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & sea-
 mine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei
 ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus ocu-
 lorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacri
 vlcera que serpunt, perniones, pterygia, & oris vl-
 cera: procidentes oculos reprimat, mensum abundan-
 tiam sistit, prociduum vuluam cohibet. citam alui
 supprimit, aut potus aut subter inditus: capillos de-
 nigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in
 aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura ex-
 tet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam
 in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoqua-
 tur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Spina
 decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur
 eius spinae gummi, quod in vermiculorum speciem
 contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni exa-
 pers: proximum est candidum: sordidum verò ac
 resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & me-
 dicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam he-
 betat, ambustis ex ovo illitum, pustulas non pati-
 tur erumpere. Alterum acaciae genus in Cappado-
 cia Pontoq; prouenit, Aegyptiae spinae similitudine,
 longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo mu-
 nitur, folia habens ruta. Semē lenticula minus fert

autumno, in loculis connexis, ternum quaternumue
capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior,
& ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex.

Cap. CXVI

Vitex siue lygos frutex est in arborem a sur- Barba
gens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis ac-
cis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fructu gnus ca-
peruicaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera sunt.
eius, vna harum album florem mittit cum purpu-
reo, altera tantum purpureum, & semen, ut piper.
Excelsæ vires habet, & adstrictorias. Se-
men eius potum venenatis ictibus, aqua, quæ cutē
subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet,
drachmæ pondere in vino potum: genituram exol-
uit, caput tentat & soporem affert. Decoctum her-
bæ & seminis in defensione, mulieribus vuluæ malo
opportunis opitulatur, item inflammationibus: pur-
gationes mouet semen cū pulegio potum, etiam sus-
fitu vel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum,
instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo &
phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant ve-
nenata: illita quoque serpentium moribus auxi-
liantur: testium duritias cum butyro & folijs vis-
tium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illi-
tum mitigat, & cum folijs medetur luxatis, vulne Nominis
ribusq;. Virgam qui manus teneat dum iter facit, agni &
negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicas lygi ra-
castum, vocant Græci, quoniam matrone in thesa- tio.

mophorijs Atheniensium castitatem custodientes,
folijs huius cubitus sibi sternunt, & lygon quasi
vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilita-
tem.

Salix.

Cap. CXVII.

Salix vulgò nota est: cuius semen, folia, cor-
tex & succus spißandi vim habent. Trita
folia cum exiguo pipere et uino pota, ileosis
subueniunt. sumpta per se & cum aqua prestant
mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu
sanguinem expuentibus prodest: cortex eosdem præ-
bet effectus. Corticis cinis admisto aceto macera-
tus, illitu clauos & callos tollit. Ex folijs & corti-
ce succus cū rosaceo in calyce punici calfactus, au-
riū doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras
foueri utilissimū: furfures purgat in corpore. Exci-
pitur succus, qui manat ex ea cū floret, exciso cor-
tice: in plaga enim concretus humor inuenitur, quē
ad purgāda, quæ obstant oculis, suam uim præbet.

Syluestris olea.

Cap. CXVIII.

Syluestris olea quam Latini oleastrū appella-
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia adstrin-
gunt: trita autem et imposita ignem sacrū,
ulcera, quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, redū-
nias nomāsque cohibent: crustas emarginant cum
melle illita. Quinetiam sordida ulcera repurgant:
inflammationes panosq; cum melle imposita dis-
cutiunt: cutem à capite uulsum conglutinant &

oris ulceribus, & priuatim infantium, commandu-
cata medentur. Succus & decoctum eosdem habet
effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri prae-
uium, admotus succus inhibet: uuae oculorum pustu-
lisq; prodest: ulcera & ueteres defluxiones sistit,
(quapropter in collyria additur.) ad genarum ero-
siones perquam utilis. Exprimitur succus tuis fo-
lijs, affuso uino aut aqua, siccatusq; sole in pastil-
los digeritur: sed longè ualidior ad recondendum
succus habetur, qui cum uino quàm cum aqua ex-
pressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue
pus effluat. Folia conuenienter celiacis cum farina
hordacea illinuntur: uruntur cum floribus folia, ut
spodij uicem cinis praestet, in cruda olla, oblito ore
luto. usque dum figlinum percoquatur: restincta q;
uino & rursus subacta, eodem modo uruntur, po-
stremo cerussae modo elota coguntur in pastillos. Hu-
iuscemodi cinerem in medicamentis oculorum con-
stat spodio non cedere, sed eisdem uiribus prae-
dictum esse potandum est. Foliorum sativae olea ead-
em uis intelligitur, sed aliquanto inferior: unde
ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim
conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso ma-
nans, illitu sanat lichenas, fursures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur fursuribus, &
ulceribus quae depascunt uorantq;: quod autem in-
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros un-
gues excutit. Colymbades tritae & ambusti illo

DIOSCORIDIS

lta pustulas gigni prohibent, sordida vlcera pur-
gant, murie succus collutas gingiuas contrahit, &
motus dentium firmat. Oliua flaua & recens sto-
macho vtilior est, ventri difficilis: nigra autem &
matura corruptioni opportuna est, stomacho aduer-
satur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet,
arefacta illitu depascentia vlcera sistit, & carbun-
culos emarginat. Oleum syluestris oliue gingiuis
putri vligine laborantibus colluitur, dentium mo-
bilitates stabilis, calfacti fots gingiuis fluxione la-
borantibus vtilis est: lanam enim specillo circunli-
gatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admo-
uere, donec albæ spectentur.

Lacryma Aethiopice oleæ.

Cap. CXIX.

Lacryma, quam Aethiopica olea stillat, scāmo-
nio similis quadamtenus est, fulua, stillis exis-
libus constans, mordax: quæ autem ammoniaci,
aut gummi similitudinem refert, colore nigricans,
nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ,
oleastrisq; similem lacrymam sudant, quæ commo-
dè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albu-
ginesq; illitu emendat, vrinam & menses ciet, cauis
dentium impressa ad dolores efficax est: inter vene-
na scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sa-
nat. Appellatur autem Aethiopica et agrestis olea.

Amurca.

Cap. CXX.

Amurca (expresse oliue recrementum) de-

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insuper dentium dolori & vulneribus, cum aceto, vino aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si uero cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cum decocto lupini, & chameleonte illitu sanat. Cruda et recenti amurca podagras articularesque dolores foueri, vtilissimum: peruncta in uillosa pelle, & hydropicis imposita tumoris molem reprimat.

Quercus, glans, fagus, ilex. Cap. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pessa, scæminis fluxione vuluæ laborantibus subiicitur. Glandes eosdem effectus exhibent: urinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumptæ pariunt, resistunt esitatz venenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica: intritæ crudæ inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cacoethe vocant, & malefica vlcera cum salsa axungia coue-

DIOSCORIDIS

niunt. Alignæ glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & con- simile munus obeunt. Alignæ radicis cortex cum aqua coctus, cum mollitus intabescat, & tota no- ste illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra pur- gatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus pro- sunt, & imbecillas mēbrorum partes corroborat.

Castaneæ. Cap. CXXII.

Sardiana glandes, quas aliqui castaneas, aut lo- Spima, aut glandes Iouis appellant, adstringūt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica que carnem & corticem media intercursat. Caro his, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. Cap. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed tuberosa, solis- da, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, pers- forata. Eligi debet omphacitis, que efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. Trita excre- scentia in carne, fluxiones gingiuarum & vne, at- que oris vlcerationem cohibent. Nucleus, dentium- cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ carboni- bus, donec igne flagrent, & vino aut aceto aut aci- da muria extinctæ, sanguinem supprimunt. Deco- ctum, quibus insidere expedit, efficax est, & con- tra vuluas procidentes, fluxionesq; Capillos deni- grant, aceto aut aqua maceratæ, dysentericis cœ- liacisq; cum vino aut aqua trita conuenienter illi-

nuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integre in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his vtendum ad adstringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

Rhus. Cap. CXXIIII.

Rhus quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus *Officinis* erythros appellata, semen est coriarij fruticis, sic vocati, quoniam coriorum infectores eo vtuntur, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris nascens, binum ferè cubitorum altitudine, folijs oblongis, subrudentibus, in ambitu serratis, acino ruarum gracilium denso, magnitudine terebinthi, quadamtenus lato: cuius corticosa tunica perquã utilis est. Folia vim habent adstringendi, & acacie effectus præbent. Decoctum capillos denigrat, dysentericis infunditur, & in potu eorum infususq; aducitur: instillatur auribus purulentis. Gangrenas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Iis quamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinẽ mellis in aqua decoctis, ad eadem, vt lyciũ, conueniens. Semen eosdem effectus exhibet: cæliacorum, dysentericosumq; obsonijs, inspergitur: fracta, desquamata, liuidaq; illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguae asperitates cum melle abstergit, candida scæminarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat, cū querno carbone itrito admodũ. Aquæ, in qua semen maduit, decocta, cogitur coitq; effica-

cior ipso semine. Gummi desert, quod dētium canis
imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma.

Cap CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturis
tatis vigore, autumnō decerpi solet, Arabici
myrobalani similis pomatis cognomine, colore viri-
di, & odore mali cotonei, quod si ad maturitatem
peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma a-
cerba est & adstringens: contra alui sceminarūq;
profluvia, in uino austero bibitur: hæmorrhoidas si-
stīt, uulnera glutinat illitu. Phœnecobalani recētes
plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt,
copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem ex-
creantibus, Stomachicis, & dysentericis vtilēs in ci-
bo: illinuntur cum cotoneo & cerato tenanthino ve-
sicae vitis. Cariota, præsertim esu, faucium asperie-
tati medentur. Thebaicarum decoctum potu aestua-
tionem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri
sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad ea-
dem conueniens. Decoctum per se potu & gargaris-
atione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei
palmarum, ceterorum more, cremati in crudo ficti-
li, & vino restincti, cinere loto, spody vicem effi-
ciunt: miscenturq; in calliblephara, Quod si non ius-
tam vstionem acceperint, denuo cremandi. Vim ad-
stringendi habent, & spiracula cutis obductu suo
claudunt: contra oculorum vnam & pustulas,
palpebrarum defluuia, cum nardo effectum præ-
bent:

bent: corporis excrescentias cum vino reprimunt, vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas vtilis ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palmia elate. Cap. CXXVI.

PAlma, quam aliqui elatē aut spatham appellant, fructus palmarum adhuc florētium, involucrium est calyxq; quo in spissamenta vnguentarū vtūtur. Optima habetur odorata, adstringēs ponderosa, praeclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: si sit vlcera quae depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatibus et malagmatis: prodest praecordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat datur bibendum congruē, renum, vesicae, & viscerum vitijs: vuluae ac ventris fluxiones si sit: scabiē cum resina, & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutusq; in ea elate fructus, quē suo āplexu fouet, elate ēt vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathae effectus praestat, nō sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recēs in cibo, aut decocta eadē facit, quae borassus.

Malum punicum. Cap. CXXVII.

MAlum punicum omne boni succi est, Stomacho vtile, perexiguum sufficiens alimentū. Vulgo malum granatū
Dulcia stomacho vtiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt,

DIOSCORIDIS

estuant stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivasq; laedunt. Vinosa vero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentem aluum stomachumq; sistunt. Coelesti aqua madescunt, bibunturq; commodè sanguinem excreantibus: ad desensus dysentericorum, foeminarumq; fluxione vulvae laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, et sedis ulcera, nomas, reduvias, & ea, quae in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia: praesertim acidorum. Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicum praestant utilitates: humida gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluntur, herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. memoriae tradunt, qui tres quæ minimos cytinus deuorauerit, nullam eo anno leprositudinem passurum: eliquatur hypocistidis exemplum. Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidon appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, praebet usus. Decoctum radicis potu latus ventris tinea pellit, & easdem euocat. Balauustum sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstrictoria vis

Cytinus

Malico-
rium.

Balau-
ustum.

LIBER PRIMVS. 50

inest, eadem faciens, quæ hypocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina quam candida, & in hoc genere multo magis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicae erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eosdem effectus exhibet: Stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctum capillum tingit, ius decocti in vino ulcera in extremis membris nata sanat, oculorum inflammationes illitum cum polline potentæ lenit, contra agilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruesfacto aliquantum eius semine exprimatur alias enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus. Utile procidetie vulvarum in desessionibus, sedis vniuersæ, & foeminae fluxione vulvæ laborantibus: purgat furfures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas vocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad desessiones balnearum convenit, & contra laxatos artus, & malè solidescentes. Eo fracta fer-

capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita fo-
lia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partis
bus omnibus fluxione laborantibus, cœliaciq; pro-
sunt, & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosa-
ceo cum vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum,
testium inflammationes, epinyctidas & condylo-
mata. Arentium foliorum farina vtiliter inspargi-
tur paronychijs, pterygijs, & contra alarum femi-
numq; persusiones, cardiacorum sudores cohibet.
Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, pa-
ronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs
succus adfuso vetere vino aut aqua cœlesti, cuius
recentis vsus est: nam exiccatus planè cariem sen-
tit, & vires amittit. Myrtid. anum dicitur, adnatũ
inequabile, verrucosum intumescensq;, & conco-
lor: quod perinde quasi manus myrti caudicẽ am-
plectitur. Magis quàm myrtus adstringit: tusum
addito austero vino reponitur, coactumq; in pastil-
los siccatur in vmbra, multò efficacius, & folio et
semine, cerato, pestis, infessionibus, cataplasmati-
s admistum, vbi adstringendum aliquid est.

Cerasia.

Cap.

CXXIX.

Cerasia aluo vtilia sunt, si viridia suman-
tur: eadem siccata, illam sistunt. Gum-
mi, quod cerasi resudant, cum vino dis-
luto tusi vetusta medetur: colorem commendat,
visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino
potum calculosis auxilio est.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur, al-
uum soluunt: eadem siccatæ sistunt stoma-
choq; vtiliores fiunt. Vrinam ciunt: sed præ-
cipuè, quæ vinaceis condiuntur.

Mal. Cap. CXXXI.

Folia, flores, & germina cum omnis mali, tum
maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis
adstringendi vis inest: maturis vero longè secus.
Ea ijs vernabilem gignunt, nervos omnes laedunt,
inflationes pariunt. Cotonea stomacho vtilia, vri-
nam ciunt: verum tostata mittiora habentur. Pro-
sunt coeliacis, dysentericis, purulenta extusionibus
cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor
commode in stomachi aut ventris fluxionibus, po-
tius datur. Succus crudorum assumptus orthopnoi-
cis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & se-
des si procidant. Cotonea, quæ melle condiuntur,
urinam mouent: mel autem sibi constringentem il-
lorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum
melle coquuntur, stomacho atq; ori gratiora sunt,
sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adij-
ciuntur, adcohibendam aluum, aut si stomachus
æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mamma-
rum inflammationes, præduros lienes, & condylo-
mata. Fit vinum ex ipsis tuis expressisq;: sed quò
perduret, quindecim sextarijs succi vnus mellis
adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest

ad omnia que dicta sunt. Fit et oleum ex ijs, quod melinum vocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, que sanè sunt rotunda, parua & odorata: que vero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, que adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusq; sanguinis. Contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. Melimela uentrem molliunt, & ab eo animalia expellunt stomacho negotium exhibent. Aestuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, que Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia: sistunt aluum, urinas euocant, malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt uernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immaturo oia opus sunt. Persica poma matura tam stomacho, quam uentri utilia sunt. Acerba aluum cohibent: sed sicca uehementius. Decoctum è siccis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, que à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala Persicæ uel cedromela, que Latini citria uocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa oibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascens. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cū grauitate odoratum, semē habet pyri. Id in uino potum uenenis resistit aluum mouet, oris suauitatem comen-

dat, decocto eius colluto, aut succo: æstur in malacia mulieribus: uestiarijs impositum ab erosione uitio uestes uimicare existimatur.

Pyra. Cap. CXXXII.

PYrorū multa genera, quæ tamen oīa adstringunt: promde adduntur cōueniēter in repellentia cataplasmata. Decoctū ē siccis & cruda ipsa aluū sistunt: ieiunos esitata ledunt. Achras pyrastri genus est, quod tardissimè ematurescit. Vim pyro adstringētiore habet, et ad eadē conuenit: stringunt et eius folia. Ligni pyrorū cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. Cap. CXXXIII.

MESPILUS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthæ. fert pomū suauē exiguū malo nō dissimile, tribus intus ossiculis: quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esus adstringit, stomacho gratū est, aluūq; supprimit. Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setaniū, alij epimelida uocāt Arbor folijs mali, sed minoribus: pomū fert rotūdum esui aptū, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. Cap. CXXXIIII.

LOTUS arbor est uastæ magnitudinis ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gra-

D I O S C O R I D I S

tam, stomacho facilem. Aliū sistit baccis. Ramē
torum ligni decoctum siue potu, siue infusione dy-
sentericis ac fœminis fluxione vulue laborantibus
auxilio est rufat capillos, citam aluum colibet.

Cornus. Cap. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferēs oliuæ mo-
do oblongas, quæ primū uirent, dein per ma-
turitatem rubescunt, aut ceræ colorem repræse-
tant. In cibo adstringunt, profluxio alui atque dy-
senteria salutare, siue in edulio, siue in desfruto ex-
hibeantur. Muria, ut oliuæ, condiuntur. Sanies, quā
uirentia folia torrendo resudarunt, impetigini con-
uenienter illinitur.

Sorba. Cap. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referētia prius, quā ma-
turecant, dissecta & sole siccata manduntur,
ut album sistant. Eadem est functio molitorum fa-
rine, si polenta loco sumatur: quod & decoctum
eorum in potu præstat.

Prunus. Cap. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed
stomachū malè habet, aluum millit. Syriaca
pruna, et præcipuè quæ Damasci gignūtur, exicca-
ta stomacho utilia sunt. aluū adstringūt. Folia prū-
ni i uino decocta collutiōe, et gargarizatu uia, gin-
guas, et tōsillas fluxiōe laborāteis reprimūt. Præ-
stāt idē syluestriū prunorū bacca, post maturitatē
exiccata, cū sapa uero decocta, stomacho utiliores

reddūtur aluūq; magis adstringūt. Gūmi prunorū
agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex
aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. Cap. CXXXVIII.

Arbutus, siue vnedo, arbor est cotoneæ malo
nō dissimilis, tenui folio: * cuius fructus pru-
ni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic * Prunis
memaculo cognomen est: maturus aut flauet, aut magnitu-
rubesceat, in esu acorosus, stomacho aduersatur, capi dine quæ-
tisq; dolorem mouet. dem hic

Amygdalæ. Cap. CXXXIX. fructus

Amygdalæ amaræ radicum tritarum decoctū nequa-
vilia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idem quam ce-
minius præstant, menses admotæ ciunt, capitis do- dit: cete-
lori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cū ace- rùm effi-
to vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, item pu- gie adeo
trescentia vlcera, & quæ serpunt, et morsus canū expresse
cum melle: earum aut esu dolores finiuntur, aluum refert fra-
emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient, contra ga, vt nil
sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur, re- queat ex
num vitijs, & pulmonum inflammationibus ex pressius.
aqua in potu aut eclegmate cum resina terebinthi-
na dantur: calculosis difficiliq; vrina in passo auxi-
liantur, & illinctu cum melle, & lacte hepaticis,
tussi, et inflationibus coli, nucis auellane magnitu-
dine: quinis septenisue præsumptis ebrietatem non
sentiunt potiores: vulpes, si cū quadam esca eas vo-
rauerint, emoriūtur. Gummi eius calfacit, & ad-

Stringit: reuſcientibus ſanguinem, potū auxilio eſt;
 impetigines, quæ ſummum corpus occuparunt, illi-
 tum cum aceto tollit: tuſſi vetuſtæ cum diluto vino
 potum medetur: calculoſis cū paſſo bibere prodeſt.
 Enucibus græcis dulces cibo idoneæ ſed multò mi-
 nus valent in remedijs, quàm amara attamen ex-
 tenuant, vrinam ciunt, recentium eſu cum ſuo pu-
 tamine, humida ſtomachi vitia emendantur.

Piltacia. Cap. CXL.

PIltacia, quæ conſtat in Syria gigni, pineis nuc-
 eibus ſimilia ſunt, & ſtomacho amica: trita
 cum vino contra ſerpentiū iſtus proſunt, ſiue edan-
 tur, ſiue bibantur.

Nux iuglans. Cap. CXLI.

NVces iuglandes, quas nonnulli Perſicas vo-
 cant, ſunt difficiles concoctu, ſtomacho inuti-
 les, bilioſæ, capitis dolorem inferentes, tuſſientibus
 inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cum ru-
 ta vero & ficis præſumptæ, & à ſummo cibo, ve-
 nenis reſiſtunt: nec minus ſi à veneni hauſtu come-
 dantur: largius eſitate tineaſ latas pellunt, illinun-
 tur mammarum inflammationi, abſceſſibus, luxa-
 tiſq; cum mellis exiguo, et ruta: cum capæ autem,
 ſale & melle, canis hominiſq; morſui proſciunt: tor-
 mina, cum calyce ſuo peruſtæ, & vmbilico admo-
 tæ, ſedant. Putamen combuſtum tritumq; in oleo,
 & vino, infantium capite peruncto, nutrit capil-
 lum, alopecias replet. Siſtunt menſes nuclei vſti, ſi

tritū ex vino admoueantur: ſedem ē veteribus, illi
carbunculis, gangrenis, & agilopijs medetur: alo
pecijs cōmāducātī, et impoſiti p̄ſenti ſunt remedio.
Nucibus tuſis oleū exprimitur. Recentes ſtomacho
innocētiores ſunt, vtpote ſuaniores: itaq; allio miſtæ
eximūt acrimoniā. Liuires incorpore illitu tollunt.

Nuces auellanae. Cap. CXLII.

Nuces auellanae, quas & leptocarya vocant,
ſtomacho infeſtæ ſunt: ipſæ tamen tritæ, et
in aqua mulſa potæ, tuſi veteri medentur: toſte et
cum exiguo piperis potæ deſtillationem cōcoquant,
crematurū cinis cū axungia aut adipe vſi perun-
ctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli vſtæ
earum putamina, & in cineris ſpeciem redacta, cū
oleo, caſſiorum oculorum pupillas infantibus deni-
grare, perfuſo ſincipite.

Morus. Cap. CXLIII.

Morus arbor nota eſt, cuius fructus aluū
ſoluit, ſtomacho inutilis eſt, & facilē corru-
ptionem ſentit. Hoc idem præſtat mori ſuccus: deco-
ctus autem æreo vaſe, atque inſolatus, adſtringen-
tior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonſil-
larum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed
inoleſcit vis eius, adiecto ſciſſili alumine, galla, cro-
co, & myrrha: item myricæ ſemine, iri, & iſthure.
Immatura mori poma ſiccantur, tuſaq; acinorum
rhois vice obſonijs miſcetur, vt cœliacos iuuēt. Ra-
lis cortex decoctus in aqua et potus aluū reſoluit,

DIOSCORIDIS

latus ventris tinea excutit, his quoq; auxiliatur, qui aconitum hauserunt, Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, vitium & fici nigra frondibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

Sycomorus. Cap. CXLIII.

Sycomorum aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramis, vt ficus, sed caulice, ipso caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus: vbi prouentu fecundo restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum aluo vtile est, sed perquam exilem praebet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis istu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cora

tex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma exci-
pitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili va-
se reponitur. Vis succi emollit, vulnera cōglutinat,
discutit collectiones coctioni repugnantes bibitur
etiam aut illinitur contra serpentium morsus, du-
ratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Ce-
lerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro ar-
bor genere distans, quæ cū sit vlmus, prædita ta-
men est folijs sycomori, fructu pruni magnitudi-
ne, multo dulciore, supradictis cetera similis.

Fici. Cap. CXLV.

Fici maturæ recentes stomachum ledunt, aluū
soluunt: sed faciliè contracta ab eis fluxio sisti-
tur: sudorem euocant, papulasq; sitim sedant, calo-
rem restinguunt. Siccis natura excaīfaciendi, vires
aluunt, sed sitim magis stimulant, aluo vtilis, rheu-
matismis ventris & stomachi contraria: gutturi
autē, arterie, renibus, vesicæ, & ijs, quos longa va-
letudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comi-
tialibus aptissima: seruæ factæ cum hyssopo & po-
te, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisq; pul-
monum vitijs conueniunt: aluum molliunt tussē cō-
nitro & enico, dein manducate. Decoctum arte-
rie & tonsillarum inflammationibus gargariza-
tu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus
miscentur, & in muliebres fetus cum fœnogræco
& ptisana, Ceterū cum ruta coctæ torminibus
insunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutunt, pa-

DIOSCORIDIS

cior ipso semine. Gummi defert, quod dētium canis
imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma.

Cap CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturi-
tatis vigore, autumnno decerpi solet, Arabici
myrobalani similis pomatis cognomine, colore viri-
di, & odore mali cotonei. quod si ad maturitatem
peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma a-
cerba est & adstringens: contra alui fœminarūq;
profluvia, in uino austero bibitur: hæmorrhoidas fi-
stis, uulnera glutinat illitu. Phœnecobalani recētes
plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt,
copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem ex-
creantibus, Stomachicis, & dysentericis vtilis in ci-
bo: illinuntur cum cotoneo & terato tenanthino ve-
sica vitij. Cariota, præsertim esu, faucium asperi-
tati medentur. Thebaicarum decoctum potu & stua-
tionem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri
sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad ea-
dem conueniens. Decoctum per se potu & gargari-
zatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei
palmarum, cæterorum more, cremati in crudo ficti-
li, & vino restincti, cinere loto, spody vicem effi-
ciunt: miscenturq; in calliblephara, Quod si non ius-
tam vstionem acceperint, denuo cremandi. Vim ad-
stringendi habent, & spiracula cutis obductu suo
claudunt: contra oculorum vnam & pustulas,
palpebrarum defluvia, cum nardo effectum præ-
bent:

bent: corporis excrescentias cum vino reprimunt, vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas viles ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. Cap. CXXVI.

P Alma, quam aliqui elatē aut spatham appellant, fructus palmarum adhuc florētium, inuolucrum est calyxq; quo in spissamenta vnguentarū vtūtur. Optima habetur odorata, adstringēs ponderosa, praelusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit vlcera quae depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatibus et malagmitis: prodest praecordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat datur bibendum congruē, renum, vesicae, & viscerum vitijs: vuluae ac ventris fluxiones sistit: scabiē cum resina, & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutusq; in ea elate fructus, quē suo aplexu fouet, elate ēt vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathae effectus praestat, nō sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recēs in cibo, aut decocta eadē facit, quae borassus.

Malum punicum. Cap. CXXVII.

M Alum punicum omne boni succi est, stomacho vtile, perexiguum sufficiens alimentū. Dulcia stomacho vtiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt.

Vulgo
malum
granatū

æstuantî stomacho auxiliantur, & multò magis
 contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivasq; læ-
 dunt. Vinosa vero mediam sortiuntur naturam.
 Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & ob-
 sonijs insp. rsi, concoctive, fluentem aluum stomæ-
 chumq; sistunt. Cœlesti aqua madescunt, bibun-
 turq; commodè sanguinem excreantibus: ad deses-
 sus dysentericorum, sceminarumq; fluxione vulvæ
 laborantium vtilis sunt. Expressus nucleorum suc-
 cus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, et sedis
 vlcera, nomias, reduvias, & ea, quæ in corpore ex-
 tuberant, aurium dolores, & narium vitia: præfer-
 tim acidorum. Huius flores cytini vocantur: qui
 adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta gluti-
 vant, quas punicum præstant utilitates: humida
 gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluun-
 tur, herniam prolapsu intestini erumpentem cata-
 plasmate repellunt. memorie tradunt, qui tres quæ-
 minimos cytinis deuorauerit, nullam eo anno lip-
 pitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exem-
 plo. Malicorium, asperum est mali punici putae-
 men, quod aliqui sidon appellant. Id spissandi vim
 habet, & quos cytini, præbet vsus. Decoctum ra-
 dicis potu latus ventris tinea pellit, & easdem
 euocat. Balauſtium syluestris punici flos est, cy-
 tino similis, cuius complura genera reperiuntur:
 candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo ex-
 primitur, hypocistidis modo, cui adstrictoria vis

Cytinus

Malico-
rium.Balauſ-
tium.

inest, eadem faciens, quæ hypocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina quam candida, & in hoc genere multo magis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eosdem effectus exhibet: Stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctum capillum tingit, ius decocti in vino ulcera in extremis membris nata sanat, oculorum inflammationes illitum cum polline polentæ lenit, contra agilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruescens aliquantum eius semine exprimatur aliàs enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus. Utile procidetia valvarum in defectionibus, sedis vitij, & foemina fluxione vulvæ laborantibus: purgat fursures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas vocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defectiones balnearum convenit, & contra laxatos artus, & malè solidescences. Eo fracta feruminationi repugnantia utilissimè foveantur, viti

DIOSCORIDIS

capillos demigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt, & admisto emphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas & condylomata. Arentium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumq; perfusiones, cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus aduso vetere vino aut aqua celesti, cuius recentis vsus est: nam exiccatus plane cariem sentit, & vires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inequabile, verrucosum intumescensq;, & concolor: quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. Magis quam myrtus adstringit: tusum addito austero vino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra, multo efficacius, & folio et semine, cerato, pessis, in sessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est.

Cerasia. Cap. CXXIX.

Cerasia aluo vtilia sunt, si viridia sumantur: eadem siccata, illam sistunt. Gummi, quod cerasi resudarunt, cum vino diluto tussi vetusta medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur, al-
uum soluant: eadem siccata sistunt stoma-
choq; utiliores fiunt. Vrinam ciunt: sed præ-
cipuè, quæ vinaceis condiuntur.

Mali. Cap. CXXXI.

Folia, flores, & germina cum omnis mali, tum
maximè cotonea adstringunt. Pomis acerbis
adstringendi vis inest: maturis vero longè secus.
Ea ijs vernabilem gignunt, nervos omnes laedunt,
inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, vri-
nam ciunt: verum tostata mittiora habentur. Pro-
sunt coeliacis, dysentericis, purulenta extusionibus
cholericis, præsertim crudæ. Maceratorum liquor
commode in stomachi aut ventris fluxionibus, po-
tui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoi-
cis salutaris est. Decocto foveantur vulnæ, & se-
des si procidant. Cotonea, quæ melle condiuntur,
urinam mouent: mel autem sibi constringentem il-
lorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum
melle coquantur, stomacho atq; ori gratiora sunt,
sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adij-
ciuntur, adcolibendam aluum, aut si stomachus
æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mamma-
rum inflammationes, præduros lienes, & condylo-
mata. Fit vinum ex ipsis tuis expressisq;: sed quò
perduret, quindecim sextarijs succi vnus mellis
adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest

ad omnia que dicta sunt. Fit et oleum ex ijs, quod melinum vocauimus, quo utimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, que sanè sunt rotunda, parua & odorata: que vero Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, que adstrictionem desiderat, inflammationibus oculorū, reiectionibusq; sanguinis. Contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. Melimela uentrem molliūt, & ab eo animalia expellunt stomacho negotium exhibent. Aestiuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, que Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia: sistunt aluum, urinas euocant, malis tamen cotoneis mualidiora. Syluestria mala similia sunt nernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatūra oīa opus sunt. Persica poma matura tā stomacho, quā uentri utilia sunt. Acerba aluum cohibent: sed sicca uehementius. Decoctum ē siccis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, que à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala Persicæ aut cedromela, que Latini citria uocāt, nemini nō cognita. Arbor ipsa oībus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cū grauitate adoratum, semē habet pyri. Id in uino potum uenenis resistit aluum mouet, oris suauitatem cōmenda

dat, decocto eius colluto, aut succo: æstur in malacia mulieribus: uestiarijs impositum ab erosionis initio uestes uimicare existimatur.

Pyra.

Cap. CXXXII.

PYrorū multa genera, quæ tamen oīa adstringunt: promde adduntur cōueniēter in repellentia cataplasmata. Decoctū ē siccis & cruda ipsa aluū sistunt: ieiunos esitata lædunt. Achras pyrastri genus est, quod tardissimè ematurescit. Vim pyro adstringētiorē habet, et ad eadē conuenit: stringunt et eius folia. Ligni pyrorū cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. Cap. CXXXIII.

MESPILUS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio pyracæthæ. fert pomū suauē exiguū malo nō dissimile, tribus intus ossiculis: quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esus adstringit, stomacho gratū est, aluūq; supprimit. Alterū mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setaniū, alij epimelida uocāt Arbor folijs mali, sed minoribus: pomū fert rotūdum esui aptū, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. Cap. CXXXIIII.

LOTUS arbor est ualde magnitudinis ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gra-

tam, Stomacho facilem. Aluū sistit baccis. Ramē
torum ligni decoctum siue potu, siue infusione dys-
sentericis ac fœminis fluxione vulue laborantibus
auxilio est rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus. Cap. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferēs oliue mo-
do oblongas, quæ primū uirent, dein per ma-
turitatem rubescunt, aut cera colorem repræse-
tant. In cibo adstringunt, profluuio alui atque dys-
senterię salutare, siue in edulio, siue in defruto ex-
hibeantur. Muria, ut oliue, condiuntur. Sanies, quā
uirementia folia torrendo resudarunt, impetigini con-
uenienter illiuntur.

Sorba. Cap. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referētia prius, quā ma-
turecant, dissecta & sole siccata manduntur,
ut album sistant. Eadem est functio molitorum fa-
rine, si polente loco sumatur: quod & decoctum
eorum in potu præstat.

Prunus. Cap. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed
stomachū malè habet, aluum millit. Syriaca
pruna, et præcipuè quæ Damasci gignūtur, exicca-
ta stomacho utilia sunt. aluū adstringūt. Folia pru-
ni i uino decocta collutiōe, et gargarizatu uisā gin-
giuas, et tōsillas fluxiōe laborāteis reprimūt. Præ-
stāt idē syluestriū prunorū bacca, post maturitatē
exiccata, cū sapa uerò decocta, stomacho utiliores

redduntur aliuq; magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. Cap. CXXXVIII.

Arbutus, siue vnedo, arbor est cotonea malo non dissimilis, tenui folio: * cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic * Prunis memaculo cognomen est: maturus aut flauet, aut magnitus rubescit, in esu acorosus, stomacho aduersatur, capidine quicisq; dolorem mouet. dem hic

Amygdalæ. Cap. CXXXIX. fructus

Amygdalæ amara radicum tritarum decoctum nequa = vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idem quam ce minus prestant, menses admotæ ciunt, capitis do dit: cete lori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cū ace rum effi to vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, item pu gie adeo trescentia vlcera, & quæ serpunt, et morsus canū expresse cum melle: earum aut esu dolores finiuntur, aluum refert fra emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient, contra ga, vt nil sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur, re queat ex num vitys, & pulmonum inflammacionibus ex pressius. aqua in potu aut eclegmate cum resina terebinthia dantur: calculosis difficiliq; vrinæ in passo auxiliantur, & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, et inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine: quinis septenisue præsumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vulpes, si cū quadam esca eas vocauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & ad

Stringit: reſcientibus ſanguinem, potū auxilio eſt;
 impetigines, quæ ſummum corpus occuparunt, illi-
 tum cum aceto tollit: tuſſi vetuſtæ cum diluto vino
 potum medetur: calculoſis cū paſſo bibere prodeſt.
 Enucibus græcis dulces cibo idoneæ ſed multo mi-
 nus valent in remedijs, quàm amare attamen ex-
 tenuant, vrinam ciunt, recentium eſu cum ſuo pu-
 tamine, humida ſtomachi vitia emendantur.

Piltacia. Cap. CXL.

Piltacia, quæ conſtat in Syria gigni, pineis nuc-
 eibus ſimilia ſunt, & ſtomacho amica: trita
 cum vino contra ſerpentiū ictus proſunt, ſiue edan-
 tur, ſiue bibantur.

Nux iuglans. Cap. CXLI.

NVces iuglandes, quas nonnulli Perſicas vo-
 cant, ſunt difficiles concoctu, ſtomacho inuti-
 les, bilioſæ, capitis dolorem inferentes, tuſſientibus
 inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cum ru-
 ta vero & ficis præſumptæ, & à ſummo cibo, ve-
 nenis reſiſtunt: nec minus ſi à veneni hauſtu come-
 dantur: largius eſitate tineas latas pellunt, illinun-
 tur mammarum inflammationi, abſceſſibus, luxa-
 tijsq; cum mellis exiguo, et ruta: cum capæ autem,
 ſale & melle, canis hominisq; morſui proſiciunt: tor-
 mina, cum calyce ſuo peruſtæ, & vmbilico admo-
 tæ, ſedant. Putamen combuſtum tritumq; in oleo,
 & vino, infantium capite peruſcto, nutrit capil-
 lum, alopecias replet. Siſtunt menſes nuclei vſti, ſi

triti ex vino admoucantur: ydem e veteribus, illi carbunculis, gangrenis, & agilopijs medetur: alopecijs comaducati, et impositi p'senti sunt remedio. Nucibus tussis oleu exprimitur. Recentes stomacho innocetiores sunt, vtpote suauiores: itaq; allio mista eximut acrimonia. Liores in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanæ. Cap. CXLII.

Nuces auellanæ, quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, et in aqua mulsa potæ, tussi veteri medentur: toste et cum exiguo piperis potæ destillationem cōcoquunt, crematuru cinis cū axungia aut adipe vrsi perun- Etus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cū oleo, cæsiſſorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sincipite.

Morus. Cap. CXLIII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus: decoctus autem æreo vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inoleſcit vis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myricæ semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhois vice obsonijs miscetur, vt coeliacos iuuēt. Rallicis cortex decoctus in aqua et potus aluum resoluit,

DIOSCORIDIS

latus ventris tinea excutit, his quoq; auxiliatur,
qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita,
ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, vitium
& fici nigra frondibus simul coctis in aqua caele-
sti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra
phalangiorum morsus auxilio est. Feruesacti corti-
cis & foliorum iure dentes aptissime in dolore col-
luuntur. Radix circiter messem incisa, facto in am-
bitu scrobe succum emittit, qui postridie concretus
inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tuber-
cula discutit, & aluum purgat.

Sycomorus.

Cap. CXLIIII.

SYcomorum aliqui etiam sycaminum, id est,
morum, vocant, cuius fructus sycomorum
etiam propter inefficacem gustum appellas-
tur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo
lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater
anno fert, non ramis, vt ficus, sed caudice, ipso ca-
prisco non dissimile, dulcius grossis, sine granis in-
terioribus: quod non maturescit, nisi vngue aut fer-
ro scalpatur. Nasitur plurimum in Caria, Rhodo, lo-
cisq; non multi tritici feracibus: vbi prouentu foe-
cundo restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonae
caritas premit. Pomum aluo vtile est, sed perquam
exilem praebet alimoniam. Stomacho aduersatur.
Succus primo vere tenera arbore, antequam fru-
ctum ferat, eximitur, lapidis iclu summo cortice
desquamato: si enim altiore plaga violetur cora-

tex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma exci-
 pitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili va-
 se reponitur. Vis succi emollit, vulnera coagulat,
 discutit collectiones coctioni repugnantes bibitur
 etiam aut illinitur contra serpentium morsus, dua-
 ratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Ce-
 lerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro ar-
 bor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita ta-
 men est folijs sycomori, fructu pruni magnitudi-
 ne, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Fici.

Cap. CXLV.

Fici maturæ recentes stomachum ledunt, aluiū
 solvunt: sed facile contracta ab eis fluxio sisti-
 tur: sudorem euocant, papulasq; sitim sedant, calo-
 rem restinguunt. Siccis natura excalescendi, vires
 alunt, sed sitim magis stimulant, aluo vtilis, rheu-
 matismis ventris & stomachi contraria: gutturi
 autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs, quos longa va-
 letudo decoloravit, anhelatoribus, hydropicis, comi-
 tialibus aptissima: servata cum hyssopo & po-
 te, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisq; pul-
 monum vitijs conveniunt: aluum molliunt tussæ cō-
 nitro & enico, dein manducata. Decoctum artes-
 riæ & tonsillarum inflammationibus gargariza-
 tu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus
 miscetur, & in muliebres fatus cum sænogræco
 & ptisana, Ceterum cum ruta coctæ torminibus
 insunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutunt, pa-

DIOSCORIDIS

rotidas & furunculos emollunt, panos ad maturam
 tionem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce addi-
 ta. Crude si cum antedictis tundantur, eadem effi-
 ciunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atra-
 mēto sutorio, deploratis fere tibiarum fluxionibus,
 & cacoethicis viceribus medentur: quin & cum
 vino decoctæ ahlito absynthio, & hordeacea fari-
 na, vtilissimè hydropicis illinuntur. Cremata cum
 cerato sanant perniones, prurigines, sonitusq; si cru-
 de terantur, et sinapi liquoreq; aliquo exceptæ au-
 ribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sativæ fici
 lacteus succus coaguli mo-lo lac contrahit, concre-
 tumq; dissolvit, vt acetum: exulcerat corpora, meas-
 tus aperit, solvit alium, vulnam recludit cū detri-
 ta muce græca potus, menstrua ciet cum luteo ovi
 appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum ca-
 raplasmatibus cum farina fœnigræci et aceto utilis:
 lepras, lichenas, vitilignes, vitia cutis in facie, pso-
 ras, vlcer. i in capite manantia, cum polenta expur-
 gat: instillatus plagæ, percussus à scorpione, venena-
 torum ictibus & rabiosi canis morsibus auxilia-
 tur: prodest dentium dolori lana exceptus, & ca-
 nis eorum additus: verrucarū in fornicationes tol-
 lit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem
 præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, quæ
 lacte prægnantes, silentæ adhuc oculo, tusi exprimū-
 tur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & suc-
 cus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Deco-

Eti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem
afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis so-
nat, si inter coquendum ficulneo surculo spathe lo-
co moveatur.

Grossi.

Cap. CXLVI.

GRossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ, illitæ
strumas nodosq; omneis emolliunt: crudæ sor-
micas, verrucas & thymos, nitro farinaq; additis,
tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & ace-
to ulcera in capite manantia, epinyctidas, & fur-
fures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & genarum
scabritie perfricantur. Nigræ ficus folijs caulicu-
lisq; candidæ vitiligines perunguntur, faciunt ad ca-
num morsus, & ulcera quæ ceria, id est fauos, vo-
cant. Grossi cū sylvestris papaveris folijs ossa ex-
trahant, furunculos cū cera discutiunt, cōtra muris-
aranei morsus, & scolopendræ venena, cū eruo &
vino illite, auxiliatur. Fit ex cinere ficus tam sylve-
stris quā sativæ lixiuium, crematis ramorum caulicu-
lis: quod subinde macerari opus est et ineterascere:
siquidē inter caustica intelligitur. Gangranis pro-
dest: manq; expurgat & consumit, quæ excrescunt:
eōq; sic utendū est. Spongia assidue hoc lixiuium im-
buta superponitur. Interdum dysentericis, et in flu-
xiones vetustas, & sinus cuniculatim ex edentes,
magnosq; instillari conveniet. Etenim purgat, con-
glutinat, carne replet, & oras committit, nō secus
atq; emplastra, quæ ruentis vulneribus iniunguntur.

ter, enema vocāt. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, convulsa, cum cyatho aque recenter colatum: addito olei exiguo, coeliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest: nervorum vitijs, convulsionibus commode illinitur ex oleo, utpote quod sudores moveat adversus gypsi potum, & phalangiorum morsus bibitur. Hac eadem præstant reliqua lixivia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea.

Cap. CXLVII.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens & bo idoneum, stomacho vtilem: in quo phalangia cranocolapta nomine inveniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitis sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis.

Cap. CXLVIII.

Iberis, siue cardamantica, folia habet nasturtij, vere virentiora: caulem cubitalem, aut minorem in incultis nascitur, æstate lacteū florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes. ipse enim ischiadialis cum salsa axungia emplastri modo vtilis, quaternis horis alligata, ut deinde in balneas descendatur, et postea oleo cum lana locus perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

Pedanij

PEDANI⁵⁷
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA,

LIBER II.

IOANNE RVELIO SVESSIO
nensi interprete.



LN primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia cōdidimus, de arom. atibus, oleis, vnguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; differimus. In hoc aut secundo de animalibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexus herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cū ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Echinus, siue erinaceus. Cap. I.

Marinus echinus stomacho vëtriq; utilis est: urinam cit, huius testa cruda inassata commode medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt: cremate vero cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat. Terrestris erinacei

DIOSCORIDIS

corium combustum alopecijis cū pice liquida aptissimè illinitur, assiccatum corpus & cum aceto mulso potum, renum vitij auxilio est item aqua, quæ cutem subijt, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem vsus vtilissimè reconditur.

Hippocampus. Cap. II.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

Purpura buccina, eorumque volutæ. Cap. III.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrementas in carne cohibet, vlcera purgat, et ad cicatricem perducit. Eadem præstant concremata buccina, sed vehemētius vrunt: si quis salis plena, fictili crudo adurat, dentifricio cōueniūt: ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentū non oportet: nam postea quàm vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modū induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus. Cionia vocantur purpurarum buccinarumq; mediæ partes, circa quas testæ volūmen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisq; facultatem vrēdi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obti-

uent. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho vtilis: sed aluum non molliunt.

Mituli.

Cap. IIII.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum mele vtilis habetur: generum transiudices absument, albugines purgant, & cetera quæ oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus vtilissimè imponuntur.

Tellinæ.

Cap. V.

Recentes tellinæ aluo vtilis, sed maximè ius earum salitæ vruntur, tritaq; in cinerem et cum cedria instillatæ, auulsos pilos & renasci non patiuntur.

τῶ βλε
φάγων.

Chamæ.

Cap. VI.

Chamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus.

Cap. VII.

Vnguis siue onyx conchilij tegumentum est, ei simile quo purpura integitur: quod in Indis nardiferis lacubus inuenitur. suauem ideo spirans odorem, quod conchyliis inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquam stagnantes aquæ aestiuis caloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari deferitur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo

DIOSCORIDIS

odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus castoreo
olent. Nidem suffitu excitant foeminas vniue strā
gulati uo pressas, comitialesq;: poti ventrem mol-
liunt. Crematum conchylum eadem efficit, quē
purpura & buccinum.

Cochleæ. Cap. VIII.

Terrestres cochleæ stomacho vtilis sunt, &
non facile corrumpuntur. Optima Sardonia
te, Aphrica, Astypaleica, & quæ in Sicilia, ac
Chio signuntur, & quæ in Ligurie alpibus, poma-
tie, id est operculares, cognominatæ. Marina stoma-
cho idonea, & facile alio excernitur: fluminalis vi-
rus olet. Quæ vero reprobis fructetisq; glutinata
coheret, quam vocant nonnulli sesilon, ventrem et
stomachum turbat, vomitiones excitat. Cremata
omnium testæ excalfaciendi & vrendi naturam
fortiuntur: purgāt lepras, vitiliginis, dentesq;: emē
dant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie,
albugines, ac visus hebetudines, si cum carne sua
vstæ tritaq; ex melle illinantur. Cruda cum tegu-
mentis imposita, aquæ inter cutem tumores exi-
gunt: sed non antè soluantur, quàm omnis hauria-
tur humor. podagricas inflammationes leniunt, im-
pactos corpori aculeos illitæ euocant, menses trita
& admota cient. Carnes earum cum thure &
myrrha illitæ, cū vulnera alia, tum maximè quæ
nerui acceperunt, conglutinant: trita in aceto, san-
guinem naribus erumpentem infrenant: vine cor-

pius, & præsertim Aphricana, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat, trita cum testâ, vino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli vesicæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incômodos repucat, si quis abraço aculêtoe eius, pilũ attingat.

Cancri.

Cap. IX.

CAncrorum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cû vino, magnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum sedisq; perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit: triti crudi, potiû ex asinino lacte, auxiliantur cõtra serpentium phalangiorumq; morsus, atque scorpionum ictus: decocti autem & cû iure esitatis, ijs prosunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt necant scorpiones triti, et cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verum inefficacius omnia præstant.

Terrestris scorpio.

Cap. X.

Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ plâgæ remedium est quin estur assatus, ad eadẽ.

Marinus scorpio.

Cap. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus.

Cap. XII.

Draco marinus dissectus & apertus impositusq; ictus spinæ suæ qua ferit, medela est,

DIOSCORIDIS

Scolopendra. Cap. XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auelli & capillos, sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis. Cap. XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiā mulcet: eadē apposita euersam sedem prociduamq; coerces.

Viperæ. Cap. XV.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, neruorum vitij auxiliantur, incrementos strumas reprimunt: detracta autem cute caput caudaq; quoniam carne vacant, amputari debent, quippe commentitium est quod præcipitur, certam vtrinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum vero corpus exemptis interaneis elotū dissolutumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui viperas esitent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem vipera in fictile nouū demittitur, adijciuntur salis caricarumq; tritarū, singulatim quinq; sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem reconditur. Plerunque, vt ori gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

Senecta anguim. Cap. XVI.

Senectus anguim in vino decocta dolori aurium, infusus, & detium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed precipue viperinam.

Lepus. Cap. XVII.

Lepus marinus loligini parue similis est, qui per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui valetudine contracti sunt: affricu aut cibo facilem infantibus dentitionem praestat: exustum caput & cum adipe vsino aut aceto illitum, alopeciarum inantibus medetur. Leporinum coagulum post triduum a concubitu potum, conceptum adimere, parit: spem intercipere proditur: vuluae & alui fluxum sistit, comitiales iuuat, contra venena ex aceto bibitur, praesertim aduersus coecretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

Pastinaca. Cap. XVIII.

Marine pastinace radix, qui eius cauda enatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.

Sepia. Cap. XIX.

Sepiae cocta dum estur atramentum aegre concoquitur, alium mollit, collyrijs e testa factis conuenienter genarum scabritia perficantur.

DIOSCORIDIS

ustum in sua testa donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitilignes, fures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absomit, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis. Cap. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque dissectus admoueat.

Hippopotamus. Cap. XXI.

Hippopotami testes exiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

Fiber. Cap. XXII.

Fiber ancipitis vite animal, plerumque cum piscibus & cancris ex aqua victum capeſsit. Huius testes serpentium venenis aduersantur, sternutamenta inuent, & in vniuersum varios obtinet vsus: si quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundasque eiciunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāque ex aceto bibuntur: lethargicos, & utcumque uerteno obdormiscētes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illi profunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus nervorum vitiis. In summa, calfactoriam vim habet. Eligi debent testes qui ex vno

ortu connexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui & virus re dolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abici, quum venatu vrgentur: si quidem tangi nequeunt, ita, vt in sue, substricti. Operæ aut pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustella vulgaris. Cap. XXIII.

Mustela, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cū vino pota, aduersus omnia serpentium venena presentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius venterculus coriandro farctus inueteratusq; percussus à serpente, et comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fietili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ, iuuantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ. Cap. XXIIII.

Contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt rane, si ex sale & oleo decocta edantur, iusq; earum itidē sorbeatur: cōtra inueteratos

DIOSCORIDIS

tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis profluens sanguinis impetus sistit, explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illimitur. Viridius ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia emulso instillatus: decoctus in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Silurus.

Cap. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem præbet alium: sale vero conditus, minimum suppeditat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixam corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desiderium fatus adijciatur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

Cap. XXVI.

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras puluillosque reprimat: nomas cohibet, thymos clauosque absument. Caro non secus atque salsamentum prodest a scorpione percussis, aut a cane demorsis.

Mænæ.

Cap. XXVII.

Mænæ ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutione secat.

Gobius.

Cap. XXVIII.

Gobius recens in suillum ventrem coniectus, si confusa rima in duodecim aque sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub di-

no refrigeratus potui detur, alius sine molestia deij-
citur. Allitus contra serpentium canumq; morsus aux-
ilio est. Thunnus. Cap. XXIX.

Conditanei thummi caro, qua omotarichon vo-
cant, sumpta us auxiliatur, quos vipera nomi-
ne prester momorderit: sed oportet vinum quam
plurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomie-
tione reddatur. Contra acrimonias esiatorum ma-
ximè valet, canum morsi bus vilissimè illinitur.

Garum. Cap. XXX.

Garum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale
maceratis liquamen est, si ex eo fons fiat, de-
pascencia vlcera sistit: morsis à cane medetur, dy-
sentericis atque ischiadicis infunditur: nonnullis,
vt exulcerata adurat: alijs autem, ad lateffenda,
qua vlcera non senserunt.

Ius piscium. Cap. XXXI.

Recentium piscium ius, modo per se, modo ex vi-
no potum, alium subducit. Priuatim ad hunc
usum conficitur è phycidibus et scorpionibus, et iuli-
de: è percis, et recetibus alijs saxatilibus, nec virus
resipientibus, simpliciter cū aqua, oleo et anetho.

Cimices lectularii. Cap. XXXII.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, canis fa-
barum inclusi, si ante febrim significationes
septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: et citra
fabas sumpti, percussis ab aspide prosunt: vulua-
rum exanimationes olfactu renocant: poti cū vino

D I O S C O R I D I S

aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: tritū
et vrinariæ fistulæ impositū, vrinæ angustias leuāt.

Millepeda. Cap. XXXIII.

Millepeda, quæ sub aquario vase stabulatur,
animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ
contacta manu contrahuntur in orbem: hæ ex vino
potæ difficili vrinæ, & regio morbo auxiliantur.
Millepedas illini anginis cum melle vtilissimū. Tri-
ta, et in cortice mali punici calfactæ, doloribus au-
rium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Blatta pistrinaria. Cap. XXXIIII.

Blatte eius, quæ in pistrinis inuenitur, intera-
nea trita aut cum oleo decocta, aurium dolo-
res instillatu mitigant.

Pulmones. Cap. XXXV.

Podagras pernionesq; emēdat pulmo marinus.
recens, tritus & illitus. Suillus & agnus
vrsinusq; pulmo impositu attritus à calceamentis
contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus ve-
rosi arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps
quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

Genitale cerui. Cap. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potum, à vi-
pera demorsis auxiliatur.

Vngula asini. Cap. XXXVII.

Vngularum asini cinis per dies multos binis
cochlearibus potus proditur comitiales adiu-
uare, eadem oleo subactæ strumas discutunt: &

illite pernionibus medentur. Caprinarum cinere
eruncta ex aceto alopecia sanantur.

ichenes equorum. Cap. XXXVIII.

Ichenes sunt in equorum genibus, & * super * *κατ*
ungulas in flexu harum partium indurati cal *ε' οινω*
li: qui triti & in aceto poti, comitialibus mederi *φιν, non*
traduntur. *ε' πικραε*
φιν.

Iocinera. Cap. XXXIX.

ASini iecur inassatū esu comitialibus prodest,
veruntamen ieiunis edendum precipitur. Ca
pre vero inassati lecidua sunt, inūgi lusciosos pro
dest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius
vaporari prodest in cibo tostum ad eadem. Tradūt
hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Apri
num recens si arefactum teratur, ex vino potum
contra serpentium volucrumq; morsus auxilio est.
Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum & in ci
bo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aque
tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aque
panores dentes eo, qui caninus dicitur. hunc a ca
ne, qui momordit, exemptum, & follicullo inditū,
pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum au
tem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis
potum, secundas pellit.

Coria veteramentaria. Cap. XL.

VEteris corū cremati illitus cinis ambusta
igni, intertrigines, necnon calceamentorum
atritus sanat.

DIOSCORIDIS

Gallinæ

Cap. XLI.

Diffecta gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus, sanguinem à cerebri membrana profluentē sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea vero inter coquendum abijci solet) siccatur, tritaq; in vino convenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è vetere gallinaceo aluum deijcit. Abiectis itaque interaneis salem coniungi oportet, & consuto ventre decoqui in viginti sextarijs aquis, donec ad treis heminas redigatur. totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, onicum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit prædest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, et inflammationibus stomachi.

Quorum natura.

Cap. XLII.

Ovum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Uterum oui, contra oculorum dolores utile est: massatum sedis inflammationibus prædest, cum croco, & rosaceo: & condylomatis: cum meilotō: cum uua autem fruticis eius, quem rhoēdicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo alios sistat: per se etiam offerri solet. Candidum ovi crudum refrigerat spiramenta cutis occludit, in-

flammationes oculorum infusum lenit, ambusta;
 si statim eo perungantur, pustulas nō sentiunt: fa-
 cicem à Solis adustione tuetur, fronti impositum cū
 thure fluxiones arcet, auertit q̃; inflāmationes ocu-
 lorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & ui-
 no, mitigat: utiliter contra hæmorrhoidis serpentis
 morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest
 uesticæ rofionibus, renum exulcerationibus, gutturis
 scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus,
 & thoracis rheumatismis.

Cicadæ. Cap. XLIII.

Cicadæ, quæ inassatæ manduntur, uesticæ dolo-
 ribus prosunt.

Locustæ. Cap. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu urinæ difficultates ad-
 iuuant, præsertim quæ scēminas malè habēt:
 earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam
 genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine
 pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex
 uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere
 proderit. Hac abunde nescuntur Aphri, qui Ieptim
 incolunt.

Ossifragus. Cap. XLV.

Venter eius auis, quam Latini ossifragum ap-
 pellant, particulatim potus, calculos cum lo-
 tio pellere proditur.

Galerita. Cap. XLVI.

Galerita auicula est parua, apicem in uer-

DIOSCORIDIS

tice, panonis modo, gestans : que assa, & in cibo sumpta, celiacos adiuuat.

Hirundines. Cap. XLVII.

Dissectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo ad alligati, comitialibus proderunt, & sepe prorsus eos recreabunt. Hirundines, vti sicedulae, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quam matrū in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginæ eo commodè perunguntur: vne & consilliarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pōdere ex aqua bibantur, hos iuuat, qui anginæ morbo cōsistuntur.

Ebur. Cap. XLVIII.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vini adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. Cap. XLIX.

Svis talus cōburitur, dum è nigro albescat : qui stritus & potus inflationibus coli, longisq; torminibus medetur.

Ceruinum cornu. Cap. L.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, calicis, regio morbo, & vesica doloribus

cum tragacantha: sceminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, et defluxionibus salutare est: infictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes sugantur: seruefactum in aceto, si eo gingiuæ colluantur, maxillarum à dētitione dolorem adimit.

Eruca Cap. LI.

Erucis, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides. Cap. LII.

ERumentis congestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro luteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec a stibis exanimentur postea lino transfixæ reponuntur. Potentißimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ. Cap. LIII.

Simili modo reconduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis ero-

dere, ulcerare, calorem elicere: quæ de causa admi-
scentur medicamentis, quæ lepras, ferasq; lichenas
& carcinomata sanant. Menses cunctis pestis emol-
lientibus addita. Aliqui cantharidas antidotis
impositas, aquæ subter cutem auxiliari produce-
runt: argumento, quòd urinam moveant. Alij pen-
nas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse
tradiderunt.

Salamandra. Cap. LIIII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, varium,
quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim
habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Addi-
tur, ut cantharis, in medicamenta, quorum vis est
exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur.
Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detra-
ctis pedibus & capite in melle servatur ad eun-
dem usum.

Araneus. Cap. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum
vocant, subactus cum splenio, et linteo illitus,
prolatusq; utriusq; temporibus aut fronti, tertianos
circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem
sistit, vulnera, quæ summâ cutem occuparunt, ab
inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum ara-
nei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telâ or-
ditur: quem in aluta ligatum, et lacerto appesum,
quartanis circuitibus mederi narrat. Decoctus ex
rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lacerta.

Cap. LVI.

Lacerta caput intritū, & appositū, aculeos, et oīa corpori infixā extrahit: varos, formicātes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocāt, tollit. Iecur exesi dētibus cōiectū dolores finit. Si diuulsa admoueatur, iētis à scorpione leuamentum praestat.

Seps.

Cap. LVII.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

Scincus.

Cap. LVIII.

Scincus aut Aegypti, aut Indie, aut rubri maris alūnus, quāuis inueniatur in Lydia Mauritāie. Est aut terrestris crocodilus, sui * generis, sale inueteratus cū nasturtio. Aut carnes, quae renes amplectātur, id sibi viriū vēdicasse, ut si drachma potēdere bibātur, venerē accēdant. Verū decocto lentis cū melle aut semine lactucae cum aqua potō, veneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

ἰδιόγε
νῆς καὶ ἀπὶ
κευόμενος
ἐν καὶ ἑῶ
μω

Terreni vermes. Cap. LIX.

Terreni vermes īpositi, precisos nervos glutināt, tertianas discutiūt: decocti cū anserino adipe, et īfusi, aff. Etis auribus medētur: cū oleo autē decocti, si ī cōtrariā aurē instillētur, dētīū doloribus īstāt auxiliū: triti ī potu ex passo vrinā ciūt.

Mus araneus.

Cap. LX.

Mus araneus dissectus, et impositus, sui morsus beneficia luit.

MVres, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis vtilissime imponi, in confesso est si massatos infantes ederint, oris saluam exiccati promittunt.

Lac. Cap. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus alit, aluum emollit, Stomachum & intestina inflatione vexat: verum tamen diutius a stino habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit. Probatur autem candidum, & equali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Alio minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Onillum autem dulce, crassum, & prapingue, non vsque adeò vtile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, veratrum, clematidem, aut mercurialem paescuntur, lac omne ventrem & stomachum subuertit. quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capre, quibus candidum veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: et eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum, precipueq; cadetibus calculis marinis exustum

& in summa, omnibus auxiliatur internis exulce-
 rationibus, præsertim faucium, pulmonis, interas-
 neorum, vesicæ & renum: foris uerò contra pruri-
 tum cutis, eruptiones papularum, & viliat os corpo-
 ris succos, recens cum melle crudo, addito sale, da-
 tur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunq;
 semel seruefactum. Decoctum cū calculis marinis
 ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiunat.
 Lac quodcunque serum continet implicitum, quod
 ubi discessit à lacte, multò potentissimum ad pur-
 gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia vo-
 lumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comi-
 tialibus, lepris, elephantys, & erumpentibus toto
 corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum,
 id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo fer-
 uet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, insparsis, post-
 quam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi-
 cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim serescens
 liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum cōcreuit.
 Sed cū seruet, ne superfundatur, conueniet spongia
 ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sexta-
 riumq; argenteum frigide aquæ plenum demitte-
 re. Bibitur heminis per interualla singulis, vsque
 ad quinas, ita vt intercedentibus spatius, potantes
 ambulent. Lac autem recens efficax est contra ro-
 siones vstionesq; , ab exitialibus medicamentis fa-
 ctas: vti à cantharidibus, aut salamantra, bupre-
 ste aut pinorum eruca, hyosc yami, dorycno, aconi-

to, aut ephemeropresertim bubulum ad id eximie
 confert. Gargarizatur autē exulceratis faucibus,
 tonsillisq;. Asininū peculiariter collutos dentes gin-
 givisq; stabilit. Fluxiones alui si ulcera sentiātur,
 tenesmosq; ouillum, bubulum aut caprinum cum
 marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem &
 cum hordeacea ptisana aut halicaceo cremore in-
 fusum magnopere intestinorum resiones mitigat:
 exulcerate uulue immittitur. Humanū lac dulcis-
 simum est, & maxime alit: mammis autem exu-
 ctum, prodest tibi, & stomachi rofionibus: cōtra
 haustum leporē marinum presidio est. oculis cruo-
 re exictu suffusis cū thuris polline instillatur: po-
 dagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum.
 Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitia-
 libus, uertiginosis, et neruorum uitio laborantibus.
 febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis inter-
 dum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum
 præbeat. Primi paræ canis lacte perunctos narrāt
 glabrescere: potum contra uenena antidoti uicem
 obtinet, abortus mortuos expellit.

Caseus.

Cap. LXIII

Caseus recens sine sale sumptus alit, stomacho
 utilis est, et facile in membra delegatur: cor-
 pus auget, aluum modicè emollit: alijs tamen alio
 præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur.
 Decoctus autem, & expressus, deinde in assatus, al-
 ium sistit: illitus, ocularum inflammationibus, &

sugillatis prodest. Qui uerò recens salutus est, minus alimenti præbet. corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisq; exhibet: uetustiore sistitur aluus. Sero, quod à caeco manant, quam optimè canes aluntur. Quod hippacè uocant, caseus est equinus ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportionis respō let. Nec desunt, qui hippacen, equinū coagulū appellarint. Butyrum & eius fuligo. Cap. LXIIII.

ELacte pinguißimo probatū sit butyrum, quale ouillū est: sit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrū natura oleosum est & emolliens: unde liriū epotum, uentrē resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, cōtra uenena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat: gingiuarū pruritus, et oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimētōrū facit corpora, & ab albidis pustulis per summa factentibus asserit. Contra inflammationes & duritias uulue, quod nec uirus resipit, nec uetustatē sentit, butyrum efficax est. dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur: in medicamēta addi solet, quæ pus mouent: utile præsertim cū nerui, aut cerebri membrana, uesica ceruix, uulnera acceperit. Ad aut purgat, replet, carnē creat, ab aspide percussis utilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem pēsāt, et adipis uice fungitur ī bellarijs. Colligēde ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrū in lucernā no

nam ingestum acceditur, si scilicet operculato quod
superne in siphunculi speciem desinat, & infima
parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, &
subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum co-
aceruetur fulginis modus, quem facere institueris:
penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in
medicamentis oculorum, exiccare & adstringere:
fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem
perducit.

Medicina lanarum. Cap. LXV.

Succide lanae molles, è collo feminibusque lauda-
tissimae habentur. Subueniunt inter initia vul-
neribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fra-
ctis, aceto, oleo aut vino imbutae: si quidem facile suc-
cos combibunt quibus immerguntur, & ob pecudum
sordem. Sic enim œsypum vocant, & emolliunt: ca-
pitis, stomachi, aliarumque partium doloribus, cum
aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Cremata
rum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias
in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit.
Munde autem & carptae, in scilicet crudo, cætero-
rum more, vruntur. Nec secus fimbriati marinarii
purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum
sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque
modo vrunt. Alii in scilicet oris patuli, verucula inter
se distantia componunt, & conceptas carminas-
tasque lanas olivo ita suffusas, ut ne stillare quidem
possint, a sbulis tede subiectis, et eisdem lanisque per-

mutatim interstratis, leuiter succendunt, & vstas tollunt. quod si è teda pix, pinguitudoñe vlla profluat, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare patiuntur: idq; sepius, mutant aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum. Cap. LXVI.

Oesypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succide molles, radicula non curate, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; ipetu ligula, vti respumet, agitatur, aut lignea rude validiusculè cōturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur, considete pingui quod supernatabat. collectoq; in altero fictili vase, denuò aqua in labellum fusa agitatur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum æsypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum lingua æsypum adstringat, leuiter, nec mordeat, atque pingue candidamq; steteretur: cum in fictili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi

da aqua eluunt, & manibus non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius red-
ditur. Alij elotis lanis et sordibus quibuscunq; exē-
ptis, ac lento igne in aeneo vase ex aqua decoctis,
pingue quod supernatat collectam, aqua, ut dixi-
mus, lauant: colactumq; infictilem patellam, quæ
calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque
Soli mandant, donec calidū fiat, & satis crassum
Alij bidui spatio aquam effundunt, nouamq; adij-
ciunt. Melius est læne, radicula non curatum, quod
succidarū uirus oleat, & si manu in concha frice-
tur cū aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut
concreti habēs: ueluti quod cerato aut adipe adul-
teratur. Oesypū excalscit, explet ulcera, et emol-
lit: præsertim sedis ac uulue, cum meliloto & bu-
tyro: in uellere appositum, menses & partus euo-
cat, ulcera non aurium modo sanat, sed et genita-
lium cū anserino adipe: contra erosos angulos ocu-
lorum, scabiososq; genas, quæ occalluerunt, & ci-
liorū defluuia, efficax est. In testa noua torretur,
donec reductū in cinerē pinguitudinē amittat. Ex
eo etiā fuligo colligitur, uti demonstrauimus: quæ
in oculorum medicamenta commodē adli solet.

Coagulum. Cap. LXVII.

LEporis coagulum tribus obolis ex uino, uene-
ratorum moribus, cæliacis, dysentericis, &
fæminis fluxione uulue laborantibus, ac reie-
ctionibus à pectore auxiliatur. Sanguinē in gru-

mos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulue cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant: potum uero partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulū, quam hippacen aliqui uocant, priuatim cæliacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, uituli, bubali que coagula similes naturas sortiuntur: cōtra aconiti potum in uino, et concretū lac in aceto, conueniēter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires representat: comitialibus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cū alterius animalis, tum præcipue agni coagulum, madauerit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur aut capulis, qui nondum natate possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. Cap. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uulue uitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniā concepit, uulue inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, qua altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenti

DIOSCORIDIS

ter vase, flagrantissimo Soli exponitur: eliquescent
inde humor in fictile alterū excolatur, donec adeps
omnis absumatur, mox loco vehementer frigido re-
conditur, & ad vsus digeritur. Alij fictile fulciunt
super aquam calidam, aut tenuem & elanguidā
prunam, quæ Solis vicem penset. Est & alia curā-
di ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq;
in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento:
mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in me-
dicamenta additur, quæ lassitudines & fatigatio-
nes leuant. Suillus adeps & vrsinus hoc curantur
modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum de-
tractus, in largiore aqua cœlesti, & quàm frigidis-
sima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus con-
fricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq;
nova aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis du-
ple inditus, in aquam demergitur, & subditis leui-
bus prunis spatha mouetur: eliquatusque colo-
transfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & gut-
tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-
bet, & manu deprimi, quò facilius faculentum vi-
rus pessum eat: postea in pilam spongia madesa-
ctam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens in imo
sordes eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur,
repurgatusq; fictili benè operculato, perquàm fri-
gido locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum,
ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcūque

tunicis (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pila emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet sed nitida spectetur. Deinde, in ollam fictilem coniucito, & adiecta aqua, vt superemineat, leni pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in persusam liquore pilam colato, refrigeratumq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem suum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutum fuerit, in fictilem ollam coniucendum, et marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pressum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: opertumq; Soli interdum credendum, vt ad candorem reducatur, & odoris virus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperferis, liquefacito: dein in nitentem aquam excolato, & ubi concreescere cœpit, manibus iterum cœ-

DIOSCORIDIS

fricando vehemēter lauato, aqua sepius infusa re-
 fusaq; donec quā optimē elotum videatur: rursus
 in olla cum pari modo vini odorati decoquito,
 & cū iterum efferbuerit, dempto ab igni vase,
 ibidē finito pernoctare: postridie si grauer adhuc
 oleat, noua olla repetitum, vino odorato perfundat-
 ur: eadem qua prius fiant, dum omne virus euane-
 scat Colliquatur & sine sale, praesertim affectio-
 num earū causa, quibus sal aduersari solet, sed ita
 paratum non magnopere albescit. Eodē modo par-
 aorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinū
 autem & vitulinum pingue, necnō ceruinum, atq;
 etiam huius animalis medulla, odoramentis imbu-
 tur, hac ratione: Pingue, quod odoratū reddi debet,
 demptis, quae diximus modō, membranis, elotum
 & vino quā odoratissimo, nulla maris aqua di-
 luto, feruesfactum, pernoctare finitur: alterū id ge-
 nus vinum eadem mēsurā infunditur, colliquatur,
 & exquisitē colatur. nouemq; eius heminis, iunci
 Arabici septem drachmae. Quod si ipsum odoris
 fragrantioris fieri voles, quadrāginta floris eius sē-
 drachmae, cum paribus palmae, calami, & casiae
 modis adduntur: & xylobalсами, asspalathi singu-
 lae drachmae: cinnamomi, cardamomi, & nardi,
 singulae unciae: omnia exactius tunduntur, & af-
 fuso vino odorato, in vase operto, quod supra car-
 bones firmiter collocatum sit, ter efferuescunt, &
 semito ab igne vase inili pernoctant: postridie vi-

um effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur:
 Ter simili modo bene conferuescat. Deinde matuti-
 nis exempto adipe vinum effundatur, & abluto
 vase, si quid imo subsidens hæsît, detergatur. Po-
 stremo eliquatum pingue & excolatum, ad vsus
 reconditur. Hoc autẽ modo odoramentis imbuitur,
 quod antea curatum est. Verũ antè dicta prius
 inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum
 vires adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horum
 volēs, cum vino seruefacito, impositis vnà myrti
 ramulis, serpyllo, cypero, item aspalathi plenius tu-
 so. Aliqui tamen ad hunc vsus, vno duntaxat ho-
 rum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, ex-
 ptum leniter, & linteo colatum, aromatis, vti ex-
 positum est, imbuitur. Adipibus spissamẽta sic fiũt
 (quemcunq; acceperis, oportet ut recens tundatur)
 Syncerus & sanguinis expers adeps, reliquas ha-
 bens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam
 demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod
 semipedis altitudinem superet: lẽto igni seruefacat,
 dum uernaculus odor aboleatur, planeq; vinum re-
 doleat. At ubi deposito uase refrixit, duæ adipis
 mine in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sex-
 tarij, & seminis loti, eius, inquam, cuius è ligno
 ludicra tibie factitantur, tusi minæ quatuor adij-
 ciuntur: lento igni subinde miscendo decoquuntur
 etiã; odoris uirus euanuerit, excolatusq; adeps refri-
 xerit, una contusi aspalathi mina, cum amaraci-

DIOSCORIDIS

ni floris minis quatuor, & vetere vino subigitur.
 Nocte una hac odorem rapiunt, combibuntue. Pos-
 tridie in fictilem ollam tricongulem ea omnia cū
 adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, unā ser-
 uescunt, quousq; & vim & odorem spissamento-
 rum adeps ipse contraxerit: qui eliquesces colatur,
 & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantia
 efflagites, drachmas octo quā pinguissimæ myr-
 rhæ vino maceratæ, quod multos in annos asserva-
 tum est, misceto. Callinaceus anserinusq; sic odoribus
 imbui solent: Cuiusvis eorum percurati sextarij
 duo fictili olla excipiuntur: erysi sceptri, xylobal-
 sami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singu-
 lorum fescūcia admiscetur: vini Lesbij veteris cya-
 thus unus adiicitur: ea ter effervescūt prunis, mox
 vase sublato ab igne, die noctuq; refrigerantur: po-
 stridie liquata per linteum crassum, mundū in vas
 excolantur. Vbi vero adeps coierit, concha excipi-
 tur, fictiliq; nouo densius operto perfrigidis locis re-
 ponitur. Hyberno tēpore id instituerere oportet: æsta-
 te siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui
 Tyrrhenicæ ceræ momentum adiiciant, quò facilius
 in vnum corpus omnia coalescant. Eadem ratione
 suillus adeps & vrsinus, ceteriq; id genus,
 odoramentis imbuuntur. Verū sampsuchi odore
 adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quā
 optime adipis, præsertim taurini, mina una, tempe-
 stiniq; sapsuchi exquisitè cōfracti, sesquimina mi-
 scentur

ſcentur, & inſperſo largiore vino degeruntur in of-
 fas, quæ in vaſe cooperto nocte quieſcunt: matuti-
 nis in fictili olla leuiuſculo igni, affuſa aqua, leui-
 ter coquuntur: dumq; ſuum adeps odorem exuerit,
 deſecatus ac bene opertus, nocte tota permanet: po-
 ſtero die deterſa ſorde, quæ peſſū ierat, ſumꝑſuchi,
 vt dictum eſt, contuſi iterum ſeſquimina priori pa-
 ſtullo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs
 quæ diximus peractis, decoquitur & colatur: & ſi
 quæ fundo hæſit ſpurcitia, deraditur, & frigido lo-
 co reconditur. Siquis tamen incuratum adipem an-
 ſerinum, gallinaceum, aut vitulinum, à putredine
 tueri velit, ita faciendum eſt. Quemuis adipem dili-
 genter elotū & ſiccatum in vmbra ſuper cribrū,
 per lintea munda manibus vehementer exprimat,
 linōq; conſutū vmbroſo in loco ſuspendat, & poſt
 multos dies noua charta inuolutum, frigido loco re-
 condat. Pingua autem indito melle vindicantur à
 putre linis vitio. Vis omnium eſt excalfacere, molli-
 re, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus, & vituli-
 nus aliquantū adſtringunt: earundem virium com-
 pos leoninus: nam reſiſtere eū aiunt ijs, qui inſidias
 moliuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, ſerpē-
 tes ſurgunt. Adſtringētior eſt caprinus: qua ex cau-
 ſa decoctus cū polenta, rhoe, & caſeo, dyſentericis
 datur, & cam ptiliſanæ ſucco inſim litur. Ius deco-
 cti phthiſicis in ſorbtionibus prodeſt. Datur quoq;
 vtiliter ijs qui cātharidum venena hauſerūt hirci:

DIOSCORIDIS

nus, ut qui ualidissime discutiatur: podagricis auxiliatur, cum fimo caprae & croco impositus: huic proportionem respondet ouillus. Suillus uero contra uulua & sedis uicia idoneus est: ambustis igni medetur. E sue uetustissimus quisque sale conditus excalfacit & emollit: elotus uino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asinum tradunt cicatrices corporis cōcolores reddere. Anserinus galinaceusque conueniunt mulieribus malis, et ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, et contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos uicio alopecie capillos restituere, perionibus subuenire. Vipinus medetur aurium doloribus. Fuluatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, et melli admisceantur. Vipera adeps contra oculorum hebetudines suffusionesque efficacis est, addita cedria, mellae Attico, & pari oleo uetere: pilos alis euulsos perunctis radicibus recens et per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

Medulla.

Cap. LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, in quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullae molliunt,

calsfaciunt, rarefaciunt: ulcera explēt, ceruina per
unctos uenenata fugiunt. Curātur recentes, adipis
modo, aqua respersu subacta, selectisq; ossibus
tantisper elota, et in linteum expresse, donec aqua
syncera emanet: et deterfa sorde penna, si qua in-
natet, liquata in duplicato, uase in pilam exprimū-
tur: & ubi coire, omni face, quæ ad ima sedit, dera-
sa fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas
reponere, facito omnia quæ de anserum & gallina-
rū adipe demonstrauimus.

Fel. Cap. LXX.

FEL omne curatur hoc modo: Recens preligato
ore folliculi lino tandiu demissum in feruentē
aquam, dum quis spatium trium stadiorū percurre-
saret, mox exemptum siccatur umbroso loco, asper-
ginem nō redolente. Sed quod ad oculorum medica-
menta adyeci solet, ligatū lino in uitreum uas, quod
mel habeat, immittitur: circūuoluto ad os uasis li-
ni principio, et operto uase reconditur. Est enim uis
omnium acris et excalescens intensis tamen et re-
missis uiribus differunt: si quidem præstantius in
effectu esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis
qui callionymus apellatur, marina testitudinis,
hienæq; item perdici, aquilæ, gallinæ candidæ, &
syluestris capræ: quod priuatim prodest cōtra sus-
fustiones incipientes, et oculorū caligines, argemas,
et genarum scabritias. Onillo, suillo, hircino atque
ursino, taurinū multò efficacius. Felle omni perfa-

DIOSCORIDIS

cilem, præsertim infantibus, deiectionem quis morietur, si intinctum eo tormentum aut simbriam sedi subiiciat. Priuatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur, & si bilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vlnerarum emplastris & circumlitionibus, quæ contra venenata parantur. Phagedænicis vlceribus, colis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optime purgat. Ovillum & vrsinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus indutum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimit. Suillum autem contra aurium vlcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

Cap. LXXI.

Sanguis anseris, anatis & hædi, viliissime in Santidota miscentur. Palumbi autem, turturis & columbe, necnon perdicis, oculis criore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lasciosisque illinuntur. Peculiariter columbe sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capre, cerui & leporis sanguis inassatus sartagi-

ne, dysenterias & celiacorum profluvia sistit. In vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginisq; emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marine autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq;. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, septica vocât. Sanguine chameleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc enim viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlito conceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier menstrua supergrediatur: leuat podagrae dolores & ignem sacrum, illitus.

Fimum. Cap. LXXII.

Amentarie bouis fimum, si recens admoueat, tur, vulnerum inflammatione: mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus soto compescit: illitum ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentes vulua reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

DIOSCORIDIS

Fimum caprarum, præsertim in montibus degens
 tum, potum in uino, regium morbum emēdat: mē
 ses cit cum odoramentis haustum, & partus euo-
 cat: tritum in farinam, & impositum lanis cum
 thure, sceminarum profluvia sistit, cæterosq; san-
 guinis impetus ex aceto cohibet: medetur alopecij
 exustum, & cum aceto aut oxymelie illitum: cū
 axungia uerò impositum, his, qui podagra tentan-
 tur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum im-
 ponitur serpentium morsibus, ulceribus qua ser-
 punt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici
 ustionem hunc in modum accipiunt: In eo intersti-
 tio ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti
 lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta subster-
 nitur, deinde sigillatim feruentes stercoris capri
 pilule imponuntur, dum uapor per brachium ad
 coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem
 mitigare: adustio id genus Arabica appellatur.
 Ocellum ex aceto illitum sanat epinyclidas, cla-
 uos, pensiles uerrucas, thymos, & ambusta igni,
 rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syuestris ari-
 dum, in aqua aut uino potum, reiectiones sangui-
 nis sistit: uetustum lateris dolorem mulcet, ad rupta
 & conuulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato
 rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum
 fimum siue crudum siue crematum, addito aceto,
 sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui her-
 ba pascitur, siccum fimum liquatum in uino, mox

potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius ei excalfacit et urit, cum hordeacea farina mistū strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cū melle, lini semine & oleo: ambustus igni medetur. Galinaceum uerò omnia eadem, sed inefficacius prestat: priuatim tamen contra uenena fungorum, et coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconie simum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, ad opēcijs medetur: cum thur & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, si sit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat, sicco ex melle angine perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili finum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitorēq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent, quæ cū teritur, fermenti acorem quidā. antenus refert. Aduerant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile uendunt. Alij amyli aut cimoliam miscant, et adjecto anchusæ colore per rarum cribrū paulatim

tim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui si ccati pro crocodilea veneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina.

Cap LXXIII.

Humanam urinam suam cuique bibere, cōtra viperæ morsus, ac venena, incipiētemq; aquā inter cutem proderit scorpionis, viperæ marinorū, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus et lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manantia, fursures, psoras, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit nomas, & precipuè genitalium: cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decocta q; in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur decocta in aereo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat feruesactum cum cyprino, inditumq; vuluæ dolores mulcet: Strangulatus leuat genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurum dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicae calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum

extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitijs mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coiréue in calculi durtiam, vulgò creditis est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, Stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asininae urinae potu renum vitia sanari traduntur.

Mel.

Cap. LXXIIII.

Pincipem locum obtinet mel, quod Attica regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleu. Magis probatur dulcius & acre, odoratus, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod obsequacem lentitiam non facile abrupitur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergerendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, quæ ratione in sordida vlcera sinusq; commodissime insunditur. Decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum, item aurium sonitui et dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & foeda capitis animalia illitum necat, nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum cali-

Mellis

proba-
tio quæ-
lis.

DIOSCORIDIS

ginem discutit, faucibus, tonsillis, angina collutū
gargarizatūmue medetur: urinam ciēt, auxilia-
tur tussi, & à serpente percussis: contra haustum
meconium, cum rosaceo calidum assumitur: aduer-
sus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus in-
etum aut potum proficit: crudum tamen aluum in-
flat, tussim laceßit, & ea de re despumati usus ap-
tior est. Primatum tenet in mellis genere uernum,
deinde æstiuum: hybernū uerò, utpote quod cras-
sius constet, deterrimum reputatur, ceraginis hali-
tum expirat. Quod in Sardinia gignitur mel, ama-
rum est: quoniam apes inibi absynthio uescantur
quo uitia cutis in facie & maculæ aptissimè per-
unguntur. Heraclie in Ponto quibusdam anni tem-
poribus, propria quorundam florum dote, mel con-
flatur: quod qui edere, mente abalienantur, ac su-
dore disfluunt. Remedio sunt, estata ruta, & sal-
samenta, aut epotum mulsū, resumpta, quoties
uomitione reijciuntur. acre autem est, & olfactu
sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, scie-
minarum cutem emendat, & cum sale sugillatio-
nes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod
saccharon nominatur. In India uero, et felici Ara-
bia in arundinibus inuenitur: salis modo coactum
est, dentibus, ut sal, fragile, a'uo idoneum, et stoma-
cho utile, si aqua dilutum bibatur: uexatæ uescæ
renibusq; auxiliatur, illitum ea discutit, quæ tene-
bras oculorum pupillis offundunt.

Mel Sar-
doni ama-
rum.

Saccha-
rum.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, et halitū quadātenus mel leū referens, natione Pōtica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candidās, et suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radūt al bum syncerumq̃, atq; transfundūt in uas, quo lsa tis habeat marine ex alto petite, inspersq; nitri momēto decoquūt: eumq; iterum terciōne inferbuit separatū uas refrigerant, ac ceræ pastillū eximūt, deterfa sordē, si qua fortē adhæsit: tū demū indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: et uase dē pto ex igne fundum ollule nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu in- tingunt, quò celerius concreseat, et quā minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. Orbi culi lino consuti, interuacāte spatia, suspendūtur, et iterdiu, cōtinuò sub sole, noctu sub luna aspergū tur, usq; dum perfectē albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem factitari, & identi- dē recoqui operæpretiū est. Nec desunt, qui pro ma- rina, in murina quam accerrima semel aut iterum excoquāt. dein laguncula tenui, rotūda ansam ha- bēte, extrahūt: postea orbiculos, substrato affatim æspite herbofo, insolant, donec cādorem summum cōtraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus uere,

DIOSCORIDIS

cum sol remissa vehementia humorem pariat, ve-
 no facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, mo-
 dice explet corpora: datur in sorbitione dysenteri-
 cis, ac milij magnitudine decem grana cera hau-
 sta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Propolis. Cap. LXXVI.

Propolis eligi debet flava, odorata, styracem re-
 ferens, in vehemente ariditate mollis, & ma-
 stiches more ductili. Magnopere calfacit, & euo-
 cat: aculeos, et omnia infixa corpori extrahit, in ve-
 tere tussi suffita proficit, impetigines admota tollit
 ea in alueariorum foribus, cerosa natura inuenitur.

Triticum. Cap. LXXVII.

Optima e tritici generibus ad secunde valetu-
 dinis usus habentur, que recentia, & iam per-
 fecte adulta, colorem luteum referunt. dein se-
 quantur trimestria, que nonnullis sitania nomi-
 nantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt,
 canum morsibus prosunt, mansa & imposta: con-
 fectus eorum similitudine panis, plus alit, quam ci-
 barius, e trimestrium farina panis leuiorem cibum
 prebet, & qui facile in membra demandetur. Fa-
 rina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduer-
 sus nervorum fluxiones, quas Greci rheumatif-
 mos vocant. Item contra interaneorum inflationes,
 lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in
 acri aceto decocti, turgentes mammas sedant vi-
 perarum ictibus auxiliantur, & torminosi pro-

sunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahē
 diq; vim habet priuatim callos pedum, clauosq; ex-
 tenuat, et cetera tubercula surunculosq; ex sale cō
 coquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra vene-
 natos iētus cū aceto aut vino cōmodissimē illinitur:
 eadē si decocta in glutini modum delingatur, cruen-
 tis excreationibus proderit: contra tussim, & exa-
 speratus arterias, cū mentha & butyro decocta, ef-
 ficax est. Tritici pollens. ex aqua mulsā, aut hydie
 leo decoquatur, omnem dis. cutit inflammationem.
 Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsā inflā-
 mationes omneis illitu mulcet, cum emolliat, et quā-
 dāmtenus refrigeret. sed herbis succisue huic rei ac-
 cōmodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adie-
 ctis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens
 muria maceratus, illitu vetustas ipetigines sanat.
 Glutinum ex similagine, et polline, quo chartæ glu-
 timantur, sanguinē excreantibus prodest, si liqui-
 dus ac tepidū cochlearis mensura detur sorbendū.

Hordeum. Cap. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purū-
 que: id minus quā triticum alit Plisa-
 na tamen ob cremorem in decoctione red-
 ditum, plus alimenti præbet, quā polenta ex hor-
 deo facta. Contra acrimonias atq; gutturis scabri-
 tias, exulcerationesq; pollet, quibus etiā triticea pi-
 sana præsidio est: sed plus alit, magisq; urinā mo-
 net. Lac abūdē suppeditat, si cū feniculi semine de-

DIOSCORIDIS

cocta sorbeat. Hordeum absterget, urinā ciet, in
flationem parit, stomacho aduersatur, tumore con
coquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsā
aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; di
scutiat: duritias cum resina, & simo columbarum
concoquit: cum melioto autem, et papaueris calyce
dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intesti
norum inflationes cū lini semine, scenograceo, et ru
tā, illini iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo,
et impubis pueri urina, ad concoctionem perducit:
& cum myrto, aut uino, aut malicorio, aut syluez
tribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: poda
gricis inflammationibus, cū cotoneis aut aceto pro
dest. decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū ca
taplasma, & calida imposita lepris meletur. Cre
mor uero farine ex aqua, atq; cum pice, et oleo de
coctus, puri mouēdo est: cum aceto subactus itidē,
et cū pice, cōtra articulorū fluxiones prodest. Farin
a ex his aluū cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum. Cap. LXXIX.

EX hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is
urinam cit, renes & nervos tentat membra
nis, præsertim cerebrum uescientibus, officit. infla
tionem parit, uitiosum succum creat, elephantia sin
gignit, persusum Zytho ebur, obsequiosum & ope
ri tractabile redditur.

Curmi. Cap. LXXX.

Fit & ex hordeo potus, quē curmi nominant,

eoq; saepe potu pro uino utuntur: uerum dolorē capitis mouet, malū succum gignit, neruis nocet. Con similia etiā potius genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quae occidentem spectat, & Britannia.

Zea seu semen. Cap. LXXXI.

Zea duorum generum est: una simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iungit. Vulgo
splet a. Et a gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

Craffior farina. Cap. LXXXII.

Crimmon craffior est ex zea triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abunde alit, facile conficitur, aluum uehementius adstringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. Cap. LXXXIII.

Eidem generi siligo adscribitur, sed minus alit, quanto nutrit: in panes, ut zea cogitur. Fit quoque è siligine craffior farina, quam Graeci crimmon uocitant.

Athera. Cap. LXXXIIII.

Athera ex zea fit tenuissime molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

Tragos. Cap. LXXXV.

Tragos quandam halice frugis figuram gerit: multo minus, quam zea nutrit, quod multum aceris habeat, quare egrine conficitur,

aluumq; magis emollit.

Auena.

Cap. LXXXVI.

AVena, genicula quædam habet, folio & stipula tritici imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeum. Pulve huius alium sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza.

Cap. LXXXVII.

ORYZA frugum generis est, in palustribus rigusq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum suppressit.

Halica.

Cap. LXXXVIII.

HALICA fit ex zeu, quam dicoccon appellauimus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longe vtilior. decocta in aceto illitaq; lepras tollit, vnguium scabritias extricat, incipientibus ægilopis medetur. Decoctum dysentericis, quos exoruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium.

Cap. LXXXIX.

MILIUM in panes coactum, minus ceteris frugibus alit, sistit pulve sua aluum, vrinam cit. Torretur milium, seruensq; in sacco ponitur, vt torninibus, reliquisq; doloribus, si foveatur, auxilio sit.

Panicum.

Cap. XC.

PANICUM, frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. eodemq; modo in panes subigitur:

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesama.

Cap. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus grauitatem facit, quoties inter mandendum commissuris dentium inhaesit: neruorum crassitiem illitio discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus: capitis dolores, qui estuatione concitantur, ex rosacea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorum doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium.

Cap. XCII.

Lolium, quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia vlcera, gangrenasque emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto ferros lichenas, & ex aceto, et sulphure vino, lepras: Strumas quoque discutit, cum fimo columbino, & lini semine decoctum in vino: rupit, quae egrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, uti libime ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur conceptionem adiuvat.

Amylum.

Cap. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod si ne mola fiat. Optimum ex trimestri natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli haec est: Purgatum trimestre triticum madescit quinque die, &, si fieri potest, nocte: cum emollitum

fuerit, effunditur sensim, siue agitatione, aqua, quā minus cremor utilis vnā excludatur, vbi mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, tertium demum enatantes ibi fursures incerniculo eximēdi, reliquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis cōfestim torreatur flagrantissimo in sole: nāq; si paulisper vltimum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, canaq; vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lachrymę atq; obsonijs admiscetur. Fit etiā amyllum ex Zea, quę maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farine modo manibus subigitur: presaq; seruētissimo in sole, vt antē retulimus, exiccatur: nullius ī medicinavsus, ad alia tamē cōueniēs.

Fœnumgræcum. Cap. XCIII.

Fœnigræci farina vim habet emolliendi discutiendique: in aqua mulsā decocta aduersus tā internas, quā externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienum cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluę, frequenter, & insident Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, fursures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, sicū anserino adipepesti vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prod. st. aduersus tenesmos,

foetidamq; dysentericorum proluuiē. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalis cicatrices absterget.

Linum.

Cap. XCV.

Linum vulgò notum est, cuius semen easdem, quas fœnum græcum, vires habet. Discutit, et emollit omnem intus forisq; inflammationem, cū melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle coo-
cto exceptum: vitia cutis in facie varosq; crudum tollit, illitum cū nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasq; discutit: vlcera, quæ serpunt, favosq; cū vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectorij extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substitua-
tur: tussim lenit, venerem stimulat: si farina pipe-
ris, & melle exceptum, pro placenta largius adsu-
matur. Huius decoctum interaneorum vulnūq; ero-
sionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vul-
næ inflammationes in desefionibus perquā vtile.

Cicer.

Cap. XCVI.

Cicer sativum alio idoneum est, urinam ciet, inflammationem parit, colorem commendat, men-
ses ac partus expellit, lac auget, cum eruo deco-
ctum illinitur ad inflammationes testium, verru-
cosas informicationes, ad scabiem, vlcera capitis
in. in. antia, impetiginesq; contra carcinomata, &
vlcera, quæ cacoethe vocantur, cum melle & hore Cicer a-
deo prodest. Alterum genus arietinum nominat. rictinū.

tur: utrunq; cit urinas, dato cum rore marino, hys dropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vescicam, & renes. In verucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tagunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, solijs sativo simile est, odore acris, sed semine discrepat: idem quod sativum præstat.

Faba.

Cap. XC VII.

Faba inflationem excitat, ægrè concoquitur, tu multuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cū suo cortice esitata, dysenterias, et cæliacorum profluvia sistit: contra vomitiones cōvenienter manditur. Inflatio levior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas vulnus excitavit, mitigat: cicatrices cōcolores facit, turgentes grumoso lacte mamas, etiam si inflammatione tententur, adiuvat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum scenigræci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, vnasq; reprimat: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, frō

illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quò tardius purem erumpat, pueris imò. vètri illinitur: vitiliginē purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, graciles scunt, & minus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo ipositi cortices, strumas discutunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba depto cortice in illas partes diuisa, in quæ suapte natura scinditur, imponi, solet sanguinis defluxionibus ab hirundine concitatis: namq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. Cap. XC VIII.

Aegyptia faba, quam aliqui Ponticā vocāt, in Aegypto * plerunq; prouenit: in Asia ēt * * ελας
OTOS id ē Ciliciaeq; laculus inuenitur. Folia habet ampla * * plurima etiam si ad arborum frondes cōparentur, caudem * Sic cubitalē, digiti crassitudine: florem roseum, dupla Plin. lib. papaueris amplitudine: & vbi flore exiit, fert 21. c. 15 folliculos vesparum fauis similes, in quibus faba Grecus supra operculum, bullantis ampullæ modo, prominet. Ciborion aut Cibotion ideo nomināt, id est arculam, quoniā seratur ipsa, humenti glebæ mādara, et ita in aquā demissa. Radice firmatur harum habet, dine crassiore, quæ cruda coctāne estur: ei colocasia nomen est. Faba virens manditur, et exiccata ως πέρα
σεν id ē nigrescit, vulgare magnitudine superat. Adstringēdi facultatē obtinet, et stomacho vtilē: disentericis, cœliacisq; prodest, in sparsa, polētæ vice, lomē istar ga
leri.

DIOSCORIDIS

to: datur quoq; in pulve. Cortices in vino mulso decocti, si tenui melle cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

Cap. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, & grè coquitur, stomachum malè habet, eñq; & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi: quæ ex causa aluum cohibet, si detracto ante ea cortice discoquatur accuratè, primaq; aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac polmoni inutilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis aut mæspilis, sorbisue, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionem abijciuntur, vel vinarum rhois, quæ absonijs insparguntur: verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, et illita, podagras lenit: si nus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in

acetio durities & strumas discatit, cū cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, et hic quæ serpūt, igni sacro, permouibusq; ut antea dictum est. contra mammæ, in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Phasioli.

Cap. C.

Phasioli inflāt, spiritus ciēt, egrè coquūtur. Vides cibo aluū emolliūt, ad vomitiōes idonei.

Eruum.

Cap. CI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, an- Officinis
gusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, orobus,
e quibus farina sit, nomine eruina, ad medendi greca ap-
usus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluū pellatioe
esu turbat, sanguinem per urinam extrahit, elix- vocat.
bōnes saginantur. Parandæ farine ratio hæc est:
Vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscen-
dōque aqua respergunt, donec sufficienter combi-
bant: postea torrentur, vsque dum hians cortex
disrumpatur, molitaq; farinario cribro incernun-
tur, postremo farina reconditur. Hæc alno utilis
est. urinam ciēt, meliorem colorem efficit, sangui-
nem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera
 cū melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie
 & maculas totūq; corpus emendat: nomas, gāgre-
 nas, duritiasq; serpere nō patitur: mām arum du-
 ritiis emollit, atra vlcera, quæ theriomata vocāt
 fauosq; emarginat, carbunculos rūpit: cum vino
 subacta illitu morſibus viperarū, canū, hōiūq;
 medetur: vrine difficultates tenesmosq; ex aceto
 mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non ſen-
 tiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle
 exceptū, ſumptumq; conuenit. Eius cremor pernio-
 nes, & pruritus in toto corpore, ſanat ſouendo.

Lupini,

Cap. CII.

S Atiuus lupinus notus est: cuius farina cū
 melle delinctu, aut potu, ventris animalia
 expellit. Ipsi quoq; macerati, et cū ſua ama-
 ritudine eſiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum
 idem munus præſtat, cum ruta & pipere potum:
 quare lienosis prodeſt. Eodē vlcera tetra, quæ the-
 riomata vocant, gangrenas, incipientem ſcabiē,
 eruptiones puſtularum, ulcera in capite manan-
 tia, uiligines, maculasq; ſouere vtiliſſimum. Mē-
 ſes et partus extrahit, cum myrrha et melle ſub-
 ditum in vellere. Eorum farina cutem liorēſque
 corrigit, inflammationes cum polenta & aqua
 mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex
 aceto lenit, ſtrumus in aceto cocta illitaq; diſſi-
 pat, carbunculos rumpit. Decocti cœleſti aqua,

donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita ut repente decocto abluantur. Citrurina radix cum aqua cocta. Lupini triti ubi maceratu dulcescere coeperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi aviditatem faciunt. Gignuntur & sylvestres lupini, sativis similes, sed omnino minores, qui eadem, quæ sativi possunt.

Rapum.

Cap. CIII.

DEcocta rapiradix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem stimulat: decocto podagra, pernionesque foveantur, contritoque rapo atque imposito iuvantur: si excavata radici rosaceum ceratum adigatur, & ferventi cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet, Cymæ eius decoctæ maduntur, & urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodina vocant, idoneum est: potum contra venena salutare est, venerem concitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit: sed multo magis appetentiam recreat. Sylvestre rapum in arvis nascitur, & fruticosum incubi & Vox
ti altitudinem assurgens, ramosum, leve: in cacumine folia fert levia, digitali latitudine, aut majora. ex Plinio
alii et a.
ra: & fructum in siliquis calyculatis: cumque eorum involucria aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina parvula concipiuntur, feris nigra, intus alba.

DIOSCORIDIS

Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, utimur: præsertim q̄ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solēt.

Napus.

Cap. CIIII.

COcta napi radix inflat, modicum alit. Semē eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

Cap. CV.

Radix (quæ Græcis raphanus dicitur) exal-
facit, status gignit, ori suavis est: sed stoma-
cho aduersatur, ructus ciet, urinam pellit, alius
aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis
eius distributionē adiunget: quum aut præsumitur,
cibum suspendi: quare vomituris cōmodissimè da-
tur ante cibum. Sensuum aciem excitat: decocta cō-
tra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pecto-
re, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vo-
mitiones mouet: hydropicis cōmodissimè illinitur,
lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & nomas
amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alo-
pecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea fa-
rina emendat, his qui fungis strangulantur, tam
cibo quàm potu salutaris est. Semē vomitiones fa-
cit, urinam mouet, menses c't, lienem extenuat, cū
aceto illitum gangrenas validissimè emarginat:
coctum cū aceto mulso anginis perquam utiliter
gargarizatur, cōtra ceraſtis morsus, potum ex vi-
no, auxilio est. Sylvestris raphani, quam Romani

armoraciam vocāt, folia satiuo similia, sed magis
 lampsanam imitantur: radix gracilis, & tenera, & παλα
 subacris. Tam foliū quā radix in olera recipitur: unid est,
 sed hæc excalescit, yrinam concitat, estuosa est. mollis.

Sifer.

Cap. CVI.

Sifer vulgo cognitū, cuius radix decocta ori gra
 ta est, & stomacho utilis: yrinam ciet, & ap
 petentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. Cap. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant,
 quod in acutum tendit, dura habens extre- Officiū
 ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi lapathū.
 distimilis. Tertium genus sylvestre, paruum, planū
 tagini proximum, humile & molle. Quartum est
 quod alij & oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon
 vocant. Folia eius sylvestri ac exiguo rumici si mi- & Aceto
 lia, caule non magno, semine subacuto rubente, sa.
 acri, in caule & agnatis appendicibus, emicante.
 Omnium decocto olere aluus emollitur. Crudi illi-
 tu, melicerides, rosaeco aut croco adiecto, discus
 tiuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius, quam
 oxalida nominant, semen ex aqua aut vino utiliz
 ter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum af
 fectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod
 si quis in potu presumat, nihil molesti ex ictu pas
 tietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crude, le
 pras, impetigines, & scabrosos vngues persanant:
 sed antea locus aceto & nitro in sole perfrican-

DIOSCORIDIS

dus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foveatur, aut in solijs balneariū confricetur. Coctæ in vino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcent, strumas parotidasq; discutiunt, lienem cū aceto extenuant. Aliqui amolien. lis strumis radicem gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Trita & admota fœminarum profluvia sistunt: cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicæ comminuunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathonolus est magnum, in paludibus nascens: easdem habet vires, quas prædicta rumicis genera.

Lampfana.

Cap. CVIII.

Lampfana syluestre olus est: plus alit quàm rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesq; coquuntur in cibo.

Blitum.

Cap. CIX.

Blitum estur oleris modo, aluo vtile est, nullius in medicina vsus.

Malua.

Cap. CX.

Malua sativa, esui longè aptior sylvestri: stomacho aduersatur, aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, agylopas ex mele sanāt: verum cū cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem vtendum est. Cōtra aculeatos apium vesparumq; ictus illita efficax est. eadē cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlce-

ra manantia in capite fursuresq; cū vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaq;, vtilissime ex oleo imponuntur. Eius decoctum vlnas in seſſione mollit prodeſt eroſionibus veſicæ, et inteſtinorum, vuluæ, ſedisq;, clyſtere inſuſum. Ius decoctæ cum radice ſua, contra omnia venena auxiliatur, ſi continuo à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morſus remedio eſt, lac euocat. Semen in vino potum addite loti ſylueſtris ſemine, veſicæ cruciatus lenit.

Atriplex.

Cap. CXI.

A Triplicem aliqui chryſolachanō vocant, cognitum olus eſt. Duo eius genera, ſylueſtre et ſatium. Coctum eſtur, vt olus. Aluum mollit, panos diſcutit, ſiue crudū, ſiue coctum illinatur. Semen cum aqua mulſa potum, regium morbū sanat.

Brasſica.

Cap. CXII.

Brasſica ſatina aluo eſt idonea, ſi modo leniter ſerue facta edatur (nam percocta aluū ſiſtit, ſed multo magis bis cocta, aut que in lixiuio coquitur) ſtomachum autem male habet: acrior eſt æſtiua. In Aegypto propter amaritudinē nō eſtur. Cæcutiētibus, & tremulis eſſe prodeſt: ſummo cibo ſumpta crapulam diſcutit, & vini noxā reſtinguit. Melior ſtomacho cyma, ſed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita ſtomacho inimica eſt, aluum conturbat. Crudus ſuccus cum nitro & iri deuoratus aluum mollit: cum vino quoque

epothus viperarum morsibus auxiliatur: cum scæ-
nigræci farina podagris & articulorum vitis il-
linitur: prodest & sordidis ulceribus & vetustis
illitus caput purgat naribus infusus: menses extra-
hit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illi-
ta, aut cum polenta trita, conferunt inflammationi-
bus, tumoribusq;: epimyctidis, ignem sacrum, le-
prasq; sanant, carbunculos ex sale rumpunt: fluen-
tes capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus
depascentia ulcera, gangrenasq; valent, lienosisq;
ex aceto crudi prosunt. Mansa, deuorato succo, res-
tusam vocem instaurat. Decoctum eius potu, alui
& menses ciet. Flos post cōceptionem in pessa sub-
ditus, partum abortu vitiat. Semen eius, præsertim
que in Aegypto nascitur, potum tineas repellit: in
antidota theriaca additur. faciei cutem lētiginēsq;
expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, et
adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolo-
res mitigant.

Brasica syluestris. Cap. CXIII.

Syluestris brassica, maritimis præruptisue
locis, magna ex parte gignitur: satiuæ simi-
lis, sed candidior, hirsutiorq;, amara. cuius
cyma in lixiuia cocta, ori non insuauis. Folia illitus
vulnera conglutinant, & inflammationes tumo-
resq; discutiunt.

ANNOTATIO.

Contendunt doctissimi quique eā esse

herbam, quam vulgò Soldanam, aut Soldanellam vocitant. quæ certè aristolochiâ rotundam, vt à Dioscoride hic depingitur brassica marina, folijs adaniusim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adiiciatur, mendosum planè suspicamur, ac fortè pro μακρά vt Græci codices habent, legendum μικρά id est, parua: quod & ipsum soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ folijs similia? quæ cum ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinata ferè esse rotunditatis, sæpe cōperimus. Suū tñ cuique in hac re esto iudiciū.

Brassica marina. Cap. CXIIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeūt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucò salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniā cum pingui carne.

Beta. Cap. CXV.

Beta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cum lenticula, vt ventrem sistat: quod

DIOSCORIDIS

* Anti- magis radice eius præstat. * Candida alio vi-
 qui hoc lis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem,
 genus be quem habet in se, noxū succi est. Vnde succus earū,
 t.e, ut au cum melle naribus inditus, caput purgat, auriū do-
 ihor est loribus auxiliatur. Decoctū radiciū & foliorum,
 Theo = furfures lendesq; deterget perniones fotu mitigat.
 phrastus Crudis folijs vitiliginēs, nitro antea perfrictas, alo
 Siculum peciarū inanitates, scapello prius exasperatas, atq;
 uocarūt: depascentia vlcera, illini prodest. Eruptionibus pa-
 quorum pularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.
 exemplo
 extrita

Portulaca.

Cap. CXVI.

una tan-
 tum lite
 ra Sicla
 hodie di-
 citur.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, in-
 flammationibus oculorum, ceterisq; cū polen-
 ra Sicla ta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igne, vesti-
 hodie di- te doloribus, auxilio est: commanducata dentium
 citur. stupores sedat: stomachi & intestinorum estuatio-
 nem, fluxionesq; mulcet: venes et vesicam adiuvat,
 etiam si erosionem sentiant: veneris impetus exole-
 uit: succus epotus simili effectu prodest, in febribus
 valens. Cōtra teretes ventris tineas, cruentam ex-
 creationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & pro-
 fluvia sanguinis, percocta efficax est. Item contra
 sepi morsus. Ocularibus medicamentis vtilissimè
 commiscetur, interaneis fluxione laborantibus, atq;
 vulvarum erosionibus, infunditur: contra dolores,
 quos æstus excitauit, caput ex rosaceo & oleo foue-
 tur: eruptiones papularum in capite, cum vino emē-
 dat;

dati vulneribus quæ ad syderationem spectant, ex-
polenta illinitur.

Asparagi.

Cap. CXVII.

Officina

Corruda, siue syluestris asparagus, vulgaris spara-
est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti ven-
trem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum cō-
tra vrinæ difficultatem, regium morbum, renum
vitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cū
vino aut, phalangiorum morsibus auxiliatur. Si
decocti succus super dente contineatur, eius dolori
medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, vt
aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagū
etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis,
atque defossis: quod quātum equidem sentio, planē *In gra-
a veritate abhorret. * Altilis aut asparagus mul-
tis ramis fruticat, folijs fœniculi, lōgis, numerosis: hæc ad
radice rotunda, grandi, spongiam habēte. Huius te syluestre
neri cauliculi triti in vino albo, renum dolores se-
dāt. Assus aut coctusue, vrinæ stillicidium, difficu-
tatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino gum-
aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cū ferūtur,
ficis aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat: nec fit al-
coxendicis cruciatus stranguriamq; leuat. Alliga-
ta radix, aut haustum eius decoctum, conceptum tio. Mar-
adimit, & sterilitatem adfert. cello aut

Plantago.

Cap. CXVIII.

uidentur

DVo plātaginis genera: minor folia habet an-
gustiora, minora, molliora, leuiora, & ennu-
na.

ra: cauliculo anguloso in terram inclinato: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera:

* Olerū maior, letior, virentiorq; latis constans folijs, & ole nomine racei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, per anto angulosus, subruher, à medio ad verticem tenui se- nomasiā mine circumdatus: radicibus nititur teneris, hirsutis, Brassicā candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nasci- intellige. tur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo Nec enī utilior magna est. Vim habet folia exiccatoriam, simplici- constringentē: quare omnibus malignis vlceribus, ter ad q= & fluxioni opportunis atq; elephāticis, sordidisq; libet ole= illata profunt: profluvia sanguinis, vlcera quæ ser- ra, quo= punt, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent: vū dixer vetera vlcera & inequalia cicatrice obducunt, chi- sa almo roniam sanant, sinus conglutinant: morsibus canis, dum fa= ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidi- cies, fo= bus, strumis, ægylopijs, illita cum sale profunt. Co- lia plan= Etum cum aceto & sale olus, dysentericis, cœlia- taginis cisq; sumptum subuenit. Datur & in locum betæ referri cum lenticula coctum. Et ad aquam inter cutē, cui possunt. leucophlegmatia nomen est, datur & herba deco- Etā post aridas epulas, sic vt media antecedit: co- mitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorū suc- cus, colluta subinde oris vlcera, purgat: cū cimolia aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus pro- dest, lippitudinibus & aurium doloribus idem suc- cus instillatur. Additur quoq; in oculorū collyria. Ginginis cruore suffusis, & sanguinis reiectioni-

bus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subijcitur, etiã si vulua fluxione laoret. Semẽ ex vino potũ, alui fluxiones et sanguinis excreationes sistit. Decocta radix et māducatu, & collutione, dentiũ dolores sedat: eadem cũ folijs, vlceribus renum et vesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cũ tribus vini cyathis, & pari aqua modo, tertianis auxiliari: et quatuor, quarta nis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis vtantur. Lauer seu Sium. Cap. C X I X.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latissimis, olusatris similibus, sed minoribus, & odoratis. Que cruda coctaq; esu, calculos rupunt, atque excernunt: vrinas cient, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. Desio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm menthe, nigra, & ad erucam accedentia. Officinis Berula.

Sisymbrium. Cap. C X X.

Sisymbrium (alijs serpyllum syluestre vocant) in solo inculto nascitur, menthe hortensis, similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Calta. facienti vim habet: contra stillicidia vrinae, calculosq; semẽ ex vino bibitur: tormina et singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur: itẽ contra vesparum apiumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sisymbrij genus, quod Vulgò nasturium aquaticum.

DIOSCORIDIS

aliqui cardaminam, alij sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, prouenit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtium, representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta eruce modo finduntur. Id excafcacit, urinas mouet, crudum estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

Crithmum. Cap. CXXI.

Crithmum, seu potius, vt aliqui, crithamō, fruticosa & vndique foliosa herbula est, cubiti altitudinem fere petens. Nascitur in maritimis, et petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu roris marini, odoratum, molle, rotundū, quod siccatū rumpitur: habet intus tritici modo nucleū: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iocundi.

Radix, semen, et folia incocta vino, potu urinae dis-

Fuchsis ficulnati & regio morbo auxiliatur: menses cient, Corno estur crudum coctū mure in olere, seruatur etiam in cerui uul muria.

gō dictū. Coronopus. Cap. CXXII.

* στρ. πρ. v. id **C**oronopus oblōga herbula est, per terrā * reu-
est, strata tenue, adstringentē, q̄ in cibo coeliacis facit. Proue-
nit in aggeribus, et locis incultis, & secus vias.

Sonchi duo genera: syluestrior quidam est, & magis spinis horret: & alter teneritate * Vulgò quada[m] mollescit, cibus expetitus, anguloso rostrum caule, & inani, interdū rubente: folijs in ambitu per porcinū. interualla dissectis. Vtriusque vis refrigerat, modis * Vox ex cē adstringit: unde estuanti stomacho & inflāma Plinio re tionibus illiti prosunt. Succus eorum stomachi rosio posita. nes sorbitione mitigat, lac elicit, in uellere appositus sedis ac uulue collectionibus opitulatur. Tam herba quā radix illita uibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latius constans folijs: caulem in ramos exeuntē folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

A N N O T A T I O.

Non video, quanuis & Græcus codex sic habeat, quō Seris satiua hortēsi, quod planē est idē, stomacho vtilior dicatur: vt subesse errorē non parum suspicemur. Marcellus, qui aut integriori vsus fuit exēplari, aut locū, quem & ipse corruptū iudicabat, restituere conatus est, sic vertit: Latioribus folijs altera satiua & in cibus gratior.

Seris siue intybus. Cap. CXXIIII.

Seris duum generum est: altera syluestris, quæ * Offici spicris & cichorion uocatur: & altera satiua, nis scaltioribus folijs cōstat, stomacho quā hortenſis tiola.

utilior. Quae iterum in duas species digeritur: una folio latiore prodit, lactucarū simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraq; refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: alui sistit cocta, si cū aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quādoquidem aestuantē ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cū radice illita, percussit à scorpione subuenit, igni sacro cū polenta medetur. Succus cū cerusa, et aceto, valet ad illitus corū, q̄ refrigerationē desiderant.

Condrilla. Cap. CXXV.

Condrilla, quam aliqui cichorior, alij serin appellant, caulē, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est in cuius ramulis, gūmi mastiches simillimū & tuberculo fabae inueniri solet: quod cū myrrha tritū, & linteo appositum, instar oliuae, foeminarum menses trahit. Tusa cū radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod itē tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoveatur. Cōtra vipersas in vino pota proficit. Succus decocta, in vino, aut per se se potus, alui sistit. Aliud habetur chondrilla genus, folium ferens ablongum, circumrosuū, humi sparsū, caulē succo

* μυρρὴν
καυμένην
id est, ma
gnitudi
ne fabae.

madentē lacteo radice tenui, rotunda, leui, vegeta,
flauescēte, succosa. Cuius & caulis, & folia con-
coquendi vim habent. Succus incommodos palpebra-
rum pilos reflectit. Nascitur in letis, & cultu.

Cucurbita. Cap. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumor
res, & abscessus mitigat. Ramēta eius infan-
tibus contra capitis ardorem, quā syriasin vocant,
in sincipite illinuntur: oculorum inflamationes po-
diagrasq; refrigerant. Succus ē ramentis tussis per
se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxi-
liatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiu-
uat: totius seruesacta, et expressa succus, cū melle
exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinū
in cucurbitam recētem excauatam infusum, si ni-
stum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

Cucumer satiuus. Cap. XXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquam
utilis habetur: refrigerat, corruptionē non sen-
tit, vesicæ prodest, olfactu renocat, quos animus li-
querit. Semē modice vrinam mouet: cum lacte aut
passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum
vino folia, morsus canum sanant: & epinyclidas,
cum melle. Peponis caro in cibis, vrinam cit: in-
flammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius
contra adustionem infantium, quam syriasin vo-
cant, sincipiti imponuntur: fronti admotā, oculorū
fluxiones auertunt. Succus cum semine adiecta

farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitore afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, dragmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundū cenam uomere cupiat, geminis obolis sit contētus. Sanat quoque illita cum melle ulcera concreta in modum fani, quæ ceria uocant.

Lactuca. Cap. CXXVIII.

Lactuce sativæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur: somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: uerū decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinū imaginationes in somno, compescit, & ueneri refragator. Ipse uero frequentiores in cibo, claritati oculorum officium: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur, muria cōdiuntur. Cum in caulem exierunt, nim quandam nanciscuntur, succo aut lacti syluestris lactucæ similem.

Lactucæ syluestris. Cap. CXXIX.

Syluestris lactuca sativæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora: amaro gustu est, & uiribus aliquantum pauperi similis: unde lacteum eius succum aliqui medicamento permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argemæ caliginemq; repurgat, contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa, somnum

allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter, quàm satiuæ, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerẽ arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est insolutum.

Gingidium. Cap. CXXX.

Nostrũ
Cerefo =
lium.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia * πλάσ *
* plerunq; nascitur: herbula syluestri pastina * αλσ *
nace similis, tenuior, & * amarior: radice parua, σπον, id
candicante, subamara. Olus hoc crudum, coctum, est, pluri
conditumue estur magna stomachi utilitate. urinã mum.
cit. Decoctum ex uino potum uesicæ prodest.

Scandix. Cap. CXXXI.

* πικρὸ
τερον, non
εὐκαρνε
ρον.

Scandix, syluestre olus est, amarum, subacre: quod crudum coctumue manditur, stomacho et uentri utile. Decoctum in potu, uesicæ, renibus, & iocineri confert.

Scādix,
Actio lia
ber. i. an
thore,

Caucalis. Cap. CXXXII.

Caucalis, quam alij syluestre daucum uocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbellula, suauiter olente. Crudum, coctumue olerum modo estur: urinam mouet.

agreste
olus est,
gingidio
simile,
acre &
subama
rum.

Eruca. Cap. CXXXIII.

CRuda eruca uenerem largiore cibo concitat.

Semen eodem effectu prodest: urinam cito cōtra-
 Etioni prodest, aluo perquā cōmodata. Semine ad
 cōlimenta vtuntur: quod, vti in longū tēpus asser-
 uetur, adiecto lacte aut aceto, digerūt in pastillos.
 Gignitur etiānum syluestris eruca, maxime in Ibe-
 ria, q̄ occidētē spectat cuius semine pro sinapi inco-
 le vtuntur. Urinā vehemētius pellit, multo satiuā
 acipit. Ocimum. Cap. CXXXIIII.

Officinis
 Basilico.

Ocimum vulgò cognitū. Ad copiosiore cibo ocn-
 lorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritum
 mouēt, urinam pellit, lac euocat: agrè tamen confis-
 citur. Allitum cum polline polēte, aceto & rosaceo,
 pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis
 marini, & scorpionis ictibus per se prodest: et cum
 vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caligi-
 nem abstergit, destillationes exiecat. Semen potum
 conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina,
 inflatisq; maribus haustum, subinde mouet sternu-
 tamenta: quo l idem herba efficit, sed oculos premi-
 necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui
 in cibis abdicandum censeant: quandoquidem mā-
 ducatū, et in sole positum, vermiculos creat. Aphri
 autem adiiciunt, si feriantur à scorpione, qui oci-
 mum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche. Cap. XXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, et in-
 terdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine
 folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergē-

te: radice digiti crassitudine, & cū ariditate fracescit caulis, fistulosa. Hanc inter quedam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobanche sibi cognomentum vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. I. egumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. Cap. CXXXVI.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui best caule, folijs croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, e cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. Cap. CXXXVII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cū hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthii. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Tubera Cap. CXXXVIII.

Tubera rotunda radices sunt, sine caule, sine folijs flauescentes: vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis. Cap. CXXXIX.

Hortensis smilax, frutex, cuius semen à nonnullis lobia vocatur: folia habet hedera, molliora tamen: tenues caules, & capreolos, vicinis

DIOSCORIDIS

* Graecis fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt
 ce eſt ut topiarias ſcenas repreſentare uideantur: ſiliquas
 ſæniſgræci proferunt longiores & conſiores, in quibus
 ſemina renũ ſimilia, ſed inæquali colore recluduntur,
 * quæ quadam ex parte fulueſcunt. Siliqua cocta, cū ſemine
 in oleribus, aſparagi modo, eſtur. Urinam ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

Medica.

Cap. CXL.

Medica, cū recenter prodit, folijs & caule trifolio pratenſi ſimilis eſt: pro-
 cedens uero folia contrahit, caules edens trifolij, & ſiliquas corniculorum modo intortas,
 in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id ſiccatur,
 incundi ſoporis gratia, conditaneo ſali admisce-
 tur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt, illitu ſuffragatur.
 Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.

Aphaca.

Cap. CXLI.

Aphaca in aruiſ nasctur, altior lente, tenuibus folijs:
 ſiliquas lenticula maiores fert, in quibus terna quaternæue
 ſemina nigra, lente minor, continentur: quæ adſtringendi uim
 habent: quare torrefacta, ſtomachi aluiq; fluxiones ſi-
 ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

Porrum capitatum. Cap. CXLII.

Capitatum porrum inflationem facit, noxiũ ſuccum creat:
 tumultuoſum ſomnum parit, urinam ciet: alio accommo-

datur, extenuat, oculorū aciem hebetat, menses pel stem uo-
lit: sed lēdit exulceratā uesicam, renesq;: cum pti- citant.
sana uero coctum, esu pectoris uitia extrahit. Co-
ma eius in aqua maris, & aceto cocta, in dessebio-
nibus, ad præclusiones uulue, et duritias, utilis ha-
betur. Porrum bis aqua mutata coctū, tum frigi-
da maceratum, dulcescit, & multo minus inflat.
Semen acrius est, & quandam adstrictoriā uim
habet: quare succus cum aceto, addito thure aut
manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si nari-
bus erumpat. Venerem stimulat: cōtra omnia tho-
racis uitia tabemq; pro delinētū efficax est: arte-
riam esu purgat, sed si assidue estur, uisus obscuri-
tatē inducit: stomacho aduersatur. Succus ex mel-
le potus, aut illitus, contra hestiarum morsus auxi-
lio est: ipsum quoq; cum aceto aut thuris polline,
lacte aut rosaceo, utiliter auriū doloribus, & so-
nitui instillatur. Varos tollunt folia illita cū uua-
rhois, qua ad obsonia utuntur: epinyctidi meden-
tur: crustas ex sale illita rumpunt, ueteres sangui-
nis reiectiones cohibēt, si binis drachmis & aqua
li baccarum myrti pondere bibantur. Ampelopra-
sum stomacho magis aduersatur, et plus porro ex-
calfacit: urinam & menses uehementius ciet. Id
contrā serpentium morsus esse conuenit.

Cæpa.

Cap. CXLIII.

Cæpalonga acrior est, quā rotunda, item
flaua quā cādida, & sicca, quā uinidis,

DIOSCORIDIS

& cruda quàm cocta aut sale condita. Omnes ta-
 men mordent, flatus gignunt, appetentiâ inuitant,
 sitim mouent, & extenuant: fastidium pariunt, et
 expurgant: alio utiles sunt. Ea detractis purgant
 tis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq; ex-
 cretionum exitus referant, subdita pro balanis.
 Suctus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus,
 argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus
 auxiliatur: angina eodem perunguntur: suppressos
 menses pellit, caput purgat naribus insusus: canis
 moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum
 aceto aut perunctas in Sole, vitilignes sanat: &
 cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos
 cum sale reprimunt: contra calceamentorum attri-
 tus, cū gallinaceo adipe utilis est: cita alio prodest:
 in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad pu-
 rulentas aureis, & eliciendum earundem aquam,
 valet: alopecie earum succo perfriantur, qui cele-
 rius, quàm alcyonium pilos euocat: largiore cibo ce-
 pa capitis dolores ciet, cocta q; vehementius urinâ
 pellit: eos lethargicos efficit, qui uoletudinibus ad-
 uersis, ea etiam cocta, plus æquo nescantur: elixa,
 & cum passis uuis, & sico illita, tubercula conco-
 quit, & calerrimè rumpit.

Allium. Cap. CXLIII.

Allion quoddam satium atq; hortense habe-
 tur, quod in Aegypto, singulari, ut porrū, ca-
 pite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum:

reliqua uero magna, & candida, ex pluribus coag-
 mentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas, Græ-
 ci nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscoro-
 don, id est anguinū, uocant. Vis alij acris est: excal-
 facit, mordet, excernit, aliū turbat, inflationes fa-
 cit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatū permouet,
 summā corporis cutē exulcerat, aciem oculorū
 esu hebetat. Eosdē effectus præbet anguinū, quod
 & elaphoscorodon dicitur: latas uentris tinea in
 cibo sumptum abigit, urinas detrahit: contra uipe-
 rarum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita
 ut non aliud magis, si cū uino iugiter assumatur,
 aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum
 morsus & illitu, et cibo ualet. Magnæ & allio uti-
 litates contra aquarū mutationes: uocē clarificat,
 ueterē tussim crudum coctūm uel lenit: potum autē:
 cum origani decocto, pediculos, et lentes enecat: cre-
 mati cinis illitus sugillationibus cū melle, et alopecu-
 ræ cum nardino unguine, medetur: eruptiones: papu-
 larum cū oleo & sale sanat: uiriliones, lichenas,
 lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & fur-
 fures, cum melle eximit: cum thure, & tedi deco-
 ctum, dentium dolorem lenat, si in ore cōtineatur:
 contra uenenatos muris aranei morsus, cum ficula-
 neis frondibus, & cumino illinitur. Feruesfactæ co-
 mæ ius, sceminarum desessionibus additum, menses
 & secundos partus extrahit. Allium eiusdē gratia
 suffitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritum

DIOSCORIDIS

quod myrtoton uocant, esucit urinam, ora uenarū patefacit, hydropicis utile. Scorodoprasum magnitudine porrum equat, qualitatum porri, & allij particeps: unde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus allij, & porri præbens: inefficacius tamen, Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

Sinapi.

Cap. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi uocant. Eligi debet adultū, ualde rufum, non magnopere siccū. sed quod fractū internē uirescat, & ueluti quodā succo madeat, cæsum colore: siquidē recens id genus, tempestiuū habetur. Ad calfaciendū, extenuandū, extrahendū, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arterie scabritiem, succus ex aqua, & melle, cōuenienter gargarizatur: Sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur. Fœminas uulue stranguлатu oppressas excitat: lethargicis, de raso capite, illinitur cum ficis admistū, donec rube scat
 * καὶ locus, & ad coxendiciū cruciarius impositū, * ad
 επιήρας
 καὶ καθός
 λυ αἷς
 αὐτοχρ
 νος αλγυ
 κα
 lienes, & omne genus dolores confert, cum permu-
 tande ualeitudinis causa, ex alto uitia extrahenda
 sunt. Alopecijs illitum medetur, faciem purgat, sus-
 gillata cū melle, adipe, aut cerato rapit. Fera impe-
 tiginēs & lepræ, eo cum aceto perunguntur: con-
 tra febrim circuitus aridum bibitur, aut potui,
 polentæ

polenta modo, inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuentibus, vtiliter admisceri solet: tritum, grauitati aurium & sonitui. cū fico impositum prodest. Succus ad hebitudines oculorū & genarum scabritias magna vtilitate illinitur. Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Nasturtium. Cap. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babylo-
nicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tinea excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & eruce simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit, emittit furunculos, illitum cum miria. Herba ad omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi. Cap. CXLVII.

Thlaspī, herbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram versis, suppinguis, in cucumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascenibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latus se panden-

DIOSCORIDIS

* *Dionysius*: te: semine nasturtij incluso * lenticula vasis effi-
dis, id est gie, nisi quod infringitur, (vnde nomē accepit) flos
disci si albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq;
gura.

Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem vtrinque
extrahit, potum acetabuli mēsurā: prodest ischia-
dicis infusum: sanguinē potu educit, internas sup-
purationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat.
Alterū thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Persi
con sinapi vocant, latis folijs, radicibus magnis:
vtile ischiadicorum infusioni.

Draba. Cap. CXLVIII.

Alj ara **D** raba herba ad cubiti altitudinē assurgit, tec-
bis. nues spargens * ramos, & ex utroq; latere
* e' zβ folia, ceu lepidij, sed molliora, & candidiora: in ca-
dis, id est cumine vero sambuci umbellam gerit, cādides flo-
virgas. res habentē. Herba haec cum ptisana coquitur, in
Cappadocia maxime. Semen aridum pro pipere
obsonijs admiscetur.

Iris. Cap. CXLIX.

E rysimon, Latini irionem vocāt, iuxta vrbes,
rudera, hortosq; nascitur, folijs eruca sylue-
stris: cauliculis in lori modum lentis et obsequosis:
floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vt
fœnogræco, cornicularis: semine nasturtij, exiguo,
vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax
est, & si purulenta extussiuntur: regio morbo, &
coxendicibus prodest: cōtra venena in delinētū cū
melle datur: illinitur ex aqua aut melle vtiliter ca

et carcinomatibus, parotidibus, duritijs mammarum,
& testium inflammationibus. In totum extenuat,
et calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua
madescat atq; torreatur, vel linteo illigatum, pin-
sita, farina oblitum perassetur.

Piper.

Cap. CL.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ
inter initia, prælongum fructum, veluti sili-
quam promit, quod longum piper est: habet intus
aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfe-
ctum piper euadit. Ad aut suis temporibus dehiscens,
pædensq; sese racemos emittit, grana ferentes qua
lia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum
ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus
que contra venenata parantur: theriaca vocant.
Longum vero vehementius mordet: & quoniam
prius, quam ematurescat, decerptum est, subama-
rum relinquitur, antidotis & theriacis medicami-
nibus expetitum. Nigrum vero, utpote quod tem-
pestiua maturitate collectum sit, odoratum esse, con-
stat, candido suauius, acrius, & origratius, nec non
ad condimenta utilius. Sed candidum, & adhuc ip-
sacerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eligi opor-
tet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, re-
ces ac minime fursurosus. Inueniuntur etiam in
genere nigri semina nutrimeto defacta, cassa ina-
nia, minimiq; poderis, quod vocat brasma. Vis om-
nium excalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discen-

DIOSCORIDIS

tit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. P
per, febrium horroribus circuitu repetentibus, siue
potu, siue illitu, subuenit: serpentium moribus au-
xiliatur, partus extrahit. conceptum adimere cre-
ditur, statim à concubitu suppositum: iussi, omni-
busq; pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, suc-
currit: angine eo & melle conuenienter perungun-
tur: potum cum recentibus laurij folijs, tormina di-
scutit: cum vua passa manducatū, pituitam à ca-
pite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appe-
tentiam mouet, concoctionē adiuuat, ad intinctus
esculētorum additum: strumas cum pice discutit,
vitiliginēs ex nitro emaculat. Fictili nouo, vt * lē
ticula, motum torretur. Non est huius arboris raz
dix gingiber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo
post ostendemus. Nāque piperis radix costo simi-
lis est, ora gustantium accendit, salinam ciet. Hæc
lienem reprimat, cū aceto illita, vt pota: caput etiā
purgat, manducata cum semine pedicularis hera-
be, quam staphidem agriam vocant.

* φexη,
nō φασί

Gingiberis. Cap. CLI.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglody-
tica Arabia magna ex parte nascens: qua vi-
rene, ad multa, perinde atque nos ruta, viuuntur,
& primis potibus & eduljjs admiscet. Huius ra-
dices, cyperi modo, parue sunt, canalicantes, &
odorata, atque piper sapore imitantur. Eligi
debent quæ teredines non nouerunt. A multis

tamen ob id & conduntur, quod celeriter cariem sen-
 tiant, ac fistilibus in Italiam asportantur. Gingibe-
 ris cibo conueniens est, & cum condimento assumi-
 tur. Excalfactoriam vim & excoquentem habet:
 aluum leniter emollit, Stomacho utilis est, efficax
 aduersus ea, quae oculis caliginem offundunt. In an-
 ridota addi solet. In summa, piperis viribus res-
 pōdet.

Hydropiper.

Cap. CLII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quae sta-
 gnāt, aut pigro lapsu repunt: caulem edit ge-
 niculatum, & praedurum, multis alis concavum: fo-
 lia mentha, maiora, molliora, candidioraq; gustu
 piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam fru-
 ctum acrem, in surculis paruis, prope folia racema-
 tim coherentem. Folia cum semine illita tumores ve-
 teresq; duritias discutunt, sugillata delēt: quae post-
 quam inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admi-
 scentur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

Ptarmica.

Cap. CLIII.

PTarmica exiguis frutex est, surculos habens
 paruos, multos, & rotundos, abrotono non dis-
 similes, & circa eos folia oleae, longa, multa, & in
 cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotun-
 dum, quod suo acri odore sternutamentum excitat:
 unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugil-
 lationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissi-
 me mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

DIOSCORIDIS

Radicula seu lanaria herba.

Cap. CLIII.

Cēsetur
ea quā
uulgò sa
ponari.
dicunt.

S Truthium herba vulgò nota, qua purgadis
lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radice
est acris: vrinam ciet: prodest iussi, iocinero
sis, orthopnæ & ex melle sumpta, cochlearis mensu
ra. aluum soluit. Eadem cum panace & capparis
radice calculos frangit, & cum vrina exturbat. du
ritiam lienis absumit: menses imposita trahit, par
tus efficaciter enecat. Cum polenta autem & ace
to illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina
hordeacea, & vino decocta. Miscetur et malagma
tis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Siernu
tamenta mouet, per os purgat, trita cum melle, &
naribus infusa.

Cyclaminus.

Cap. CLV.

* ποφύ
γιοντα,
purpura
scētibus.

Cyclaminus folia habet hedere, purpurea,
varia, in quibus supra infraq; albicant
macule: caule nudo, quaternos digitos æ
quante: floribus in eo * purpureis, rosarum effigie:
radice nigra, & aliquantum lata, vt rapum videri
possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam
aquamq; detrahit: menses potu appositæ ciet.
Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur,
abortum fieri. Partum appensa accelerat: contra ve
nena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illi
ta contra serpentium ictus, remedio est: immista vi
no inebriat: regium morbum discutit, tribus drach

mis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum, qui ebibit, mulis vestibus contectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectioni autem sudores sellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deicienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subicitur: illito umbilico & imo ventre coxarum tenus, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retuse oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociuam sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absorbit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernionesq; foveri congruum est: ipsaq; in oleo retere feruescunt, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cere momento, ut strigmenti crassitudinem vnguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix, scilla modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nasitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

F St & altera cyclaminus, quam cissanthemon, aut cissophylon vocant: folijs hederæ, sed minoribus geniculatis caulibus, crassiusq; , circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinus hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cū vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per urinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. reliquias à partu purgat.

Dracunculus. Cap. CLVII.

D Racunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine. fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxq; : radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non abssimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis, succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lacina impositus, polypū absument: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excafacit: orthopnoeis, ruptis, vulsis, tussibus, destillationibus, auxiliatur: humores pectoris ex-

creatus facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farma eius ex melle delin- gatur: urinam pellit vencrem excitat, cum vino po- ta. phagedenas vlcera, & que cacoethe vocan- tur, trita cum melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos partus fieri solent: qui radice suas ma- nus perfricuerunt, à viperis ferri negantur: illita ex aceto, vitiligines emaculat. Folia recentibus vule- neribus, linamentorum vice, conuenienter imponun- tur: decocta in vino pernionibus apposuisse, prodest: caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Suc- cus radici ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctane, ad sanos- rum vsus, pro olera recipitur: in Gymnesijs insulis, que Balcares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Ra- dix messibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatur in umbra, & ita recone- ditur.

Arum.

Cap. CLVIII.

A Ron, apud Syros lupha vocitatum, folia emit larys of- tit dracunculi, sed longiora & paucioribus ficinis. distincta maculis: caulem suppurpureum, dodran- talem, pistilli specie, à quo croceum semen exit. ra- dice dracunculi alba, que decocta estur, utpote cū minus acris sit. Folia ad esum conduntur, & ari- da per se decocta manduntur. Radix, semen & fo-

DIOSCORIDIS

lia, dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fumo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum.

Cap CLIX.

Arisarū exigua herbula est cuius radix olea magnitudinem implet, longè maioris quam aron acrimonie: vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radicis, genitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

Hastula regia.

Cap. CLX.

Offici-
nis A=
phrodi-
los.

Hastula regia vulgaris notitia est, folijs maioris porri: caule leui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblonge, rotundae, glandibus similes, gustu acres, quae excalescunt: vrinas & menses epote ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachma pondere pote ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissime, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida, & depascentia, mamarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in faece vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polëta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitq; perquam utile oculis medicamentum ad purulenta

aureis per se: & cum thure melle, vino & myrrha
 tritus, prodest: in contrariam aurem: infusus, * * xab' =
 dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, ala αυτο v' ε?
 pecias ad pilum reducit. Oleum in excavatis radi- χ'δ' u' s.
 cibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus
 & ambustus igni, conducit: & surditati, instillatū
 in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, * lin * προα-
 teo antea perfrictam in sole, illito radix emendat. νατριφ'
 Semen floresq; in vino poti, scolopēdræ et scorpionū τα ε' ο'δ' q.
 venenis, mirū in modum resistūt: aluum purgant. ν' ω.

Bulbus esculentus. Cap. CLXI.

Esculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis
 estur: Stomacho & aluo utilis rufus, &
 qui ex Aphrica defertur. Amarus verò &
 scillinus, Stomacho aptior est, & concoctionē ad-
 iuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalsa-
 ciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; ex-
 asperant, multum alimenti præbent, carnes creant,
 inflationem pariunt: luxatis, fractis, articulorum
 doloribus efficaciter illinuntur: spicula extra-
 hunt: gangrenas & podagras ex melle aut per-
 sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cū
 melle & piperis polline illiti cohibent, sudores com-
 pesunt: Stomachi dolores mitigant: fursures &
 vlcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro ab-
 stergunt, sugillata varosq; per se, aut ex oui lutea,
 & lentigines cum melle vel aceto, emendant, fra-
 ctis auriculis vnguibusq; ex polenta medētur. ydē.

calidis cineribus torrefacti, tollunt flicus: item cum cinere è menarum capitibus, impositi: cremati vero, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atque cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus uomitorius. Cap. CLXI.

Bulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multo & longiora quam bulbus esculentus: radicem similem, & cortice nigro. Ea radice mans, ut decoctum eius potum, vesicae malis medetur. vomitiones mouet.

Scilla. Cap. CLXII.

Officinis
squilla,
Varronis
more.

Scilla vim acrem atque feruentem habet. assatam ad multa vtiliorem esse constat. Polline ad crustam subacto; aut luto oblita, in cibarium conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: quae exempla si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quae prius sunt: nam quae ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, induto operculo, quae in furnum demittatur. Sumi etiam solet quod maxime est medium, direptis viuo tenuis tunica, quod frustatim confectum coquitur, mutata se ius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat: traiecta quae lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidem parte se contingant: his scilla segni

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum, vti-
mur. Ad rimas pedum, interna pars cruda scillæ
in oleo seruesacta, aut cum resina liquefacta im-
ponitur: decocta in aceto demorsis à vipera, cata-
plasma est. Ad singulas assæ parteis adiectis octo-
nis tosti salis, cochlear vñū aut alterū damus ieu-
nis, ad emolliendam aluū: in potu aut & odoratis
medicaminibus, & quibus urinam ciere volumus
hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus
regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis,
& ore reūcientibus tres obolos, in delinctu ex mel-
le sumpsisse satis est. Coquitur cum melle, et estur
eorundē gratia, maxime vt cōcoctionem adiunet.
Strigmenta per aluum extrahit. Cocta & | mili-
sumpta modo, eosdem præbet effectus: sed cavēdus
scillæ vsus hu, qui intestinum sentiunt vlcus. Ad-
pensiles verrucas & perniones, tosta efficaçiter il-
linitur. Tertium semen, & in carica aut melle de-
notatum, aluum emollit. cilla tota in urine ian-
nua suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

De Pancratio Cap. CLXIII.

Pancratium, quod aliqui scillam appellant, ra-
dice est magni bulk, subrufo colore, aut sup-
purpureo, gustu amaro ac seruente: soivs aliq, sed
longioribus. Scilla vires & præparationem ha-
bet, eodēque pondere in morbis efficaçier. ssu-
miunt: cui tamen mitior quā scillæ facultas in-
est. Radicis succus cum etui farina digeritur

in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydro-
melite, commodissime dantur.

Capparis.

Cap. CLXV.

C Apparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum deli-
scens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosæ spargit, grades, numerosasq;. Tenui plerumq; solo, asperusq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis et fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat. Stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quam cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & urinam cruentamq; ex crementis emittit: bibitur utilissime in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & convulsis membris ciet, caput purgat Dentium dolorem sedat semine ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem proficit: ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ occaluerunt, expurgat: lientis comfarina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur. cum aceto trita, vitiliginem albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutit. Alui vermiculos infusus succus enecat.

Aphrica, & præsertim Marmarica cappar, vehementer inflat. Apula vomitus facit, & quæ à Lybico, & quæ Rubro mari desertur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat gingiuasq; osse tenuis exist: quare in cibis non ab re damnatur.

Lepidium. Cap. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Cēsetur vulgò nota: muria cum lacte seruatur. Vis fo piperisoli liorum & acris & exulcerans: quapropter ischia torum. dicis trita, præsentissimum est auxilium, si cū hele nū radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis si mili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum. Cap. CLXVII.

Complura ranūculi genera: vis tamen oībus Vulgò a= vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam piū risus vñū coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis pinguib: flore luteo, interdū purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaraq; multis capillamētis, hellebori modo, hbrata: nascitur in limitibus humidis. Alterum lapuginosus, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, * ple * & ali * runq; in Sardinia proueniēs, quā acerrimum, quod στερ, ed ē, syluestre apium appellant. Tertium minimū, odo= copiosu. re graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores, & cauliculi recentes, illis exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare

DIOSCORIDIS

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, Stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepente decocto permiones fouentur. Sicca radix, tritaq; Sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem ap-
 pensa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone. Cap. CLXVIII.

Duo anemones genera, vnum syluestre, alterum
 in cultis nascens. Cuius multae species: vna po-
 niceum florem profert: altera candicantem, aut la-
 eteam, vut purpureum. Harum folia coriambro si-
 milia, ceterum scissa tenuius in terrā inclinātur:
 caule languinosi, tenues, in quibus flores, vt papae-
 ueris, & in medio capitula nigra, aut coerulea. ra-
 dix olēe magnitudine, aut amplius paulò grande-
 scit, ac veluti geniculus quibusdam cingitur. Sylue-
 stri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, &
 duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, et
 multis radicum capillamentis. Acrior est, qua ni-
 gra habet folia. Vis vtriusque acris: ea de causa
 succus n. tribus infusus, purgat caput. Comman-
 cata radix pituitam trahit: decocta in passō &
 illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatri-
 ces eorundem & hebetudines emendat, sordida vl-
 cera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana de-
 cocti edantur, copiam lactis praebeant: menstrua
 ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras exi-
 munt. Sunt qui errore ducti, argemonem nomina-
 ri eupatorium

ri eupatorium putent: quoniam à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellât (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verùm papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas vero candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

Argemone. Cap. CLXIX.

Argemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florè puniceum: caput in calliculo papaueris rhœadis, oblongius, et summis partibus latum: radicem rotundā: succū croci colore, acrem, dimittit. Argema et nebulas expurgat. Folia illi in inflammationes cōpescunt.

Anagallis. Cap. CLXX.

Duo anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phoeniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo calliculo pusillis, subrotundis, ad belxine folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi.

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpori
aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gar-
garizatu purgat: & naribus infusus, dolorem den-
tium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: arge-
nta cum melle Attico emendat: retusa oculorum aciei
auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris &
renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt
eam, quæ cœruleum edit florem, prociduum sedem
reprimere: quæ uerò phœniceum, illitis euocare.

Hedera. Cap. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie sortie-
tur, summas autem genere treis. Nam
quedam candida est, altera nigra, tertia
helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, ni-
grum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam
vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet
viticulas, & folia parua, angulosa, & * concina-
nora. Hedera omnis acris est, & adstringens: ner-
uos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad-
dysentericos, in vino bis die potus: ambustu cum ce-
rato tritus illimitur. Recentia folia ex aceto cocta,
aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum
& corymborum succus, cum irino vnguento, mel-
le aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres
capitis dolores * caput eo cum aceto, & rosaceo per-
fundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus,
cum oleo medetur. Nigris hederae succus, aut e poti-
corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant lar-

* ὀφθαλμοῖς
καὶ τοῖς
ὀστέοις
καὶ τοῖς
ὀφθαλμοῖς
καὶ τοῖς
ὀστέοις

* ἀποτρίβει
τὸν πόρον
καὶ τὸν
ὀφθαλμόν
καὶ τὸν
ὀστέον

gius sumpti. Acini quinque triti, cal facti q; in prunici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillū, illiti corymbi. Folia in vino decocta, illuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint: initia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus. decocta. Mouent menses triti & subditi corymbi: idem poti, post purgationes fœminarū, drachmæ pondere, concipiendi spem adimūt. Pediculus oliorū melle irrigatus ac uulue indicus, menstrua et partus extrahit. Instillatus succus putrida tœdianariū, graueolētiamq; emēdat, et sanitati restituit. Lacryma hederæ psilothrū est: illitu pediculos enecat. Succus radicū in acetopotus, contra phalāgia prodest. **Chelidoniū. Cap. CLXXII.**

Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis: folijs rannunculi, mollioribus tamen, & colore cæsis: flore uiolæ albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus. grauitè olēs: radix superne singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur: siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatu in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso

DIOSCORIDIS

& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus que serpunt: imposita cum vino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirundinum exoriatur, et discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres ex acatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. Cap. CLXXIII.

Vulgo
Scrofula
ria mi-
nor.

Chelidonium minus, quod triticum sylvestre aliqui nuncupant, herbula pediculis ab radice pendens, sine caulibus: folijs hederæ, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in grarum tritici modum acervatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo summam cutem exulcerat: psoras et scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum, magnifice id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. Cap. CLXXIIII.

Varia
de Othō
na sentē
tia.

Othonnam aliqui maioris che'idonie succum esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum floribus corniculati pipaueris expressum. Alij permistos coeruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaveris succos, esse continent. Alij Troglodytica nuncupandam herbe succum, quæ othonna vocatur: na-

sciq; eam in eo Arabia tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs eruce, perforatis cribri modo, & veluti à tinea derosis, squallore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidā anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorū medicamentis adūcitur, vbi expurgare est opus: mordet enim & absterget omnem caliginem quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in parastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmāt, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. Cap. CLXXV.

MVris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, alijs quatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarū sinu prodeuntibus: flosculo, vt anagallidis, cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægyptiaca sanat. Sunt qui alium, muris auriculam vocent.

Glastum. Cap. CLXXVI.

Satium glastum, quo insectores lanarum vtuntur, folium habet plantagini simile, verum singulus nigriusq;: cuius caulis duum cubitorum altius

DIOSCORIDIS

tudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedenas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre glutinum sativo simile est: folia fert maiora, lactuca-
 ceis proxima: caules prætenues, multifidos, quadratenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen flore tenui, luteo. Eadem quæ & supra dicta præstat. potu & illitu lienosis auxiliatur.

* *Λύτο-
 τήκος,
 id est, te-
 nuiores.*

Telephium. Cap. CLXXVII.

*Vulgò
 Crassu-
 la ma-
 ior, &
 faba in-
 uersa.*

Telephium herba portulacæ similis est, & caule, & folijs: alas binas in singulis foliorum geniculis annectit, ramuli à radice senisepreniue prodeunt, folijs referti cæruleis, crassis, lentis, ac carnosiss, flore luteo, aut candido. Nasçitur inter vites, & locis cultis vere. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt, sed ubi inaruerunt, absterguntur.

SECUNDI LIBRI FINIS.

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER III.

Ioanne RVELLIO. Sueffionensi
interprete.



VPERIORIBVS, char-
rissime Aree, cōmentarijs, tra-
didimus de aromatibus, vngue-
tis, oleis, arboribus, earum fruc-
tibus & lacrymis, item de ac-
nimalibus, cerealibus, olera-
ceis, & herbis acrimonia præ-

ditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina,
herbas, & que vernacula & inter se cognata cen-
sentur, quæq; pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum.

Cap. I.

Agaricum radix fertur laferpitij similis,
sed facie summa solutior, & rariore sum-
gosq; tota contextu. Duo eius genera:
fœmina, quæ præfertur, rectus intus vena-
rū discursibus constat. mas rotundus est, & undiq;
cōpactior. Vtriq; gustus in initio dulcis, mox ex di-
stributione in amaritudinē transit: gignitur in Sar-
matie regione, quæ Agarica dicitur. Sūt qui radicē

DIOSCORIDIS

esse planta affirmant: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadā putredine. Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est contra tormina, cruditates, & rutta: prodest itidem cōtusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentientibus. febriculosis verò, in aqua mulsa. Arquati quoque, suspiriosis, oeneris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis. Atē si vrina egre reddatur, si vulnē strangulatus urgeat, si pallor membra decolorēt, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passio: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio Stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manducatur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acida ructantibus propinatur. Sanguinis re ectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicam, & articulorum dolores, & comuales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assimatur: mēses ciet: foeminas, quas inflatio vulnē vexat, vtiliter equali modo datur. Horrores soluit datum ante febrim accessione: alium purgat drachma vna aut altera, si eam aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes retum vibrarunt, morsumq; subfixerēt, tribus obolis ex vino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus vitijs conuenit: pro viribus, & etate datum, nunc

ex aqua, nunc ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum. Cap. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhapōticum vocāt, Ignora =
provenit in ijs, quæ supra Bosphorū sunt re = tur. Nec
gionibus, ex quibus afferitur. Radix nigra, centau = enim est,
rio magno similis, sed minor & rufior fungosa, ali quod
quantum lavis, sine odore. Optimum habetur, quod Reupon =
teredines non sensit. si gustatu cum remissa adstri tici no =
etione lentescat, māducatumq; colorem redilat pal mine ho =
lidum, aut ad crocum inclinantem. Ad epotum facit die indi =
ad inflationes, Stomachi imbecillitatē, & omne ge catur.
mus colores, al cōmussa, lienosos, hepaticos, tormina,
ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus inten =
ta præcordia, & vulnæ mala, coxendicum dolores,
sanguinis excreationes, sōstiria, singultus, dysente =
rias, & celiacorum affectus, contra febrium cir =
cuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis
vulētudinibus eodem, quo agaricum, pondere, et cū
eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin ali =
ter ex aqua mulsa. si tabem experiantur, ex passo:
si lienis exercet in aceto mulso si dissolutio est Stō =
machi, al est cū cibi tenax non est, manditur, &
sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia, lichenarq;
tollit, cū aceto illitum. Inflammationes omneis ve =
teres ex aqua oblitum dissipat summa eius vis ad =
stringens cum aliquanto calore.

Gentiana. Cap. III.

* Græ-
cus Gen-
sidi.

Gentiana inuentio prima assignatur * Gentio
Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit.
Folijs partim proximè radicem, in glandi plantagi-
nis similibus, subrubris, partim à medio caule, &
præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule
cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex
internallis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum:
semine in calycibus lato, sine pondere, glutinoso, sac-
tis ad sphondylii semen accedente: radice longe ar-
istolochiæ, crassa, amara. Nasitur in sublimibus
montium iugis, vmbrosis locis, aquosisq;. Vis radicis
excalfactoria, & adstringens: contra morsus ser-
pentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vi-
no pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, late-
rum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, &
convulsis, prodest hepaticis & stomachicis, pota
cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita,
partus eijcit: imposita, vt lycium, vulneraria est,
& vlcera cuniculatim depascetium medela. Suc-
cus præcipue eodem affectu prodest: oculis inflam-
matione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs
acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget.
Succi extrahendi ratio hæc est: Cotusa radix quin-
que diebus aqua maceratur: postea in eadem tan-
tisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrie-
xit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum
mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Aristolochia.

Cap. IIII.

Aristolochia nomē ex eo sibi adaptavit, quod existimetur optimē puerperis opitulari. Tri-
 pūs genera traduntur. Rotūda, quę fœmina voca-
 tur, folijs hederaceis: præstanti odore cū acrimonia,
 mollibus, subrotūdis, multis ab vna radice germi-
 nibus, prælōgis q̃; palmitibus: floribus candidis, pilei
 similitudine, in quibus quod rubrum est, grauit-
 olet. Lōga, mascula appellatur: nōnullis dactylitis,
 longiore quā rotunda folio: tenuibus ramulis, do-
 drantalibus: flore purpureo, grauit-
 olēte, qui mar-
 cescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix ro-
 tunda, in orbē conglobata, rapi modo. Longa verò
 radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudi-
 nem implet, nōnunquam paulō maiorem. Amba co-
 lore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiā-
 num tertia longa, quę clematitis vocatur, ramulos
 habēs tenucs, refertos folijs subrotūdis, minori sem-
 peruino similibus: flores ruta: radices longiores, te-
 nues, crasso cortice odoratoq̃; vestitas, priuatim vn-
 guentorum spissamentis cōuenientes. Rotunda cete-
 ris venenis resistit. Lōga verò aduersus angues, &
 venena, drachmæ pōdere ex vino bibitur et illinitur
 pota cū pipere, et myrrha, menses, partus, et omnia
 vuluarum onera eicit: eadē efficit subdita in pecto.

Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus,
 suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum do-
 loribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur.

Aculeos, & spicula extrahit, ossium squamas illicit

DIOSCORIDIS

adimit, vlcera putrida exest, & sordida expurgat: cauat cum iri, & melle explet, gingiuas, & dentes extergit. Clematitus ad eadem pollere creditur, viri bus tamen inferior est.

Dulcis radix.

Cap. V.

liquiri-
cia offi-
cis.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappado-
cia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cu-
bitorum altitudine assurgentibus folijs lentisci, le-
vis, pinguis, tactuq; gummosis: flore hyacinthi:
fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore,
qui siliquis lentium modo habet, rufas & *par-
uas: radicibus longis, vt gentiane, coloris buxci, sub
acerbis & dulcibus: quæ densantur in succum, ly-
cū exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur:
verum oportet vt lingua subditus eliquescat, estua-
ti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit: sanat ve-
fica scabiem, & renum dolores, cum passo potus:
idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus acco-
modatur, commendatus ori prodest. recentis ra-
dis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina
pterygij commodissime inspargitur.

* pax-
d est, lon-
gus.

Centaureum magnum. Cap. VI.

consuet-
Rheum-
licum of-
f. cinari.

Centaureum magnum folia habet iuglan-
dis, oblonga, viridi brassicarum colore, ser-
rata in ambitu: caulem ceu rumicis, binū
aut ternū cubitorum, multis ab radice adnatis, in
quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblon-
ga: flos æruleus: semē cnico simile, ceu lanis floccis

LIBER TERTIVS. III

quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo praeagnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & aprium, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia pluribusque locis circa Pholoen, Lyciam et Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussis: sanguinem expuētibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris, in vino. Item ad tormina, & vuluae dolores. Ramenta eius in collyrii formam vuluae subdita, menses atque partus extrahunt. Succus eadem praestat, vulneribus prolestat: nam recens tussa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tussa si mul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio viuitur.

Centaurium minus. Cap. VII.

Centaurium, limnesion aliqui vocauerunt, quoniam etiam rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rute, praelongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & superuacua, quae gustanti amaritudinem adfert. Herb. recens tussa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrices obducit: bilem crassosque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti scilicet etiam conuenientissime insunditur. trahit enim sanguinem

DIOSCORIDIS

nem & dolorem leuat. Succus oculorum medicamen-
 tis perquam utilis: siquidem cum melle caligine-
 nem oculorum expurgat: in uellere appositus, men-
 ses & partus extrahit: epotus peculiariter neruo-
 rum uitijs succurrit. Succo extrahendi ratio: Legi-
 tur herba semine prægnas, & diebus quinque ma-
 de facta, decoquitur, donec superemineat aqua:
 mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta her-
 ba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudi-
 nem habeat. Nonnulli eam recentem grauulamq;
 contundunt, atque succum fictili non picato expri-
 munt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, in-
 spissant. Quod siquid cōcretum faucibus uasis ad-
 hærescat, deradunt, reliquoq; humeri permiscunt.
 Noctu diligenter operiunt: nanque ros nocturnus,
 liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radi-
 cibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta
 (ut in gentiane mentione retulimus,) preparantur:
 sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis
 factitantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur.
 Sic è thapsia, sic è mādragora reliquisq; similibus
 succus sic ex acerbis uuis melligo elicitur. Lycium
 tamen, & absynthium, hypocistis, & consimilia,
 decocta, eo, quo diximus, modo coguntur.

Chamæleon albus. Cap. VIII.

Chamæleon albus, iuxta ideo aliquibus uocatur,
 quod quibusdam in locis uiscum circa radicem
 eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur mulie-

res: folia habet silybo aut carduo similia, & aspe: & Sic Pl
 riora, acutiora, nigroq; chamæleone ualidiora: cau: ni. gra=
 lem non promit, uerum ex medio spinas, echini ma: cus co=
 rini, aut cinaræ modo, erigit: flores purpureos, ueluti dex & a=
 papporum lanugines emittit: semen cnici simile: ra & xū rē a,
 dicem in latis collibus crassam, in mōtosis uerò gra id est
 ciliorem in profundo albam: aliquātenus aromati: crassio=
 cam, graui odore, dulcem. Que pota acetabuli men ra: ni
 sura, latas interaneorum tineas pellit. Bibitur autē forte
 in uino austero, cum origani feruesacti succo. Hy: & paxū rē
 dropicis commodissimè drachma in uino datur, et: pa legen
 enim eos extenuat: contra difficultatē urina deco: dū: quod
 Etum propinatur. Hausta in uino, serpentium uene ex her=
 nis resistit: occidit canes & sues: mures itē necat, barū col
 subacta cū polenta aut aqua, & oleo madesacta. latione,

Chamæleon niger. Cap. IX.

Chamæleon niger, folijs scolymo similis es uidere cō
 set, nisi minora, tenuioraq; , ac rubro di: tingat,
 stincta uiderentur: caulem emittit dodrā facile di
 talem, crassitudine digitali, subrubrum: & in um indicaue
 bella flores spinosos, tenues, hyacinihi emulos, uer: ris.
 sicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exce
 sa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mor=
 det. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tra
 ctibus, & maritimis. Radix trita, a luto atramen
 ti sutorij exiguo, cedrimo oleo, & axungia, scabiē
 abigit: eadem, cū sibi sulphur & bitumen ascie
 nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abs

DIOSCORIDIS

terget Decoctum collutione dentium, dolorem miti-
gat: cum pari pipere & cera oblita radix, doleat
denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto deco-
cta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scripto-
rio stylo feruens admoueat. vitia cutis in facie, uo-
tiliginesq; cum sulphure emendat: erodentibus me-
dicamentis admiscetur: phagedenas, tetraq; vlcera
Nominis illitus sanat. Quare chamaeleo vocetur, à varietate
ratio. foliorum euenic: mutant enim cum terra colorem.
hic viridia, illic albicantia. alicubi cærulea, nonnus-
quam rubra inueniuntur.

Crocodilium.

Cap. X.

Crocodilium chamaeleontis agri figurā ha-
bet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui,
aliquantum lata, odore, vt nasturtij, acu-
to. Feruesfacta in aqua & pota radix, sanguinem
copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos eni-
denter adiunians. Semen ei rotundum mest, duplex
vti scutum, quod suapte vi urinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris. Cap. XI.

Virga
astoris
ulgo.

Dipsacum, aculeatarum generis est, caulem
habet altum, spinis horridum, folijs lactuce,
spinosis, binis genicula singula complectentibus,
prælongis, cœu quasdam bullas intus & extra ac-
uleatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum
sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsa-
ci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine cau-
lis, singula circuli capitula insunt, oblonga, echin-

nata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq; medullatenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & decocta in vino radix, usquedum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba.

Cap. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chameleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulē supra binā cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantē, intus cauum: in cacumine capituli inest spinosum, echin marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semē cenicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & qui cruēta extussumt, efficax est: urinā, cit tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen convulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica.

Cap. XIII.

Arabicā spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa si quidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasq; fluxiones radix etiamnum valet. Proven-

DIOSCORIDIS

nit in asperis.

Carduus.

Cap. XIIII.

Est gallo-
rum Ar-
tichan. **C**arduus, Græci scolymon vocant, folia cha-
maleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, &
crassiora: caulē longum edit, foliosum, capite spi-
noso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolen-
tiam alarum totiusq; corporis emēdat: item si de-
cocta in vino bibatur. Copiosam autem urinam
fætidamq; expellit. Herba cū recens tenerescit,
in olera, asparagi modo, transit.

Poterium.

Cap. XV.

Poterium, Iones neurada vocant, largè fruti-
cat, cortice obductum tenui, spinis horridum,
lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, te-
nuius, tragacanthæ proximis: folijs parvis, rotun-
dis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius
usus, sed gustu acuto et odorato. nascitur in aquo-
sis, et collibus. Radices demittit binum ternūque
cubitorū, nervosas, & firmas: quæ proximè terrā
recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisis
neruis & vulneribus glutinandis illinuntur. Deco-
ctum quoq; eius nervorum affectibus prodest.

Acanthium.

Cap. XVI.

* Addi-
tū ex Pli-
nio. **A**canthium albæ spinæ simile, folijs nuclea-
tis per extremitates, * & lanugine araneo
sa obductis. Ex qua collecta & neta, vestes bō-
bycinæ similes texunt. Folia vel radices ad reme-
dia opisthotoni bibuntur.

LIBER TERTIVS. 114

Acanthus. Cap. XVII.

A Canthus, Romani paderotam vocant, na- Officinis
 scitur in hortis, petrosi, & rigui: folia ha- Braccae
 bet multò lactucaceis latiora, & longiora, eruce sina.
 diuisura, nigricantia, pingua, leuia: caulem binũ
 cubitorum, digitali crassitudine, laeuem, prope ver-
 ticẽ ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucas
 menta quedam oblonga referentibus, spinosis, è
 quibus flos proilit albus: semen oblongum, luteum:
 caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mu-
 cosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis igni & luxa-
 tis artubus illita subueniunt: potest vrinam ciunt,
 sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sen-
 tientibus, mirè profunt. Nascitur et syluestris aca-
 thus, scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sa-
 tinus, & is qui hortis prouenit: cuius radix ad eam-
 dem, ad quæ superior, efficax.

Anonis. Cap. XVIII.

A Nonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgò,
 mos habet fruticosos, dodrantaes, aut pau- Restabo
 lio maiores, frequentibus geniculis cinctos, canis uis.
 alarum multis, capitibus rotundis, folijs lentius * Suspi-
 le, tenuibus, pusillis, ad rutæ aut * pratensis loti cor loti
 folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non in- syluestre
 iucundè olentibus. Muria conditur, antè quàm intelligẽ
 spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus dum: ac
 spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent: raze ob id for-
 dicem mittit candidam, quæ excalfacit, & exte- tè pratẽ,

DIOSCORIDIS

sem dici, nuat: huius cortex ex vino potus, vrinam ciēt: calcu quod tri los comminuit, margines vlcera erodit. Radix cū folij pra decoquitur in posca, dolorem dentiū collutione miti tēsis cō= gat. Decoētum eius potu hēorrhoidas sanare stet folijs creditur.

vt vo = Leucacantha. Cap. XIX.

lumine **L** Eucacantha, prędita est radice cyperi, valida quarto à **L** & amara, quę manducata dolorem dentium Dioscori sedat: veteri laterū dolori, atq; ischiadicis prodest, de depin= decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadem ruptis gitur. & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdē prębet effectus.

Tragacantha. Cap. XX.

T Ragacanthę radix lata & lignosa, summo caespite nititur, vnde surculos humiles, robu= stos, latissimē fundit, in quibus minuta folia, mul ta, nonnunquam tenuia exoriuntur, quę sub se spi Officinis nas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiamnū Draga= tragacantha, lacryma, quę, vulnerata radice ma gantum. nans, concreuit. Pręstat pellucens, gracilis, levis, syncera & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamēta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas vo ces, cęterasq; destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoq; linguae liquescit, & in passō made= facta, drachmę pondere bibitur, contra renum do lorem, & vesicę rofiones, misto cornu cerui vsto et eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryngium. Cap. XXI.

ERyngium aculeatarum generis est. Cuius fo- Nūc cor
lia in principio, sale condita, in cibos recipiunt= rupto vo
tur: lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, cabulo
gustu aromatica. Sed ubi adoleuerunt, circa cōplu Iringū di
res caulium eminentias in spinas aculeantur, in citur.
quorum summitatibus globosa capitula, durarum
acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim cir= *Per an
cumuallantur, quorum colos aliās viridis, aliās al= thericū
bus, interdum cœruleus inuenitur. Radix oblonga, caulē A=
lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitu= sphodeli
dine, odorata. nascitur in asperis & cāpestribus. cui aptis
Vim habet calfactoriam: pota menses & vrinas simē cō=
pellit, tormina inflationesq; discutit. contra iocine= paratur
rum vitia, serpentium morsus, & hausta venena, Aloe, hic
cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cū se intelli= gis
minis pastinace drachma vna: appensa illitāue, mus quā
tubercula discutere proditur. Pota cum hydromeli uis Dios
te radix, opisthotonicis & comitialibus medetur. scorides i

Aloe.

Cap. XXII.

Asphode

ALoes folium scille similitudinē habet, cras= li siue ha
sum, pingue, modicè latum, rotūdum, retror. stula re=
sus pan lum: folia vtrinq; ex obliquo longioribus gie histo
interuallis striantur, & in spinulas desinunt retu ria, eius
sas truncasq;. Caulis emittitur non dissimilis * florē hoc
antherico: flos albus: fructus hastule regie cognā appellari
tus: graui tota est odore, & gustu amarissima: ra nomine
dice vna, cœu palo, in terrā depacta. Plurima præ= tra lat.

DIOSCORIDIS

pinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quodam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet * syn-
cera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum ex-
pers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta
facile liquefscens, eximie amaritudinis: improba-
tur nigra & fractu contumax. Gummi eam adul-
terant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, et
valido odore. eoq; argumento, quòd digitis friata
non ad minima vsq; frustra resoluitur. Nec desunt,
qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare,
exiccare, somnum allicere, & corpora densare, al-
uum resolvere. Stomachum repurgat binum co-
chlearium mensura, in aqua frigida aut egelida
pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum
purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ ponde-
re in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel
melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis per-
fectæ causa, tribus drachmis sumitur: alijs purga-
torijs medicaminibus admista, præstat vt minus
stomachum infestent: sicca glutinâdis vulneribus
inspargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohi-
betq;: eadem peculiariter exulceratis genitalibus

* Plin.
pinguis,
qui non
καταράν,
vt nostri
codices
habent,
sed λιπα-
ράν vide-
tur legis-
se.

medetur, & disructa puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat: hamorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pruriginēsq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pēnaq; subinde versatur, vt possit aqualiter torrerī. Lauatur, vt quod sit arenosissimū, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Absynthium. Cap. XXIII.

Absynthiū, aliqui bathypicron herba vulgō cognita. Præstatius in Ponto, & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi et adstringēdi: bilem expurgat, quæ & stomacho et ventri inhaesit: urinā cit, & crapulam præsumptū arcet. Ad inflationes ventris, et stomachi dolores prodest, cū seseli et nardo Gallico potum: fastidia discutit, et arquatos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cū melle appositum. Cōtra fungorū stragulationes conueniēter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cū vino itē cicula, et muris aranei morfib; et draconis marino.

DIOSCORIDIS

Angina eo cum melle & nitro perunguntur; & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sarnies. Dentium auriumq; dolores decoctum vaporis suffitu compeſcit. Decoctum in paſſo dolentibus oculis oblinuntur: item præcordijs et iocineri, tritum cum cerato cyprino: ſtomacho quoq; longa valetudine laboranti, cum roſaceo: cū ficis autem, aceto & loliacea farina, aque inter cutē lienofiſisq; ſubuenit. Vinum ex eo fit, quod abſynthiten vocant, præſertim in Propontide & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cū febris carent: alioquin in æſtate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. Inſparſum arcis abſynthium, veſtes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentū librarium diluto eius tēperatum, literas à murium eroſione tuetur. Exiſtimatur liquamentū eoſdem præſtare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniā ſtomachū malè habet, & capitis ciet dolore. Sūt qui cocta amurca, liquamentū adulterāt.

Marinum Abſynthium. Cap. XXIII.

A bſynthium marinum, quod aliqui ſcriphū vocant, copioſiſſimum in Tauro monte: in
 * Abrota Cappadociam & in Taphorifi Aegypti gitonū magnitur: quo Iſiaci pro oliue ramo vtūtur. Herba ē rē intelli tenuis, * abrotoni parui ſimilitudine, referta minutulis ſeminibus, ſubamara, ſtomacho inimica.

Ea graniter olet, et cum quadam calfactione adstringit: per sese, aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat: cum edulio autem vel lenticula decocta, eadem prestare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absynthio assignatur, quo Gallia alpihus finitima scatet: id patrio nomine Sătonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absynthio non dissimile, verum subamarum est, nō adeo seminis fecundum. Eadem que seriphium potest.

Abrotonum. Cap. XXV.

ABrotonum duorum est generum. Fœmina quædam arboris specie fruticans, candidat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim, incisiss: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodit, suauiter olet, cum grauitate quadã & amaro gustu: id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis vti absynthiũ. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in Syria Hierapoli. Crudum semen, tritũ & seruesactũ ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoeis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrine angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialiũ venenorum antidotũ est: horroribus ex olco illinitur: serpētes & substratu & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino po

DIOSCORIDIS

tum prodest priuatim efficax contra scorpionū & phalangiorum venena: oculorum inflammationibus commodè illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane tritum cū farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: irini compositionibus admiscetur.

Hyssopum. Cap. XXVI.

HYssopum, herba nulli nō cognita, duum generum est, montanum & hortense. Optimum est Ciliciū. Vim habet extenuandi & calfaciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspiriosis, destillationibusq; & orthopnoicis auxiliatur: tineas entecat. Idem facit, si cū melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctū ex aceto mulso epotum: & ad subducendam aluum cū ficis viridibus detritis manditur, vehementiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit: colorem in corpore fouet lieni, & aque inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex vino illinitur: cū feruente aqua impositum, sugillata discutit cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collusione sedat: inflammationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Stæchas. Cap. XXVII.

STæchas iuxta Galliam in insulis eiusdē nominis, Sticinis è regione Massilie gignitur, vnde cognomen accepit. Herba tenuibus surculis, comæ thymi, longiore folio, subamara gustu, et aliquantū acris.

Cuius decoctū hyssopi modo, ad pectoris vitia efficacē est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vniuersum animantis habitum extenuat, ab obstru-
ctionibus & fæctis liberat.

Origanum. Cap. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod & cuniculā vocant, solum habet hyssopo non dissimile: umbellam aut non in rotæ speciem orbiculatā, sed veluti multifidam, semine in summis virgis handquaquam denso. Excalfacit: vnde decoctum cū vino potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus virentis tonsillas, vnam, & oris vlcera sanat, & per nares, ex oleo irino infusum, trahit: aurium dolores cū lacte mulcet. Conficitur ex eo, & cepis, et rhois frutice, quo ad obsonia vtuntur, vomitoriū medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies bis videnos insolatis, dum canicule sydus flagrat. Herba aut substratu serpentes fugantur. Quæoni-
tis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei organi Heraclei, sed multò inefficacior. Syluestre

DIOSCORIDIS

origanum, aliqui panaces Heraction, alij cunilant
vocant, ex quibus est Nicader Celophonius. Folijs
est origani, ramis tenuibus, doctratē altis, in quibus
umbelle anethi insunt, flores candidi: radix tenuis,
supernacua. Peculiariter percussis à serpente,
folia & flores ex uino poti auxiliantur.

Tragoriganum. Cap. XXIX.

Tragoriganum tenuis frutex est, syluestri ser-
pillo aut origano similis, folio & ramulis.
Quibusdam in locis latius virentiusq; inuenitur,
& latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exili-
bus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prasiū
vocaere. Optimum est Cilicium, & Cretense, &
Smyrneum, & in Chio cooq; proueniens. Omnia
excalfaciunt, urinam cient, aluo accōmodantur,
decocto poto bilem deūciūt, lienosis ex aceto bibere
prodest, cōtra pota ixiæ venena in vino bibuntur,
menses trahunt: peripneumonici, tussientibus, ex
melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorū po-
tio est: quare cibum fastidientibus & stomacho
acida ruētanti, imbecilloq; traditur. Itē si a mari-
tima iactatione nausea et æstus præcordiorū exci-
tetur, tumores vero cum polenta illita discutunt.

Pulegium. Cap. XXX.

Pvlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat,
calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac par-
tus eijcit: pulmonis vitia ex melle & aloe potum
extrahit, & convulsis auxiliatur. nauseas stomac-

ubiq; intercisiones, ex posca permulcet: atra bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingivas aresacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omneis sedat, podagris per se subuenit, impositum vsque dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit, lienosis cum sale vtiliter illinitur: decoctum eius ablutas prurigines mitigat, conuersas vuluas corrigit, contra inflationes duritiasq; vulue, in desessiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui blechona, quoniã dum floret, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium.

Cap. XXXI.

Dictamnium, aliquibus sylvestre pulegium vocatur. Cretensis herba est, acris, levis, pulegio similis, sed maioribus folijs, que tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia que satium pulegiũ, sed efficacius multo. nam non potum modo, sed appositũ quoq; aut suffitum, defunctos partus eijcit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus reliquoue corpori aculeos, illitu reficit. Ad lienis dolorem efficax habetur: si quidẽ ipsum imminuit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit, partus accelerat. Succus cum vino

Græcus,
Dicta-
mum: ac
sic etiam
Plinius.

DIOSCORIDIS

potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta herba facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae venenato ictu seniunt, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, ante dicto simile, sed minus quam illud acre. Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multo. De fertur à Creta alterum dictamini genus, folijs sisymbrium, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & saluam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris et medicaminibus, quae aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca vocant.

Saluia.

Cap. XXXII.

Saluia siue eleliphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium scabritie referant, hirsuta, subalbida, perquam incundo odore, sed graui: semen summis in caulibus sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & vrinas, decoctum foliorum ramosumque potus, & partus extrahit, et pastinace marinae ictibus auxiliatur. Capillos demigrat, vulnerum sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat: testium pro-

ritus sedant rami foliaq; , si * decocto eorum so- * οὐν
ueantur. οὐα ἰ

Mentha. Cap. XXXIII.

Mentha, cognita herba est, calfaciēdi, adstrin-
gendi, atq; exiccandi vim habet. Sistit san-
guinem, poto ex aceto succo: lineas in ventre tere-
tes enecat, venerē stimulat, singultus, vomitiones,
cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati
succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta
illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet:
mammās, si tendantur, aut lacte turgeant, compe-
scit: cum sale, canum morsibus illinitur: aurium do-
loribus cum aqua mulsa subuenit: vulue ante coi-
tum admota, cōceptioni resistit: linguae scabritiem
conficta lauigat: coire lac, densariq; in caseum nō
patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In
summa, stomacho utilis est, & in condimentis pe-
culiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Lati-
ni menthastrū vocant, hirsutius est folio, & pror Mentha
sus maiore, quàm si symbriū, odore magis viroso: Strum.
quare minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha. Cap. XXXIIII.

Ex calaminthæ generibus quedam montibus Calamē
familiaris, folia ocimi habens, incana, surcu thum of-
los, & caules angulosos, purpureum florem: Alte- ficinarū.
ra pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre
pulegium ideo appellantur, quòd odore ipsum
amuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia men- Nepeta.

thaſtro cognata eſt, ſolijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam ſuperiora, ſed viribus inefficacior. Omnium ſolia guſtu impenſe feruentia, & acria: radix ſuperuacua. Naſcitur in cāpeſtris bus, aſperis, & aquoſis. Potu aut illitu demorſis à ſerpente opitulatur. Decoctum potu menſes, et vrinas expellit: ruptis, coluulſis, orthopnoæ, torminibus, cholericis, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: præſumpta in vino, venenu reſiſtit: tineaſ ceteraq; interaneorum animalia, cum ſale et melle pota, enecat: nec ſecus cocta crudæne, ſi teratur. Elephanticos eſitata adiuvat, ſi poſtea ſerum lactis ebibatur. Folia detrita ſi in vellere ſubiiciantur, menſes extrahunt, & partus enecant. Accēſa aut ſubſtrata, ſerpētes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & ſugillata tollūt. Calamintha iſchiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, ſummā cutem exurens. Vermes necat ſuccus auribus inſtillatus.

Thymum.

Cap. XXXV.

Thymum ab omnibus cognoscitur, ſurculofus frutex, exilibus ſolijs, multis & anguſtis circundatus: capitulis in cacumine, flore purpureſcente refertis. Gracili ſolo, & petroſo prouenit. Vinum habet hanc, vt cum ſale & aceto potum, pituitā per alium detrahat. Decocti ius prodeſt orthopnoicis, & anhelatoribus: tineaſ ventris exigit: mēſes, partus, & ſecundas pellit: vrinas ciēt: cum melle in ecleg

in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes in mores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit: ischiadicis cum vino, & polenta impositū subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum, qui recte valent.

A N N O T A T I O.

Herba, quam Medici pro satureia hodie vsurpant, hyssopi folio, thymum magnitudine longē exuperat, vt non esse genui nam, ac hic descriptam, satis eius historia conuincat.

Satureia. Cap. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamē, & tenerior: desert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadē potest quæ thymū, si modo cōsimili sumptitetur. Aptus sanis vsus: Est etiānum quādā satiuā, syluestri prorsus minor, q̄ propter mitiorem acrimoniam, cōmodius in cibos recepta est.

Serpillum. Cap. XXXVII.

Serpillum duorum generum est: Hortense odore sampsuchum imitatur, atq; in coronas addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terrā attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores: in macerijis multo procerius assurgit. Sylue-

DIOSCORIDIS

stre, xygis appellatum, non serpit, sed in altitudine
 increscit, ramulos edens tenues, surculosos, folijs re-
 fertos, longioribus quam ruta, & durioribus, angu-
 stis: flores incunde olent, gustanti acres: radicis nul-
 lus usus. Nasceitur in petris, satiuo efficacius, atq;
 magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius.
 Menses trahit, urinā potu ciet: torminibus, ruptis,
 vulsis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur:
 & aduersus serpentes potu illitūe: capitis dolores
 mulcet coctum, adiecto rosaceo, & madefactum
 in aceto: maxime vero phreniticis, et lethargicis cō-
 uenit. Cruētos vomitus sedat succus, drachmis qua-
 tuor ex aceto potus.

Sampsuchum. Cap. XXXVIII.

Sampsuchum in Cypro, & Cyziceno laudatissimum: secundum sibi locum vendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula, et Cyzicena appellat Herba est ramosa, per terram repēs, folijs eius calaminthæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens: Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinae difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subditi in pesso trahunt: cōtra scorpionis ictū ex aceto & sale illinūtur: luxatis tumoribusq;, cerato excepta imponuntur: aduersus oculorū inflammationes, tumoresq; cū polline polentæ illini prodest Acopis ma-

lagmatisq; calfaciendi gratia commiscetur.

Melilotos, siue fertula Campana.

Cap. XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescēte, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam: inflammationem omnē emollit, praesertim quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum aut addito oui luteo assato, aut sceni graeci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intyboūe. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, et cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus auriū mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum.

Cap. XL.

Marum herba cognita vulgò, surculosa, flore origani, folijs multò candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sifymbrio cōsimilē. Substringit enim, & modicè calfacit: qua de causa illitu serpētia vlcera sistit, et in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos.

Cap. XLI.

Acinos aut aconos à Graecis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis, odor

DIOSCORIDIS

rata, sed hirsutior qua corona factitantur, à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis.

Cap. XLII.

* *euodius*
id est odorata.

Baccharis herba * fruticosa, q in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media viole & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicate, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squallidumq; solū amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diuturnæ tussi, & vrinæ difficili: menses pellit: contra serpentium morsus vtilissimè datur in vino. Recens radix apposita, partū extrahit puerperis eius decoctū in desessionibus prodest: in diapasmata vtiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, vtpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu prosunt: oculorū inflammationibus, māmibus tumentibus à partu, ægylopijs incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta.

Cap. XLIII.

Ruta montana sylvestrisq; sativa, et hortensis acrior est, & in cibis damnata: sativa vero quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraq; vrit, calfacit, exulcerat: vrinæ ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibōque letha

tium medicamentorum antidotum est, si semen ex
 vino, acetabuli mēsurā, ebibatur. Folia per se prae
 sumpta, aut cum nuce iuglandē, aridisq; ficis, inef
 ficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes
 simili modo sumere conuenit: genituram cibo po
 tūue extinguit: cum anetho sicco decocta tormina
 sedat. Facit ad pectoris laterumq; dolores, difficul
 tatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, co
 xendicum articularumq; cruciatus, & horrores fe
 brium circuitu repetētes, pota ut antē dictū est. Itē
 ad inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini, cū oleo
 decocta, & infusa. Fœminas vuluæ strangulatu
 liberat, si à genitali, sede tenus cum melle subijcia
 tur. Feruefacta ex oleo, & pota, vëtris tineas ex
 cutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cu
 tem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur,
 decocta in vino ad dimidias partes, et oblita. Cru
 da conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores ocu
 lorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cū
 rosaceo, & aceto illita auxiliatur, profluentē nari
 bus sanguinem sistit trita & indita, testium ine
 flammationibus cum laureis folijs imposita, et eru
 ptionibus papularum cum myrto, & cerato pro
 dest. Cum pipere aut, uino, & nitro affricta, albæ
 uiligini medetur. Cū eisdem illita fornicationes
 tollit, & uerrucas, quæ thymi florē repræsentant:
 contra impetigines cum alumine, & melle utilis
 si mē imponitur. Succus in mali punici calyce calfa

Etus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum sceniculi succo ac melle peruncti iuuatur: ignem sacrum, ulcera quae serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerusa persanat: mansu, alliorum caparumque acrimoniam domat. Mōtana, si copiosius estur, interficet. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam vinctis antea manibus, et facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum feles arceret. Adijciunt eam, quae in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinentiam vrinetostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly uocatur. Syluestris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicis cum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

Syluestris ruta. Cap. XLIIII.

Vocant etiamnum syluestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asia finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice, multos emittit cauliculos: folijs multo, quam alterius rутae longioribus, tenerioribusque, odore graui: flore cā

didō: capitulis in cacumine paulo maioribus quam sativæ ruta, quæ tribus maxime partibus cōstat: in quibus triangulū semen, subrusum, gustu amarum recluditur, cuius est vsus. Semen autumnō maturarescit: quod cū melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam harmalam vocent, Syri besasan. Qui Cappadociā incolunt, moly; quoniā quandā cū moly seruet similitudinē: radice nigra, flore candido. In collibus, & leto solo provenit.

Moly. Cap. XLV.

Molyfolia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorē, ac magnitudine violæ purpureæ respondentem, lætæ coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid, quod alijs speciem referat. Radix parva, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cum rino vnguento, in pessa subiiciatur.

Panaces. Cap. XLVI.

Panaces nonnullis heracleū dicitur, ex quo opoponax colligi solet. Plurimum in Bœotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; cōpendij, & questus, qui ex eo liquore factitatur, gratia studiosè colitur. Folys est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis: caule, vt ferulæ, altissimo, qui lanugine quadam in-

DIOSCORIDIS

canescit, folijs etiam minutioribus obsitus, muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato seruenteq;: radices habet multas ab origine una, candidas, graueolentes, crassi corticis, & sub amari gustus. Nas citur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cute croceum colorẽ contrahit. Effluentem aut succum excipiunt, folijs excanato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq;: siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, seruantes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, leuis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliques cens, graui odore. Niger improbat, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera: sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resolua tur, & lactescat. Excalfacit, molli, extenuat: horroribus febrium circuitibusq;: uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urine conuenit. Contra uestica scabiem ex aqua mulsa aut uino bibitur: menses trahit, foetum enecat, inflationes, quæ uuluam malè habent, duritiasq;: ex melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur, aco-

Pice & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum uua passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, canis inditus: oculorum aciem illitus excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum cōtra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conscissa, uulue admota, partus extrahit: ad uetera ulcera efficax est, nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semē cum absynthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia que uenenum eiaculantur, & contra uulue strangulatus in uino bibitur.

Panaces Asclepij. Cap. XLVII.

Panaces Asclepij caulem à solo emittit tenuē, cubitalem, geniculatum, circa quem folia fasciculi funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq; odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicant aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliarem uim habent flores & semina, cōtra ulcera, phagedænas, & tubercula, si trita cū melle imponantur: aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum uocant, alij cumilam, de qua in origani mentione diximus.

Panaces chironium. Cap. XLVIII.

Panaces Chironium, in Pelio monte maximè provenit: folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu

DIOSCORIDIS

atris. Pota radix serpentium veneno resistit, Illita
coma, eadem præstat.

Ligusticum. Cap. XLIX.

Galeo
Libyfti =
cum.

* *Agg*
reis oiw
gufi, id
est, iuxta
fossas.

Ligusticum, quod alij panaceam, alij panaces
vocant, plurimū in Liguria nascitur in mon-
te Apennino, Alpibus contermino: vnde nomen tra-
xit. Panaces incolæ non ab re appellant: quoniā &
radice & caule, heracleotico panaci simile sit, &
viribus eisdē præditum. Gignitur in altissimis aspe-
risq; montibus, ac vmbrosis, maximē uero * iuxta
fluenta. Cauliculum fert æuethi, geniculatum, te-
nuem, & in circuitu folia fertula campanæ, mol-
liora, odorata, prope verticem graciliora, & longē
magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semē
dependet nigrum, solidum & oblongum, sceniculo
proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix
candida, heracleotici panacis similis, odorata. Ra-
dicis seminisq; vis excelsatoria, concoquens: pro-
dest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones.
Item ad inflationes, præsertim quibus Stomachus
turgeat: & contra serpentii ictus: vrinas & mē-
ses potu trahit. Eosdem præstat effectus apposita
radix. Semen cū radice oxyporis & medicamentis
decoquentibus admiscetur: ori perquā utile: quā-
re pro pipere vtuntur eo indigenæ, a l obsonia. Adul-
teratur semino quodam simili, quod facile gustu
discernitur: amarum enim est. Alij semen sceniculi
aut feselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Pallinaca. Cap. L.

Pallinaca syluestris folia gingidij habet, latiora, subamara, caulē rectum, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddā cernitur colore purpureo, ferē ad croceum accedente: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, que cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua mouet. Iis conuenit i potione, quos vrina difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutē subijt: serpentium moribus ictibusq; prodest: presumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix urinam pellit: venerē stimulat, partus apposita eicit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedenas vlcerū purgāt. Satiua ad eadem pellet, efficacior tamen, & cibo aptior.

Seseli. Cap. LI.

Seseli Massiliense folia sceniculi habet, crassioribus Si-
 rarcaulem vegetiorem: umbellam anethi, in
 qua semen oblongum, angulosum: degustanti stas-
 tim acre: radix longa est, iucundi odoris Semen & tanum.
 radix excalescendi vim habent: potu strangu-
 rie & orthopnoe medentur, suffocationibus ma-
 lierum comitialibusq; prosunt, menses & par-
 tus trahunt: ad omnia interna mala polleunt, & us-
 sim veterem sanant. Semen cum vino potum, con-
 coquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile,
 & contra persfrictiones in itineribus, cum pipere

DIOSCORIDIS I

& uino bibitur: capris, ceterisq; pecundi bus, datur in potu, quo facilius suos fectus emittantur. Aethiopicum seseli, folia habet hedera, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmis tribus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem densso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suavi. Peloponnense folia habet cicuta, latiora, et crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carum. *Idon*, nosisus pendet. Eisdem uiribus praeditum est: nasci-
id est, in tur in asperis, riguis, & collibus: inuenitur & in
Ida mon insulis.

Creticum seseli. Cap. LII.

TOrdylum, quod aliqui Creticu seseli uocant, iuxta Ciliciam in Amano mote nascitur, her-
bula surculosa, semine duplici, rotundo, scutuloru effigie, odorato, subacri. Contra urine difficultate bibitur, potu cit menses. Succo seminis, caulisq; uirentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Hic omis Sison. Cap. LIII.

sa est ab **S**ison exiguum semen est, in Syria natum, apio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lie-
te descri nis uitia bibitur, urine difficultatem potu emen-
ptio. dat, remoratos menses citat. Quo in condimentis,

cum cucurbita, & aceto, indigenæ utuntur. In ca=
cumine granula multa gerit.

Anisum.

Cap. LIIII.

ANisum in summa excalfacit, exiccat: oris ha=
litum iucundiores facit, doloris leuamentū
præstat, urinam ciet: aquam, quæ subijt cutem, dis=
sipat, potum sitim cohibet, animalium uenenis ad=
uersatur: ualet ad inflationes, aluum & alba fœ=
minarum profluvia sistit, lac ad mammas elicit,
uenerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitū na=
ribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis au=
ribus medetur. Melius semper recens, plenum, non
fursurosum, odore præstans, Inter prima laudatū
est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum.

Cap. LV.

CArum, semē est uulgaris notitiæ. Excalfacit,
urinam concitat, stomacho utile, os commen=
dat, concoctionem adiuuat, utiliter miscetur anti=
dotis & oxyporis: anisi uicem præbet. Radix co=
cta, pastinacæ modo manditur.

Anethum.

Cap. LVI.

ARidis anethi comæ seminisq; decoctum, potu=
lac euocat, inflationes & tormina sedat,
aluum uomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus le=
nit, oculorum aciem hebetat, & genituram restin=
guit assidue potum. Fœminis uulua malo oportue
nis, ad defæssiones uile, * condylomata illius eius
eius tollit.

* τὸ δὲ
σώμα
καὶ ἐν καί
καταπλα
σθῆν

DIOSCORIDIS

Cuminum satium. Cap. LVII.

Cuminum satium ori gratū est. sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locum tenet Aegyptum: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesq; conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina ceratoue, Mensum abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibetium aut perunctorum mutat in pallorem.

Syluestre cumini. Cap. LVIII.

Syluestre cumini, plurimum efficaciusq; in Lydia & Galatie Asia, atq; Carthagine Hispania Graecia gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac teretius: sed nui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, veluti serpens ratis, & gurgidij diuisura. In cacumine, capitulis Marcel = quina, aut sena habet. mollia, rotunda: in quibus est lina, Gala semen acerosum, gustu satino acriore: nascitur in Asia. collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesq;: item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat, stomacho utile, quem humor vexat, sugillata tollit, si manucatam cum melle, & uua passa illinatur: testium inflammatio-

nibus, adiectis eisdem illitū medetur. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod a singulis floribus promit cornicula in sublime exerta, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpētium moribus praesidio est. Calculosis & ijs qui vrinae stillicidio vexantur, aut cōcretum sanguinem cū lotio reddunt, auxiliatur, sed apij semen feruesfactum postea bibendum est.

Ammi.

Cap. LIX.

Ammi * Aethiopicum cuminum appellant, * ἐνιορ
καὶ τὸ
* εἰ δὲ
βασιλι
κὸν κύνι-
ον καλῶ-
σιν, ἐν οἷ
δὲ &c.
* τῇ γένε-
σει
* plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimāt. Vulgò notum est: semen exile, multò minus cumino, organum * respiciens. Eligendum est purum, minime fursurosus. Vis ei excaesfactoria, feruens, & exiccans: facit ad tormina, vrinae difficultatem, serpentii ictus, cum vino potū. menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quae ecdoria vocant: vt inde exortis urinae difficultatibus resistat. Sugillata cū melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in palliorem. Suffitum cum uua passa aut resina, uulvas purgat.

Coriandrum.

Cap. LX.

Coriandrum, aut corianum, vulgaris est notitia, uim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quae serpunt, medetur: epynictidas cum melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculósque sanat: cum faba fresa, Strumas & tne-

bercula discutit: tineas interaneorum expellit & se-
men cum passo potum, et genituram adauget: lar-
gius autem sumptum, mentem nō sine periculo mo-
uet, quare cōtinuo, & copiosore usu abstinendum.
Succus cum cerusa, spumāue argenti, necnon aceto
& rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflam-
mationes emendat.

Hieracium.

Cap. LXI.

Hieracium magnū, caulem emittit asperum,
subrubrum, spinosum, cauum: folia ex inter-
uallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambi-
tū: luteos flores in oblōgis capitulis. Vim refrigerā-
di, habet, & modicè substringendi: unde illitū, sto-
macho æstuāti, inflammationibusq; prodest. Succus
erosionē stomachi sorbitione mitigat. Herba cum
radice illita, uibratis à scorpiōe ictibus auxiliatur.
Hieracium parū, folia eodem modo obtinet ex in-
teruallis diuisa per ambitū, cauliculos teneros, uixē-
tes, in quibus lutei flores, orbē circinātes, emicant.
Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ. } Legitur in Græcis,
corruptè ac nullo planè, si quid est in me-
iudicij, sensu, κεφαλαία μικρών παρ᾽ ἐμπερῆ. id
est, capitula succo papaueris similia. Vide-
tur autē locus ex Theophrasto ac Plinio
quo Oreoseliaon cicutæ folio describunt,
hoc modo posse restitui: φύλλα καὶ νεῖω παρ᾽

πεμφεγν, id est, folia cicutæ non absimilia: quo d cum alijs satis aptè cohæret. Velim tamen in hac re, vt & alijs omnibus, suo quenque vti iudicio.

Apium.

Cap. LXXII.

Hortenſis apij herba ad eadem, ad quæ coria-
num, conuenit: inflammationibus oculorū, Noſtrū
cum pane aut polenta illinitur: æſtuantem ſtoma- Petroſeli
chum mulcet: māmaram duritiā ex lacte cōcre num, vt
to contractā reprimi: vrinā ciet, ſiue crudam, ſiue colligi-
coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potum, ve tur ex no-
nenorum noxæ reſiſtit, quum vomitiōnes excitet: tis Plinij.
aliūm cohibet. Semen vehementius vrinā pellit
contra ſerpentium venena, aut epotā argenti ſpi-
mā auxiliatur: inflationes diſcutit. Admiſcetur me-
dicamentis, quæ dolorum leuamenta præſtant: the-
riacis quoq; , ac tuſſis remedijs. * Eleoſelinum in * Apiū
humidis naſcitur, ſatius grandius, & ad eadem officina-
efficax. Oreoſelinum, cauſe eſt dodrantem alto, ab rum.
radice tenui exeunte: per cuius ambitum ramuli,
* et capitula cicutæ, multò tamē tenuiora: ſemine
cumiui, oblongo, acri, & odorato, tenui: naſcitur
in petroſis & montibus. Vrinam ciet, ſemine ac
radice in vino potis: menſes trahit. Antidotis,
necnon medicamentis vrinam cientibus, & ex cal-
factorijs, inferitur. Nec allucinari nos oportet, exi-
ſtimātes oreoſelinum eſſe, quod in ſaxis prouenit:
aliud enim eſt petroſelinum. Petroſelinum in Ma-

DIOSCORIDIS

cedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammij
odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit
ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes,
& tormina prodest: laterum, renum, & vesicæ do
loribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis vri

* Gale= nam cientibus Hipposelinum, * Latini olusatrum
nus smyr appellat, aliqui smyrnion, quauis aliud sit, quod
nium. de proprie smyrnion dicitur, vt paulo pōst referemus.
quo se= Est autem maius & satius apio candidius: caule
quēti ca. alto, cauo, molli, habente veluti lineas: folijs latiori
Romanis hus, in puniceum vergentibus: coma roris marini,
sic dictū florum plena, dependentibus in cacumine corymbis,
fuisse, li. ante quā deflorescat: ea semine turget nigro, ob=
2. de A= longo, acri, solido, aromatico: radix dimittitur odo=
lim. fa= rata, candida nec crassa, quæ os cōmendat. In vni=
cult. tra= brosis & palustribus enascitur. olerum generis, vt
dit. apium. Radix cruda coctāne estur. Folia cum caulō
bus decocta manduntur, & per se aut cum pisci=
bus preparantur, crudaq; iuuia cōsumuntur. Vinū
hanc habet, vt poto semine ex majo vino menses
cieat: algentes calfacit potu aut illitu: vrine stilli=
cidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrnum. Cap. LXIII.

S Myrion, quod in Cilicia petroselinum vocāt,
plurimum in Amario monte gignitur. Caulem
habet apij, & stolones multos: folia latiora, sub=
pinguia, ad terram infracta, robusta, odore medi=
cuto, cum quadam acrimonia incunda colore io

luteum languescente: capitibus caulium orbicula-
tis, vt anethi: semine brassica, rotundo, nigro, sapo-
re aspero, sicut myrrha, ita vt alterum alterius lo-
co cedat: radix quoq; odorata, gustu acri, fauces
mordet, succosa mollis: cortex eius foris niger, in-
tus viridis, aut subalbus. Nascitur in saxosis, et
collibus, atq; squallidis, & limitibus terrenis. Vis
radicis, herbe, et seminis excalfacere. Folys muria
maceratis ad obsonia vtuntur, alium sistunt, radi-
cem contra serpentium ictus bibere cōuenit, tusses
& orthopneas mitigat, vrine difficultati mede-
tur: recentes tumores, collectiones, duritiasq; discus-
sit, illita & vulnera ad cicatricem perducit: par-
tus abortus vitiat, si feruesfacta subijciatur. Semē,
lienis, renum & vesica vitijs prodest: menses &
secundas pellit: commodi datur ischiadicis in vino, * Intelli
inflationes stomachi lenit, sudores ciēt, & ructus. ge nō co-
Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra ronariā
febrium circūitus.

rosmari

Elaphoboscum. Cap. LXIIII. num: sed

Elaphobosco foeniculaceus caulis est, * aut eā, quæ
rorum armo similis, geniculatus: folys duū simplici-
digitorum: latitudine, vt terebinthi, prælongior hoc
gis, aliquantum asperis, circumfractis: adnata noīe ap-
multa habet, ferentia umbellas anethi similes, & pellatur.
semina eiusdem: florem subluteum: radice ternum de qua
digitorum longitudinis, & crassitudinis vnius, c. 70. hu-
candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olere ius libri.

DIOSCORIDIS

manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium morsibus resistere.

Fœniculum.

Cap. LXV.

Fœniculū si herba edatur, aut semen cū ptisanā bibatur, māmas lacte replet. Comæ decoctū in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinā excitet: contra serpentium ictus in vino cōuenienter bibitur: mēses: ciet: in febribus nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices et cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandā oculorum aciē commodē temperantur. Extrahitur succus ad eadē valens, etiam semine viridi, ramulisq; et radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occidentē spectat, succum reddit gummi similē. Caulem medium, dū herba floret rustici demetunt, igniq; admouēt, quod facilius vt caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hippomarathrum.

Cap. LXVI.

Est & sylvestre fœniculum, magnum: fert autem semen canchryi simile, cuius radix incundē olet, potaque stranguaria medetur: menses impedita ciet: ventrem sistit, radice aut semine potō, & contra serpentium morsus auxiliatur, calcu-

losq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-
ctis abundantiam facit decoctum foliorum hau-
stum, et fœminas à partu purgat. Traditur aliud
hippomarathri genus, longo, exili, & angusto fo-
lio: semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo
respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum.

Cap. LXVII.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creticum fo-
lijs fœniculo simile, minoribus & tenuiori-
bus caule dodrantali, umbella coriandri, flore al-
bo: semine acri, candido, hirsuto, suavisissimi odoris
in mandendo: radix digitali crassitudine & dodra-
tis longitudine adolescit: in saxosis nascitur, & lo-
cis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestri apio si-
mile, acre, odoratū, aroma olens, feruentis gustus.
Probatissimū Creticū. Tertium assignatur genus
folijs coriandri, floribus albis, capite & semine ane-
thi, muscario pastinace: semine oblongo, ceu cumini,
acri. Omnium semē excalfacit: potum urinā, menses,
& partus extrahit, torminibus liberat, veterē tus-
sim mitigat: phalāgiorū morsibus potū in vino au-
xiliatur: tumores illitu discutit. Seminis dūtaxat
alijs generibus inualuit vsus: in Cretico, etiā radi-
cis, quæ maximè cōtra venenatorū iniuriā in vino
bibitur.

Delphiniū.

Cap. LXVIII.

DELPHINIUM, surculos emittit à radice una
sesquipedales, aut maiores, à quibus folia

DIOSCORIDIS

exerunt parua, tenuia, diuifa, praelonga quæ delphinorum effigiem repræſentant: vnde tractum nomē eſt. Flos violæ alba non diſſimilis, purpureus: & ſemen in ſiliquis, milio proximum, quo non aliud vtilius bibi poteſt, ab ſcorpione percuſſis. Aiunt enim obiecta herba, ſcorpiones reſolui, atque igna uos torpeſcere: ſemota uerò ea, ſeſe recolligere. Pro- uenit in aſperis & apricis. Alterum eſt delphiniū, quod Romani bucinum vocant, ſuperiori ſimile. ſed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eiſdem pol let, ſed non ita efficaciſ.

Pyrethrum. Cap. LXIX

Pyrethrum Romani ſaliuarem vocant, fo- lia caulemq; emittit vt daucum ſylueſtre & ſæniculum: vmbellamq; anethi, circi- nate rotunditatis. Radix longa eſt, pollicis craſſitu- dine, guſtu feruidiſſimo. Pituitam elicit: ideò in do- lore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, au- xiliatur: manſa pituitā extrahit: ſu- lores ciet, per- uncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficace eſt & contra perfrictiones membrorum, reſolutio- nesq; eximiè conducit.

Roſmarinus. Cap. LXX.

Cāchrys

Dvororismarini genera: vnum ſæcundum fru- giferumq; cuius ſemen canchrys vocatur. fo- lia ſæniculi habet, craſſiora & latiora, in rotæ ſpe- ciem, humi ſparſa, iucunde olentia: caulem cubiti al- titudine, aut maiorem, multis concavum alis: in-

cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, intundū, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit: radix thus redolet, candida, praegravida. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrū, vti sphondylium, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verū id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nasceitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hemorrhoidum profluvia sistit, sedus inflammationes & conchyliomata mitigat, concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem aegrè perducuntur. Sicce radices cum melle ulceri purgant: torminibus medentur cum vino pota, & contra serpentium morsus conveniunt: menses et urinas cient, veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice quàm herba succus, adiecto melle illitus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadē pollet, si comitialē malum sentiatur, aut vetus peſtoris vitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur: sudores movet, cū oleo perunctum: ruptis & convulsis prodest podagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur: purgat vitiliginēs, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica na-

sci, folijs lactuce sylueſtris amara aſperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus author eſt: potuq; idipſum alterutra parte purgare. Cancchrys vim habet excalſaciendi, & vehemēter excandi, Aquare abſtergentibus medicamentis inferitur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die ſoluatur.

Rosmarinum coronarium. Cap. LXXI.

Rosmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tennes, & circa eos folia minuta, den-

*Cōmo ſa, longa, exilia. ſubter incana, ſuperne virentia, & diuſ Mar gram odore. Excalſactoria vi præditum eſt: regiū cellus, cū ſanat morbum, ſi decoctum in aqua, ante exercitia grauita- tiones bibatur: & vbi laborans exercitationi ſe crete odora diderit, in balnea deſcendat, & merum potet. Aco- ta. pis, gleucinoq; vnguento admiſceri ſolet.

Sphondylium. Cap. LXXII.

Sphondylium folia quadāmtenus platani & panacis habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius aſſurgentes, in quorum cacumine ſemen duplex, ſeſeli ſimile, ſed latius, candidius, et magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Naſcitur in paluſtribus & aquoſis. Potum ſemen pituitam per alium extrahit: medetur iocine- ris vitijs, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vulnarum ſtrangulationi. Veternoſos ſuffitu reuo- cat: cum alio cōmodè infunditur capitibus phreni-

ticorum, & leihargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia vlcera cohibet. Datur radix contra regium marbum, & iocineris vitia: circumrasa eadem, & iniecta callos fistularum deorodin. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula. Cap. LXXIII.

F Viruli ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationes, cœliacosq; & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur sudores ciet, vincto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: maria condiuntur: * Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum: folia fœniculi, longè asperiora, & latiora. qua ab imo caule vulnerta, sagapenum efficitur.

* Desunt
in codice
nostro
græco,
ac anti-

Peucedanum. Cap. LXXIIII.

P Eucedanum, caulem emittit tenuem, gracilentum, fœniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; è plaga succus umbræ manodatur: in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentia-

quisi-
mis qui-
busque
Marcello
teste.

DIOSCORIDIS

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac, quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è in idragora: verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adherens. Prefertur succus è Sardina & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, coitibus: omnibus, in vniuersum, vitis nervorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veterinosi renocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur canernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissime ex ovo assumitur, suspirijsq; & torminibus, et inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absorbet, difficiles partus mire adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida ulcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. An cerato, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

*Herba doctis omnibus pro melanthio
recepta, foliis fœniculum potius quàm se-
necionem uidetur imitari, ut certè locum
hunc esse aut depravatū, aut uerum igno-
rari melanthion, sit suspicandum.

Gith, seu Melanthium.

Cap. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos
dodrantes excedens: folijs & ut senecionis
minutis, sed multò tenuioribus: capitulo
in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblōgo, in-
tercursantibus intus membranis: quibus semen in-
cluditur nigrum, acre, odoratum, quod panibus in-
spargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subue-
nit. discutit recentes oculorum suffusiones, tritum
ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigi-
nes, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum:
circumscarificatos clauos excutit, cum vetere vrina
impositum: dentium doloribus, decoctum cum ace-
to, & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit,
peruncto ex aqua vmbilico: destillatione laboran-
tes adiuvat, tritum in linteo, & olfactum: vrinā
& menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac
extrahit, difficultatem spirandi cum vino potum
lenat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachme
pendere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fu-
gantur. Tradunt largius epotum enecare.

DIOSCORIDIS

Lasertium, & Laser. Cap. LXXVI.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix excalfacit: in cibis egrè concoquitur, vesicae noxia: sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. praefertur autem rufum, translucens, myrrhae æmulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenai cum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabae lomento: quod maleficio deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magadarin, & folia maspetum vocauerunt. Efficacissimum laser, maxime folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dena-

tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo cir-
 cunligatur, aut cum hyssopo, sicis coctis in posca,
 os, colluitur: ijs prodest, quos bestia in rabiem effe-
 rata momorderit, vulneribus immissum: valet ad-
 uersus venena telorum, & animalia omnia, quæ
 virus eiaculantur. potum, aut illitum: scorpionum
 plagis oleo dilutum circumlinitur: gangrenis præ-
 coercitis immittitur: & cum ruta, nitro & melle,
 vel per se, carbunculis: clauos callosq; prius circum-
 rasos vellit: cerato aut aridorum sicu carne præ-
 mollitum, recentes lichenas ex aceto sanat. Et ex
 crescentia in carne, polypoq; , si aliquot diebus cũ
 atramento sutorio, aut æruginè illinatur: extuberã-
 tia cum forfice extrahit. Veteribus faucium sca-
 brii ijs opitulatur: grauem, subitoq; iræaucescentē
 vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expe-
 dit: ruam illitum cum melle reprimat: anginis ex
 aqua mulsa vtilissimè gargarizatur. vescētes eo,
 letiore colore mangonizat: tussi commodè in sorbi-
 li ouo datur, et pleuriticis, in sorbitionibus. in fellis
 suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis sicis:
 horrores discutit cum vino, pipere, & thure potū:
 neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur
 oboli pondere deuorandum: hærentes gula hirudi-
 nes, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus
 coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso
 proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha potū:
 caliacos adiuuat, in acino ruæ sumptum: cum lixi

DIOSCORIDIS

uio autem potui datum,repente conuulsis ruptis q̃
prodest:ad potiones resoluitur,nucibus amaris,aut
ruta,aut calido pane. Foliorum succo ad eadem
proficitur, sed multo inefficacius: cum aceto mulso
manditur, ad expediendam arteriam, maxime cū
vox retunditur. eo cum lactucis vtuntur: exit q̃: in
vicem eruce. Fertur & altera magularis in Li
bya nasci, radix laserpitio similis, sed minus cras
sa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus
eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. Cap. LXXVII.

Sagapenu ferulacea herbe succus est, quā
in Media nascitur. Optimum est traslucēs,
fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio
quid inter laser & galbanū redolens, gustu acri.
Prodest laterū, et pectoris doloribus, tussibus vetu
stis, conuulsis, et ruptis. Crassam pulmonis pituitā
expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lieno
sis: itē contra neruorum resolutionē, perfrict ones,
& febrium circuitus in potu: in vnguenta probe
admittitur: menses pellit, sed foetum exanimat, cū
hydromelite potū: prodest ex vino haustu serpetū
ictibus. olfactū ex aceto, vuluarū stragulatus ex
iccat, oculorū cicatrices, offusā caliginē, hebetudi
nes, suffusionesq̃: detergit. Resoluitur vt laser, ruta,
aqua, et amaris nucibus. aut melle, aut calido pae.

Euphorbium. Cap. LXXVIII.

Euphorbium Libyca arbor est, ferula spe

tiem habens, quæ * in monte Atlante iuxta Mau * Ita
ritaniâ inuenitur. Ea acerrimo succo turget: cuius Plin. gra
eximium feruorem expanscentes incolæ, cum illos cus in
ventres elutos, arbori circumlingât, & eminus cau tmo-
lem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde
atq; vase quodam, in ventriculos copiosus lactis
humor effluit, præter id quod humi sparsum, vul-
nus ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi ma-
gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ven-
triculis concrefcit, atq; vitreum spectatur. Eligens-
dum est translucens, & acre. Euphorbium aduste-
ratur sarcocollæ, & glutini mistione, sed difficile
quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os
accessum diu detineat, adeo vt quicquid ori obijcia-
tur, planè euphorbium resipiat. Eius inuentio tem-
pore Iudæ regis Libiæ cognita extitit. Succus illius
suffusiones discutit: potius tota die exurit: quare
melli collyrijsq; pro acrimoniæ ratione admisceri
debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera po-
tione haustus: squamas ossium eadem die eximit:
verum eo vtentes, necesse est linamentis aut cera-
tis communire corpus, quo ossa conuoluntur. Alii
qui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente ni-
hil molesti passuros, si icisa osse tenuis capitis cute
tritius succus infundatur, vulnusq; postea cõsuatur.

Calbanum. Cap. LXXIX.

G Albanum succus est nascentis in Syria fe-
rule, quod nemulli metapium vocant. *Bl. 20*

ximè laudatur cartilaginofum, merum, thuris effi-
 giem præbens, pingue, minimè lignofum, retinens
 nonnihil adiectionis seminis, & ferule, graui odore,
 neq; valde humidum, neq; nimis aridum. Adultera-
 tur faba fresca, refina & ammoniaco. Galbanum
 excalcificat, vrit, extrahit, discutit: menses ac par-
 tus trahit appofitum vel fuffitu: lentigines acelo et
 nitro perunctis tollit: deuoratur ad tuffim vel erē,
 difficultatem fpirandi, fuffiria, rupta, cōuulfa: ad-
 uerfatur toxicis, potum cum vino & myrrha. fe-
 mili modo fumptum mortuos partus extrahit: im-
 ponitur lateris doloribus, & furunculis: comitia-
 les, & vulue ftrangulatus, & vertiginofos olfa-
 ctu fufcitatur: fi vratur, fugat nidore ferpentes; &
 perunctos feriri non patitur: ferpentes cum oleo
 & fphondylo circumpofitum, necat: dentium dolo-
 rem oblitum, aut canernis inditum, mitigat. vrine
 difficulti prodeffe exiftimatur. Refoluitur ad potio-
 nes amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pa-
 ne, mulſaue, aliàs meconio, cre, vſto, aut felle liqui-
 do. Si purgare Galbanū voles, in feruentem aquā
 demittito: nanq; cum liquefactum fuerit, eius sor-
 des fluitabunt: quas hoc modo facile ſeparabis:
 mundo linteo raroq; alligatum in fiētili aut area
 pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: oper-
 toq; vafe in feruidam aquam demittito: ſic enim
 ſyncerum veluti per colum eliqueſcet, et lignofum
 in linteo remanebit.

Ammoniacum. Cap. LXXX.

Ammoniacum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim vocant. Probaturn bene coloratū, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus trhausma, id est, friaturam appellant: quod vero terram, & calculos collegit, phyrama. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discuit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachme pōdere haustum: articulorū coxendicumq; doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisana succo sorbeatur: cruentam urinam pellit. albugines oculorū absterget: genarum scabritiam absomit: tritū autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat: discuit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitū. lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. Cap. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in lersile nascētis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-

DIOSCORIDIS

hibet : emplastris inseritur . Adulteratur admisto gummi .

Glaucium. Cap. LXXXII.

Glauciū , succus est herba , quæ ad Hierapolim Syria nascitur , solijs ferè corniculati papaueris , pinguioribus tamen , in terram sparsis , odoris tetri , gustus amari : tota croceo succo madet . Folia in olla fictili semisfrigidis clibanis calfaciunt , indigena , usque dum flaccescant , deinde contusis succū exprimunt : cuius est vsus ad oculorum medicamentā , utpote cū inter initia refrigeret .

Glutinum. Cap. LXXXIII.

Glutinum , quod xylocollan , alij taurocollan vocant , præstantissimum Rhodiaceum , quod ex bubulis coriis conficitur , id candidum est , & translucens . Nigrum verò minus probatur . Resolutum in aceto , impetigines leprasq; cutis delet : ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumq; , pustulas erūpere non patitur . vulneribus prodest , melle aut aceto madefactum .

Glutinum piscium. Cap. LXXXIIII.

Ichthyocolle , gluten pisciū , vter est piscis cetacei . Præstat candicans , natione Ponticū , subasperu , minimè scabrū , et quod celerrimè liquefcit . Vtile emplastris , capitis & leprarū medicaminibus , & tetanolibris , quæ cutē faciei erugāt , et extēdūt .

Viscum. Cap. LXXXV.

Viscum optimum est recens , intus porraceum ,

LIBER TERTIVS. 138

extra fuluum, quod asperi nihil, aut surfurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxio fruticis folio: contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus: quometiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturationem perducit: cum resina autē, & cera pari, epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera abscessusq; quos cacoeches vocant, ex thure molli: lienē cum calce, gagate, aut Asio lapide coctū, & impositum absomit: cum sandaracha, aut auri pigmento illitū, vngues extrahit: mistum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine. Cap. LXXXVI. Vulgò

Aparine ramis multis, & paruis fruticat, aspergue asperis, quadrangulis, per intervalla orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, albū, umbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra viperarum phalāgiorumq; morsus auxiliatur: infusa aurium dolori medetur. Herba cū axungia trita strumas discutit.

Alyssum. Cap. LXXXVII.

Alysson exiguus frutex est, vnicaulis, sub-

DIOSCORIDIS

asper, rotundis folijs fructu duplicium scutorū effigie, in quo est semen, quadamtenus latum. in montibus, et asperis locis emicat. Eius decoctū singultus sine febris, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. Cap. LXXXVIII.

Asclepias, ramos emittit longos: folia hederae, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris viris graue: semen securidace. nascitur in montibus. Radices ex vino potae torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ mamarumq; vlcera, quae cacoethe vocat, illinuntur.

Atractylis. Cap. LXXXIX.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, aspera q; qua feminae pro fusis vtuntur: capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, & vino teruntur vtilissime contra scorpiionum ictus. percussos tradunt quantum diu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsum q; deposita statim recrudescere.

Polycnemum. Cap. XC.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs origani caule, vt pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamē in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinādis recēs, aut aridū cum aqua, efficaciter illinitur: se l quinto die solui debet. Ad vrine stillicidia ruptaq; cum vino bibitur.

Clinopodium. Cap. XCI.

Clinopodiū frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duum dodrantū altitudine. nascitur in petrosiss. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti speciem lecti pedū præbent. Bibitur herba & succi eius decoctū, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eijcit, aliquot diebus potū. aluū sistit decoctū ad tertias, potūq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum. Cap. XCII.

Leontopetalon, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, ceteris modo: flores anemone similes, punicei coloris: folia brassice, sed papaueris diuisura. radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis et segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

DIOSCORIDIS

Teucrium. Cap. XCIII.

* Chamædry-
os.

Teucrium, siue, vt alijs placet, teucriis, herba est virgæ referens effigiem, * trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; vbertini promouit. Recens cum posca, aut arida seruesacta ius, potu lienem potenter absomit: lienosis cum aceto et ficis illinitur: item serpentium moribus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. Cap. XCIII.

* Plin.
colore:
quod &
ipsum
herbæ
pulchrè
cõgruit.

Chamædrys Cræcus, alijs chamædrops, Latinis trissago dicitur. sunt qui eam teucrium appella- uere, propter eam quam cum teucrio, seruat simili- tudinem. Nascitur in petrosis & asperis frutex dor- drantalıs, folia habens exigua, amara, * effigie et diuisura quercus flore paruo, penè purpureo. Carpo- tur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu- tusibus, indurato lieni, vrina difficultati, incipien- tibus hydropicis, auxiliatur: cit menses: partus ex- trahit, lienem ex aceto pota consumit: aduersus ser- pētium venena ex vino, potu, illitaq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. Cap. XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato, effica- cior tamen quàm satina habetur.

Vtraque ex vino contra animalium venena, præcipue marinarum opitulatur.

Lychnis. Cap. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bile per alium detrahit, semine duobus drachmis potio: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium. Cap. XCVII.

Lilia coronamentis se dedunt, Lyria à quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, nervos & priuatim uulnæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruesfacta, ambustis proficiunt: aceto condita, uulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inaßata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulnam emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis præcis, luxatisq; medetur: uirilignes, surfures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen pitum

DIOSCORIDIS

morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris se
 * ποφου men & folia cum vino illinuntur. Tradunt & *
 πα, idest rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Paphy-
 purpu- lie, efficacissima vnguentis nascuntur.
 rea. Ballote. Cap. XCVIII.

Vulgo **B** Alloteu, nomine alio nigrum marrubium vo-
 Prastum cant: caules edit quadrangulos, nigros, subhir-
 foetidū. sutos, complures ex vna radice. folijs maioribus
 quam marrubij, hispidis, cingentibus per interual-
 * σπορ= la caule, * subrotundis, graueolentibus, apiastro pro-
 γυλο πι= ximis. vnde aliqui apiastrū eam vocauerunt: candi-
 πα, idest, di flores vniuersi uerticillato ambitu caule coronāt.
 rotundio Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex-
 ribus. sale illitis: feruēti cinere flaccescūt folia, vt cōdylo
 Plinius mata reprimāt: purgāt et sordida vlcera cū melle.
 nigriori Apiastrum. Cap. XCIX.

bus: **M** Elissophyllon siue melithana, id est, a-
 quod piastrum, id sibi nomen vsurpauit, quo-
 magis niam apes ipsa herba delectantur, cau-
 arri det. liculi et folia ballote, de qua paulo antè diximus,
 Melissa similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsu-
 officinis. ta spectarentur: citreum malum olent. Folia cum
 vino pota aut illita prosunt contra ictu phalangio-
 rum, scorpionumq; item aduersus canis morsum.
 Decocto eorundem gratia, foueri prodest: desessio-
 nibus feminarum ad ciuendos menses conuenit, den-
 tes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infundi-
 tur. Fungorum strangulationibus folia, addito ni-

tro, potu auxiliantur: torminibus & orthopneicis delinēt. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant, articularios dolores illita sedant.

Marrubium.

Cap. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, cādicans, subhirsutus quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat: subrotundū, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex intervallis: flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter aedificia, ruinas, & rudera.

Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactus. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. Mulieribus a partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpētibus demorsi sunt: vesicam renesq; lēdit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia nomasq; sistūt, laterum dolores mitigant. Succus folijs confusis expressus, & scle coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat: nariibus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys.

Cap. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, praedura, cana, odoris incundi, & complures virgas

DIOSCORIDIS

ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus et asperis. Vim habet excelsa et acris foliorum decoctum potum pellit menstrua et secundas Phyllitis. Cap. CII.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quae parte anteriore laevia cernuntur, à tergo autem penfiles quasi vermiculos tenues ostendunt: in umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo: neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium moribus adversantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta alvus exercet, potui dantur.

Phalangium. Cap. CIII.

* οἱ δὲ
καὶ τὰς
τῆς λευ-
καίας
τιὰς
* ἡ δὲ

Phalangium à quibusdam phalangites vocatur & ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresque, in diversa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, lato, ad lenticulum dimidiata figuram, multo tenuiore: radice parva, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur: propevenit in collibus. Huius folia, semen, flos tum vino pota, auxiliantur contra scorpionum phalangiorumque ictus: tormina quoque discutiunt.

Græci
παχύ,
id est,
crasso.

Trifolium. Cap. CIIII.

Trifolium, Græci triphyllon, alij oxytriphylion, alij menyanthes, alij asphaltion, vocant. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues, innceas & nigras, unde ramulatus

euascentur appendicula, in quibus terna singulis
germinationibus exeunt folia, loto arbori similia:
ijs recenter enatis rutæ odor inest: ubi autem adole-
uerunt, bitumen olent. Florem edit purpureum, se-
men quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera
extremitate exertum, antennæ modo corniculum
gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & fo-
lia in aqua pota pleuriticis, vrinæ difficultati, comi-
tialibus, & ijs qui aqua inter cutem principia sen-
tiunt, scemini quoque vuluæ vitio opportunis, au-
xiliantur: menses ciunt: terna drachma è semine
dari debent, è folijs verò quaternæ. Contra serpen-
tium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præ-
sidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis,
foliorumq; decoctum fotu dolores eorum finire, quos
serpentes percusserint: qua autem aqua sanatus quis
fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus ha-
buerit, periinde afficitur vt à serpente demorsus.

Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum
vino potui dederet: et in quartanis, quaternæ, vt q se-
brii circuitus discuteret. Radix antidotis inseritur.

Polium.

Cap. CV.

DVo genera polij: montanum, cui tembris
nomen est. & cuius est vsus. Tenuis frutex
est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capi-
tulo in cacumine quandam corymborum speciem
præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili,
graniter olente, non sine quadam suauitate. Alter

DIOSCORIDIS

rum fruticosius, non vsque adeò valens odore, & viribus infirmius. Potum seruesacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto: Stomachum male habet: caput doloribus afficit, alium & menses ciet: substratum suffitum ue serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

ANNOTATIO.

Scordii hoc loco depicti uberrimus ubi que est prouentus, ut non iniuria eorum sit explosus error, qui allium sylvestre, aut obuiam quamcunque herbam allium subolentem, hoc esse opinabantur. Est autem præter id, Plinio libr. 25. cap. 6. authore, aliud quoddam genus latioribus foliis ac mentha stri effigie, cuius nuper in monte quodam ad Viennam ingens se copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quam foliorum cum mentha stro similitudine, à scordio huic auctori descripto, differre obseruauimus.

Scordium.

Cap. CVI.

Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs triassaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus: quadrangulis caulibus, subrubro flore. Herba vim excalfactoriam habet: urinam cit. Cocta recens aridam cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque roisiones, dysenteriam, et vrine

LIBER TERTIVS. 143

difficultatē, binis drachmis cum hydromelite: cras-
samen purulentum pectore expellit. Facit arida fa-
rina ad veterem tuſſim, rupta, conuulſa, ſi cum na-
ſturtio, melle & reſina miſceatur in eclegmate: in-
flammata modicē præcordia, cerato excepta, re-
creat: cum aceto acri aut aqua podagris conuenien-
ter illinitur: menſes impoſita mouet: vulnera cōglu-
tinat. vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatri-
cem perducit. Sicca excrescentias in carne cohibet.
Succus ad eadē vitia bibitur. Inter prima effica-
Ponticum natione, Creticumq;.

Tuſſilago.

Cap. CVII.

Tuſſilagini folia ſunt maiuſcula quā hede- Vulgò
ra, ſex aut ſeptem à radice, ſubalbida à ter- ungula
ra, ſuperne virentia, in plures angulos exentia, cau caballi
lis palmum altus: flos luteus, vere prodiit, quo vnà na.
cum caule conſeſtim exiit: inde nonnulli his va-
care exiſtimauerunt. Radix tenuis eſt & ſuperua-
cua: naſcitur in amœnis & riguis. Folia ex melle
trita igni ſacro & omnibus inflammationibus illi-
tu medentur. Aride fumus per inſundibulum hian-
ti ore raptus, hos ſanat, qui ſiccā tuſſi atque ortho-
pncea inſeſtantur: pectoris vomicas rui, it. Eundem
effectum præbet ſuffita radix. Decocta in hy-
dromelite, & pota emortuos partus eicit.

Artemiſia.

Cap. CVIII.

Artemiſia magna ex parte in maritimis naſ-
citur, abſynthij modo fruticoſa, maioribus

DIOSCORIDIS

& pinguioribus folijs, ramisq; : huius quidem genera duo . Vnum latius habitiusq; , folijs virgusq; latioribus . Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore: hæc incundiorem quàm præcedens efflat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruefacta conuenienter in muliebres desessus adiunguntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; : item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt: remoratam vrinam cient. menses pellunt pubi illita. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadē que in seßio trahit. Coma tribus achmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia .

Cap. C I X.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs rutæ, circa imum caulē exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquā florem pariunt, odore vinoso, suauiter alice tenui: sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitus adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys .

Cap. C X.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem

calorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Potā orthopnoeas mulcet. Hanc Cappadoceſ ambroſiam vocant, alij artemiſſiam.

Geranium. Cap. CXI.

Geraniō folijs anemones, diuiſuris lōgioribus: Radice ſubrotunda, cū eſtur dolci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes diſcutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, ſeſquipedalibus: folijs maluæ, in ſummis aliſ ſurſum ſpectantia gruum capitula inſunt, cū ſuis roſtris, aut canini dētes. Nullius in medicina vſus.

Gnaphalium. Cap. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur effracuer ſolia in vino aūſtero, ad dyſenteriam.

Typha. Cap. CXIII.

Typa folium edit: cyperidi ſimile: caulem album, leuem, æquabilem: florem in cacumine ambientem, denſum, qui in pappos ſoluitur, quod paniculam aliqui nominans. Huius herbæ flos ſuilo adipe eloto exceptus, ambuſtis medetur. Gigni-
tur in paluſtribus & aquis ſtagnantibus.

Circæa. Cap. CXIIII.

Circeæ, quam & dirceim aliqui vocant, folijs eſt hortenſis ſolant, agnatis crebris: flore nigro, puſillo, copioſo: ſemine milij, naſcent in quibuſdam veluti corniculis: dodrātali radice, tri-

* Intelligē quā lib. i. cyperij uocauit.

DIOSCORIDIS

plici fermè aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento
perflatis: Radicis tuse pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vulnus expurgant. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mamas nutricum explet.

Oenanthe.

Cap. CXV.

Videtur
nostra **O**enanthe fo^{lia} habet pastinacæ: florem candi-
Filipen = dum caulem crassum, palmi altitudine: semē
dura. a triplicis radicem magnam, in multa rotunda ca-
pitula extuberantem: nascitur in petris. Caulis eius
& folia, cum mulso vino pota secundas eiciunt.
Radix è vino, vrine stillicidio conuenit.

Conyza.

Cap. CXVI.

Vulgò
pulica = **C**onyza duo genera. quæ parua vocatur, odore
via. præstator est; maior vero frutice altior & fo-
lijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oleæ simi-
lia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis binii cubitorū
altitudine attollitur, in minore pedē æquat. Flos fra-
gilis, lutei coloris, subamarus, qui in pappū abit: ra-
dices supernaculæ. Suffitu substratuq; frutex totus
serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Fo-
lia cōuenienter illinuntur serpentium plagis, & tu-
berculis, ac vulneribus. Flores & folia cum vino
ad mēses partusq; eiciendos bibuntur: item contra
vrine stillicidia, arquatū morbu, & tormina. co-
nitiales pota ex aceto adiungunt. Decoctū in desessio-
nibus medetur vulnē malis. Impositus succus abor-

tum

tum facit Ex oleo efficaciter horroribus * oblini- * v. p. 2.
tur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & ter-
tium conyza genus, caule crassiore, ac molliore: fo-
lijs media inter maiorem ac minorem amplitudi-
nis, minimè autè pinguibus: multo grauioris hac
est odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Proue-
nit locis non riguis.

Hemerocalis, siue lilium syluestre.

Cap.

CXVII.

Hemierocallis folium & caulē habet lilij, por-
raceo colore: flores in caule per singulis exor-
tus, terni aut quaterni erūpunt, lilij diuisura, quo-
ties dehiscere cœperūt, colore perquā pallido: radix
magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum melle
& lana de pecto apposita, aquā educit & sangui-
nem. Folia trita mamarum inflāmationes à partu
contractas, oculorumq; collectiones mitigant.
Radix et folia igni ambustis vtilissimè illinūtur.

A N N O T A T I O.

Leucoion, si nominis etymō spectes,
albam significat violam: solet tamen &
pro lutea, cœrulea ac purpurea vsurpari.
Nunc officinis Arabum ferè sequacibus,
Cheiri nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

Cap.

CXVIII.

Leucoion vulgaris est notitia, sed in floribus
differentia quedam: namq; aut cœrulei, aut

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Iutea vero praeipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruesfacti in defensionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum. Cap. CXIX.

Videtur
genus
Persica =
ria, non
macula =
tum.

Cratæogonum, siue, vt alijs placet, cratæonon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculis: semine milij: nascitur magna ex parte in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & vir modo consimili, totidē diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. Cap. CXX.

Phyllum, quod & elæphyllon vocatur, duum generum est: quod autem thelygonum appellat, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: semen papaueris maiusculum: Sed arrhenogonum cetera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorenti

bus oleis non diſſimile. Arrhenogonon potu, maſcu-
li ſexus facere partus, vt thelygonō ſœminei pro-
ditur. Horum Cratenas author eſt: ſed huiusmodi
hitoriā tenus, mihi prolixiffe viſum eſt.

Teſticulus. Cap. CXXI.

Teſticulus, quem Græci cynoſorchin vocant,
folijs circa imam caulis partem in terra ſtra-
tis, oleæ molli ſimilibus, longioribus, anguſtioribus,
leuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radi-
ce bulbosa, oblonga, oliuæ modo anguſta, duplici
ordine: ſuperiore, quæ plenior eſt: inferiore, quæ
mollior ac rugoſior. Eduntur radices coctæ, vt bul-
bi: ex quibus ſi maiorem edant viri, maris genera-
ri dicuntur: ſi minorem ſœmina, alterum ſexum.
Addunt in Theſſalia mollem mulieres in lacte ca-
prino bibere, ad ſtimulandos coitus: aridam vero,
ad inhibendos: & alterum alterius potu reſolui.
Nascitur in petroſis & ſabuletis. Teſticulus alio
nomine ſerapias, Andrea authore vocatur, quoniā
radix ad multa utilis ſit. folijs eſt porri, latioribus
oblongis, pinguibus, ex alarum ſinu inflexis: caule
palmo: floribus penè purpureis, radice teſticulis ſi-
mili. quæ illita tumores diſcutit, vlcera purgat, &
ſerpere eadem non patitur. Abolet fiſtulas, & illi-
tu inflammationes lenit. Aride radices nomas in-
hibent: ſanantq; putredinesq; , & oris vlcera ca-
coethe: aluum fiſtunt è vino potæ. De hac, eadem
quæ de teſticulo canis, produntur.

Offici-
nis falſo
ſatyrio,
de quo
ſeq. cap.

DIOSCORIDIS

Satyrium. Cap. CXXII.

Satyrium aliqui trifoliū vocant, quoniā tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florem lilij effigie, candidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam intus vt ouū, candidam, gustanti dulcem, et ori non ingrata: quā in vino nigro austero bibere conuenit, cōtra opisthotonum. Utendū ea dū cōcumbendi inces sit cupiditas, si quidem ea promiores ad venerē fieri affirmant. Est et alterum satyrium erythronium siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, vt produnt, si omnino in anu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Horminum. Cap. CXXIII.

Vulgò Gallitri- cum. **H**orminū herba est, solijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentie siliquis similes prodeunt, quæ ad radicē spectant, in quibus diuersum semen recluditur: si quidem in syluestri rotūdum, fuscumq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argamas albuginesq; , & illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahunt acq;

lei ex corpore. Idem effectus est illita herba. Sylvestre magis viribus pollet: quare vnguentis, praesertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. Cap. CXXIIII.

HEdysaron, quod vnguentarij pelecinum, id est securidacam vocant, frutex est, folijs cicoris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim a mulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nas citur in setigetibus & hordeis.

Onosma. Cap. CXXV.

Onosma, * oblonga folia habet, ad similitudinem anchusae longitudine quatuor digitorum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur longa, tenui, infirma, rubescens: gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Pregnans, si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

Nymphæa. Cap. CXXVI.

Nymphæa nascitur in paludibus & stagna. Nunc Nubibus aquis, folijs fabae Aegyptiae, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente: cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput extuberat: nigro semine, denso & lato, lenti

DIOSCORIDIS

gustus:caulis est levis,niger,minime crassus,Ægyptæ fabæ cognatus:radix nigra,scabra,clauæ similis,quæ autumnosecatur. Sicca cum vino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur & lienem absument. Radix stomachi ac vesicæ doloribus illinitur, vitiliginis ex aqua emendat:imposita cum pice, alopecys medetur. Eadem contra veneris in somnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitalemq; infirmat. Idem semē potum efficit. Nymphaea nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bœotia Aliarto. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs antea dicta, radice alba, scabra flore luteo, nitente, rose simili. Huius semen & radix, contra fœminarum profluvia efficaciter ex vino bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Andro faces. Cap. CXXVII.

Androfaces herba est amara, tenues spargēs iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur: gignitur in Syria maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herba decocto: podagris utiliter illinitur.

Cete= Asplenium. Cap. CXXVIII.

rach offi
cinis.

Asplenium, aliqui scolopendrium vocant, alijs splenion, alijs hemionium, folijs est multis,

scolopendrea animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisq; siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semē habet: folia & filicula modo diuiduntur, subter flauescētia hirsutaq; supernè viridia. Vim hāc habēt folia in aceto seruesacto, vt per dies quadraginta pota, lienem absument: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriae, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese aut cū muli liene appensa. Tradunt noctu, silente lina, huius rei gratia effodiendam.

*Polipodum.

A N N O T A T I O.

Ruellio & Fuchsio lingua ceruina nūc appellata: quam alij minus rectè fortassis, Phyllitida suspicantur, de qua suprā Capite C II.

Hemionitis. Cap. CXXIX.

Hemionitis, quā aliqui splenion vocāt, folium, emittit dracunculi, lunæ modo incuruū rali-
cibus coheret multis, tenuibus: nunquā flores, neq;
semen, neq; caulem gignit: in petrosis nascens, au-
stero sapore. Ea ex aceto pot. i lienem absument.

Anthyllis. Cap. CXXX.

Anthyllis duplex est: quædam enim lenti si-
millima, folijs mollibus, rectis ramulis, pale-
ni altitudine. radice parua, tenui. Nascitur in
alsis terris, & à sole illustratis, non in sulso gu-

* *Chas* *stu*. Altera est folijs ramulisq; * *aiuge* similis, hir-
mapityi. *sutioribus* tamen, *breuioribus*, & *asperioribus*. flo-
 re *purpureo*, *odoris* admodum *grauis*: *radice* *cichor-*
ry. *Pota* *drachmis* *quatuor* *vrinae* *difficultati*, *rent*
busq; *plurimum* *prodest*. *Trite*, *vulue* *pituitas*
emolliunt, *cum* *rosaceo*, & *lacte* *imposita*, *vulneri*
bus *medentur*. *Que* *autem* *aiuge* *similitudinem* *re*
fert, *præter* *alia*, *pota* *cum* *aceto* *mulso* *conitiales*
sanat.

Anthemis. Cap. CXXXI.

Officinis
 camomil
 la. Cuius
 nominū
 varietas
 ab inter-
 prete o-
 missa est

A Nthemidis genera tria, tantum flore distan-
 tia. rami dodrantes, fruticosi, alis multis
 concavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotun-
 dis capitulis: floribus in medie aureis, forinsecus or-
 biculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis,
 magnitudine foliorum rutæ: nascitur in asperis, et
 iuxta semitas: colligitur vere. Vim habent radices,
 flores & herba excalfaciendi, extenuandiq;: potu,
 & in sessione, pellunt menstrua, partus, urinam,
 calculosq;: aduersus inflationes, et ilei tormenta bi-
 buntur: bilem suffusam expurgat: iocinerum vitia
 sanant: decocto earum vesica fouentur. Ex omni-
 bus his generibus ad calculos efficacissima est,
 que florem purpureum habet, cuius amplitudo ma-
 iuscula est. hanc proprie heranthemon vocat. Ea,
 cui leucanthemo nomen est, ite que chrysanthemum
 dicitur, vehementius urinam ciunt. Aegylopijs illito
 medentur: comaducata vlcera eruptiones in ore

sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, te-
runturq; in farinam, ab abigendos febrium circui-
tus. Flores & folia recodi debent, & priuatim tu-
sa, in pastillos digeri: radix quoque siccari, dumq;
ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo
floris aut radicis pars vna, modo contra floris par-
tes due & herbæ vna, permutatim duplicato pon-
dere, alternis diebus bibere autem oportet in vino
mulso, diluto.

Parthenium. Cap. CXXXII.

PArthenium aliqui amacron vocant, folijs est Vulgò
coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, matrica
intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Sicca ria.
tum, cum aceto mulso, aut sale potum, non secus,
atq; epithymum, & bilem & pituitam detrahit:
suspiciosus prodest & melæchoicis. Herba sine flo-
re à calculosis, & anhelatoribus magna vtilitate
bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia
vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro
igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Non sunt sequendi, qui Cotulam fœti-
dam vulgò dictam pro hoc obtrudunt.
Nam præter quàm quòd folia illius nullā
aut saltem paruam cum fœniculo habeāt
similitudinem, flos eius non totus luteus
(quod in illo tamen requiritur) sed per
ambitum albus, ac intus tantum luteus

DIOSCORIDIS

conspicitur. quod haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa verum esset Bupthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. Cap. CXXXIII.

Bupthalmum (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollèsq;: folia fœniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, vnde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores duritiâsq; discutunt. Aunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. Cap. CXXXIIII.

Pæonia siue glycysside, Græcis aliquibus penthoron dicitur: sunt qui ideos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia iuglandis habet. infœmina verò, smyrnæ more diuiduntur. Summo caule alas in siliquas emittit, veluti & græcas nuces: in quibus, tellige. quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris & tenuis & digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: fœmina radicibus cœglandes circiter septem aut octo inhaerent, vt in.

hăstula regia. Feminis à partu non purgatis sicca
radix datur: ciet menses nucis græce magnitudi-
ne pota: si ventris doloribus cum vino auxiliatur.
Valet cōtra regium morbum, & renum, ac vesicæ
dolores. Decocta in vino alaiū sistit. Rubra grana
rubenteis menses sistunt, decē vel duodecim pota in
vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus
ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum exi-
mūt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nō
eternis vulvæ strāgulationibus et matricis dolori-
bus, quindecim numero pota, ī aqua mulsā, aut vi-
no. Nasctur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum. Cap. CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomē accepit: Vulgò
milium
solis.
solys est oleæ longioribus, & latioribus, mollio-
ribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis
rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, li-
gnosis, in quorū cacumine bifidi exortus, cauliculo-
rū speciem exhibent: solys longis, inter q̄ parvū se-
mē, rotundū, erui magnitudine, duritia lapidea. Na-
scitur in asperis & editis locis. Vim hęc habet, vt
semine cū vino albo poto calculos frangat, pellatq;
vrinam.

Phalaris. Cap. XXXVI.

Phalaris cauliculos emittit xæ culmis simi-
les, à minutis ac nullius vsus radicibus, mul-
tos duum palmorum, geniculis cinctos, gracilio-
res tamen ac dulces: semen candidum, oblongum,

DIOSCORIDIS

milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vis-
no succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur.
Semen cochlearis mensura potum, ad eadem effi-
cax est.

Rubia. Cap. CXXXVII.

Hodie
Rubia
tinctoriū
* ἡ ἐξ
ῥόδανον
ἰνιοι δὲ
τεύθριον
καλῶσι.
* ὡς ἐν
λαβάρῃ
τῆς γαλι-
λίας.

ERythrodanum * radix rubra est, qua tingū-
tur lane. Vna sponte provenit, altera seritur,
* ut in Thebana Gallie, & Ravenna Italia: in
Caria inter oleas, ut in arvis, solo creditur. Hanc
non sine questu ferunt: nanque maximum ex ea
sentiunt prouentum. Asperi caules & quadrangu-
li, longi, aparina nō dissimiles, robustiores, & mul-
tò prorsus maiores: folijs per intervalla certa circū
articulos, stellatim decussatis. Semen eius rotundū,
inter initia viride, mox rubrū, postea cum ematū-
ruit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam
ciēt: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cū
aqua mulsa: item ischidiacis, & resolutis. Crassā
copiosamq; urinam pellit: nōnunquam & sangui-
nem: bibentes tamē quotidie lauari oportet, & ex
crementorum quæ redduntur differentiā spectare.
Aduersus serpentium morsus, ramulos cū folijs vi-
no bibere prodest. Semen ex aceto potū, lienem ab-
sumit. Imposita radix trahit partus, menses, secun-
dasq;. Albæ vitiligini, illita ex aceto medetur.

Lonchitis. Cap. CXXXVIII.

Lonchitis folia habet parri, latiora, rubentia,
plurima, ad radicē circumfracta, veluti in ter-

LIBER TERTIVS. 151

ram procumbētia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiātibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerētes velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum arrogauit: radix dauci. Nascitur in sitientibus, & asperis, Radix ex vino pota vrinam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperam lonchium dicunt: folia scolopendrii emittit sed asperiora maioraq; ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absunit.

Althæa. Cap. CXXXIX.

Althæa, quam aliij ibiscum vocant, in syluestrium maluarum genere est, cui folia vt cyclamino, rotūda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. * Althæa appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua mulsæ, & per se cū imponitur tusa, efficacax est cōtra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: siquidē discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictū est, adiecto suillo adipe aut anserino, terebinthinæue, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vulnū inflammationes, præclusionesq; in pes-

Vulgò
Bismal-
na, &
Maluani
scus.
* Ab ad
dāuō,
quod me
deri si-
gnificat.

DIOSCORIDIS

ra vuluē, reliquiasq; à partu extrahit. Decocta & succus ex vino potus, succurrit vrinae difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto in le ore. Viride semen siccuq; tritum, vitiliginēs in sale & perunctas emendat: eodem cum oleo & aceto peruncti, a venenatis nō feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluvium. In posca autem decoctum hibitur, contra omnes vesparum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

* οὐ
ἐν.

Alcea. Cap. CXL.

Herba
Simeos=
nis uul=
gō.

Alcea syluestrium malvarum generi assignatur: folia habet diuisa, verbenace proxima. caules treis aut quatuor, cortice cannabino vestitos: florem rose, paruum: radices albas, latas, quinquē aut sex, cum plurimū cubitales: quæ cum vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis. Cap. CXLI.

Cannabis satiuā plantā magni in vita vsus ad robustissimos funes facitandos: folijs fraxinæ xini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine eupato = ne rotundo, quod largiore cibo geniturā extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloris gatum. bus instillatur. * Syluestris cannabis virgas fert

LIBER TERTIVS. 152

althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cu-
biti altitu. linem æquantes: folio sativæ, nigriore
& asperiore flore lychnidis, subrubro: semine &
radice althææ. Decocta radix, illitu inflamma-
tiones mulcet, tumores discutit, tofos articulorum
dissipat. Huius cortex torquendis funibus accom-
modatus.

Anagyris. Cap. CXLII.

A Nagyris * frutex est arboris instar, per- * δὲ δὲ
quàm gravis odore: folijs * agni, vir- ἀνάρτυον
gisq; flore brassicæ: semen in siliquis non δὲ δὲ ἀνό
breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori ποικίλον
facie, simile renibus, quod durescit vna maturescen-
te. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt. si * Vitis
partus hæreat & secunde mensesq; morentur,
drachmæ pondere bibuntur in passò: sic & suspi-
riosi datur, & contra capitis dolores in vino. Dif-
ficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu
statim auferantur. Radicis cortex concoquendis di-
scutiendisq; adhibetur. Semen commaducatum vo-
mitiones vehementer ciet.

Cepæa. Cap. CXLIII.

CEpæa portulacæ similis est, sed nigriora habet
folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota,
vrine stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus, opi-
tulantur: maxime id præstat, si cum decocto radi-
cum asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, cor-
rudam vocant, bibatur.

D I O S C O R I D I S

Alisma. Cap. CXLIII.

*Vulgò
plātago
aquati =
ca.
*Vox ex
Plin. ad=
iecta.

Alisma, * alij damasonion appellant : folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, * laciniosa, conuexa q; in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi : flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma vna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarūt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteriae, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, et contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluū, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulo : caulem dodrantalem: florem puniceum: radicē paruum: nascitur in vlgiginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat : cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Hypericum. Cap. CXLVI.

Nost. a
Perfora=
ta.

Hypericum alij androsæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, subrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo

tando oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locis cultis & asperis. Urinam ciet, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. Cap. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmum vocauere. Vsus seminis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nã biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ANNOTATIO.

* Vinoso succo. } Marcellus sanguineo vertit, qui non vt Ruellius ορωδν, sed potius εμαρωδν, vti capite de hyperico, legisse videtur: quæ fortè lectio magis genuina. Nam & Plinius lib. 27. cap. 4. Androsæmi comam tritam sanguineo succo manare, tradidit.

Androsæmum. Cap. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt, quòd fruticet ramulis surculosis, ac tenuis

DIOSCORIDIS

bus: rubentibus virgis, & folijs rubeis, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita & vinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasq: circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaveris nigri, insignis lineis. Huius comæ tritæ resinofum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorberet oportet. Herba ambustis illita medetur, vulneribus sanguinem cohibet.

Coris.

Cap. CXLIX.

COris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit, & vrmas: contra phalāgiarū morbus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vino decocta potatq: defectis opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quàm optimè cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex quare pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys.

Cap

CL.

Vulgo

lua are

thritica.

Aiuga herba in terra repens: & incurua similis: folijs semperuiui minoris, multò te-

* densis, odore pinus flore tenui, luteo, vel cādidō. * ^πο
 radice cichorij. Folia septem diebus in vino pota, re ^{xuptes,}
 gio morbo medentur: & quadraginta diebus ex ^{ideſt} sub
 hydromelite, ischiadicis sanant: dantur peculiari ^{curua.}
 ter vrinx difficultatibus, iocineris, & renum vi ^{nuva}
 tibus: torminosi profunt. Ea apud Heracieam Ponti ^{id est,} fre
 cam, perinde atque antidoto cōtra aconitum vtun ^{quenti-}
 tur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum ^{bus.}
 polenta iure decocti subacta: trita in farinam &
 cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta
 melle, cum eris squama & resina deijcit: apposita
 ex melle, vuluæ vitia extrahit: mammarum duris
 tias discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpūt,
 cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiuge,
 cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis,
 prætenuihus, coma supradictæ: flore candido: semi
 ne nigro: hæc etiam pinum redolet. Tertia mas no
 minatur, paruula, folijs exilibus albis, pilosis: cau
 le aspero, cādidō: luteis flosculis, semine iuxta alas.
 Resipit & hæc pinum. Hæ duæ uim superioris ob
 tinent, sed non usque adeo efficacem.

TERTII LIBRI

FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER IIII.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



RIBVS antè libris, amantissime Aree, tradidimus odora-
menta, olea, arbores, vnguen-
ta, animalia, frumenta, olera,
radices, succos, herbas, semi-
naq;. In hoc autem quarto dis-
seremus de radicibus, & eis,
qua restant, herbis.

Betonica.

Cap. I.

Cestron psychotropho vocitatur, quoniam fri-
gidis locis inueniatur. Latini betonicam appel-
lant. Herba est, caulem serens tenuem, cubiti altitu-
dine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mol-
lia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem
maiora: in summis caulibus, semine veluti satureie
spicatum inest. Decerpta huius folia siccantur, pluri-
mos ad vsus. Radicibus nititur, vt veratri, tenui-
bus. Que ex hydromelite in potu, pituitosam vo-
mitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuul-

sis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxā
dos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydro
melite. tres in vini sextario drachma, contra serpe
tium morsus ebibuntur. Herba magna vtilitate il
latis à serpente uulneribus illinitur: aduersus etiā
uenena drachma ex uno pota cōuenit: præsumpta
ga, si uenenum hauriatur, nihil nocebit: urinā ciet:
aluū subducit: medetur comitialibus & insanis,
pota ex aqua: & iocineris lienisq; uitjs, drachma
pondere in aceto mulso: concoctionem adiuuat, si
quis eam fabæ magnitudine secundum cœnam cū
melle cocto deuorarit: modo consimili acida ructan
tibus propinatur. Stomachicis eam man. lucare et
succum deuorare proderit, si postea dilutum uinum
sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus
obolis, cum diluti uini egelidi cyatho: ischiadicis, re
num & uesicæ doloribus, ex aqua: aque inter cus
tem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant:
sin aliter, ex mulso: regio morbo laborātes recreat,
menses pellit, orachmæ pōdere cum uiuo pota: aluū
purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis
decem cyathis. Facit cum melle ad tabem & puru
lentam excreationem. Folia sicca tritaq; fictili uas
se reconduntur.

Britanica. Cap. II.

Britanica aut uetonica, folia habet syluestris
lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu ad
stringentia: radicem tenuem & breuem: caulem

* *Chas* *stu*. Altera est folijs ramulisq; * *aiuga* similis, *hir*
mapityi. *sutioribus* tamen, *brenuoribus*, & *asperioribus* flo
re *purpureo*, *odoris* *admodum* *grauis*: *radice* *cicho*
rij. *Pota* *drachmis* *quatuor* *vrinae* *difficultati*, *rent*
busq; *plurimum* *prodest*. *Trite*, *vuluae* *pituitas*
emolliunt, *cum* *rosaceo*, & *lacte* *imposita*, *vulneri*
bus *medentur*. *Quae* *autem* *aiuga* *similitudinem* *re*
fert, *praeter* *alia*, *pota* *cum* *aceto* *mulso* *conitiales*
sanat.

Anthemis. Cap. CXXXI.

Officinis
 camomil
 la. Cuius
 nominū
 varietas
 ab inter=
 prete o=
 missa est

A Nthemidis genera tria, tantum flore distan
 tia. *rami* *dodrantes*, *fruticosi*, *alis* *multis*
concaui: *tenuibus* *foliolis*, *paruis*, *numerosis*: *rotun*
dis *capitulis*: *floribus* *in* *medie* *aureis*, *forinsecus* *or*
biculato *ambitu* *candidis*, *melinis*, *aut* *purpureis*,
magnitudine *foliorum* *rutae*: *nascitur* *in* *asperis*, *et*
iuxta *semitas*: *colligitur* *vere*. *Vim* *habent* *radices*,
flores & *herba* *excalfaciendi*, *extenuandiq;* *potu*,
 & *in* *seffione*, *pellunt* *menstrua*, *partus*, *vrinam*,
calculosq; *aduersus* *inflationes*, *et* *ilei* *tormenta* *bi*
buntur: *bilem* *suffusam* *expurgat*: *iocinerum* *vitia*
sanant: *decocto* *earum* *vesicae* *fouentur*. *Ex* *omni*
bus *his* *generibus* *ad* *calculos* *efficacissima* *est*,
quae *florem* *purpureū* *habet*, *cuius* *amplitudo* *ma*
iuscula *est*. *hanc* *proprie* *heranthemon* *vocat*. *Ea*,
cui *leucanthemo* *nomē* *est*, *itē* *quae* *chrysanthemo*
dicitur, *vehementius* *vrinā* *ciunt*. *Aegylopijs* *illita*
medentur: *cōmāducata* *ulcerum* *eruptiones* *in* *ore*.

sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturq; in farinam, ab abigendos febrim circuitus. Flores & folia recodi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoque siccare, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo floris aut radicis pars vna, modo contra floris partes due & herbæ vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium. Cap. CXXXII.

PArthenium aliqui amacron vocant, folijs est Vulgò coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, matricaria. intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Sicca ria. tum, cum aceto mulso, aut sale potum, non sectus atq; epithymum, & bilem & pituitam detrahit: suspiriosis prodest & melâchoicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

A N N O T A T I O.

Non sunt sequendi, qui Cotulam fœtidam vulgò dictam pro hoc obtrudunt. Nam præter quàm quòd folia illius nullâ aut saltem paruam cum fœniculo habeât similitudinem, flos eius non totus luteus (quod in illo tamen requiritur) sed per ambitum albus, ac intus tantum luteus

conspicitur. quod haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa verum esset Bupthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. Cap. CXXXIII.

Bupthalmum (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollesq; folia fœniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores duritiâsq; discutunt. Aunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. Cap. CXXXIIII.

Pæonia siue glycyfide, Græcis aliquibus penthoron dicitur: sunt qui ideos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia iuglandis habet. infex-

* Amygdalina vero, smyrnii more diuiduntur. Summo caule in siliquas emittit, veluti & græcas nuces: in quibus, tellige. quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris & tenuis & digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: fœmina radicibus ceuglandes circiter septem aut octo inhaerent, vt in

hastula regia. Feminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nunc græcæ magnitudinis pota: si ventris doloribus cum vino auxiliatur. Valet cōtra regium morbum, & renum, ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluū sistit. Rubra grana rubenteis menses sistunt, decē vel duodecim pota in vino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum eximūt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus noturnis vulue strāgulationibus et matricis doloribus, quindecim numero pota, ī aqua mulsā, aut vino. Nasctur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum. Cap. CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomē accepit: solijs est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorū cacumine bifidi exortus, cauliculorū speciem exhibent: solijs longis, inter q̄ parvū semē, rotundū, erui magnitudine, duritia lapidea. Nasctur in asperis & editis locis. Vim hæc habet, vt semine cū vino albo poto calculos frangat, pellatq; urinam.

Vulgò
miliū
solis.

Phalaris. Cap. XXXVI.

Phalaris cauliculos emittit xæ culmis similis, à minutis ac nullius vsus radicibus, multos duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen candidum, oblongum,

DIOSCORIDIS

miliū magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vis-
no succus ad vesicæ cruciatus vtilissimè bibitur.
Semen cochlearis mensura potum, ad eadem effi-
cax est.

Rubia. Cap. CXXXVII.

Hodie
Rubia
tinctoriū
* ἢ ἐξου
θόδανον.
ἱνιοι δὲ
τεύθριον
καλῶσι.
* ὡς ἐν
βαβυλῶνι
τῆς γαλι-
λαίας.

Erythrodanum * radix rubra est, qua tingū-
tur lana. Vna sponte provenit, altera seritur,
ut in Thebana Gallia, & Rauenna Italie: in
Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. Hanc
non sine quaestu serunt: nanque maximum ex ea
sentiunt prouentum. Asperi caules & quadrangu-
li, longi, aparinae nō dissimiles, robustiores, & mul-
tō prorsus maiores: folijs per interualla certa circū
articulos, stellatim decussatis. Semen eius rotundū,
inter initia viride, mox rubrū, postea cum ematur
ruit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam
ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cū
aqua mulsā: item ischidiacis, & resolutis. Crassā
copiosamq; vrinam pellit: nōnunquam & sangui-
nem: bibentes tamē quotidie lauari oportet, & ex
crementorū quæ redduntur differentiā spectare.
Aduersus serpentium morsus, ramulos cū folijs vi-
no bibere prodest. Semen ex aceto potū, lienem ab-
sumit. Imposita radix trahit partus, menses, secun-
dasq;: Albæ vitiligini, illita ex aceto medetur.

Lonchitis. Cap. CXXXVIII.

Lonchitis folia habet parri, latiora, rubentia,
plurima, ad radicē circumfracta, veluti in ter-

LIBER TERTIVS. 151

ram procumbētia, pauca in caule, in quo flores, ceteri
galericuli, hiātibus comicis personis similes, nigri,
& è rictu albam exerētes velut linguam, quæ ad
labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum
lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum
arrogauit: radix dauci. Nascitur in sitientibus, &
asperis, Radix ex vino pota vrinam ciēt. Altera est
lonchitis, quam aliqui asperam lonchium dicunt:
folia scolopendrij emittit, sed asperiora maioraq;
ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in mo-
dum prodest, in eisq; inflammationes excitari non
patitur. Pota ex aceto lienem absomit.

Althæa. Cap. CXXXIX.

Althæa, quam alij ibiscum vocant, in sylue-
strium maluarum genere est, cui folia vt cy-
clamino, rotūda, lanugine canescunt: flore rosaceo:
bicubitali caule: radice lenta, intus alba. * Althæa
appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluri-
bus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut
aqua mulsæ, & per se cū imponitur tusa, effi-
cax est cōtra vulnera: item ad strumas, parotidas,
abscessus, mammarum inflammationes, fracta se-
dis, inflationes, nervorum rigores: siquidē discutit,
& excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit.
Cocta, vt dictū est, adiecto suillo adipe aut anseri-
no, terebinthinæue, vt malagmatis lentor fiat, fa-
cit ad vuluæ inflāmationes, præclusionesq; in pes-
sis subdita. Decoctum eodem surgitur munere: one

Vulgò
Bismal-
na, &
Maluani
scus.
* Ab æl
d'auo,
quod me
deri si-
gnificat.

DIOSCORIDIS

ra vulue, reliquiasq; à partu extrahit. Decocta & succus ex vino potus, succurrit vrinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto in de ore. Viride semen siccūq; tritum, vitiliginis in sale & perunctas emendat: eodem cum oleo & aceto peruncti, a venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluvium. In posca autem decoctum hibitur, contra omnes vesparum, apum, similiarumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

* ου
ατα.

Alcea. Cap. CXL.

Herba
Simeo=
nis uul=
gò.

Alcea syluestrium maluarum generi assignatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxima. caules treis aut quatuor, cortice cannabino vestitos: florem rose, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimū cubitales: quæ cum vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis. Cap. CXLI.

Cannabis satiuæ planta magni in vita vsus ad robustissimos funes factitandos: folijs fraxinæ, xini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo, quod largiore cibo geniturâ extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter aurium dolorigatum. his instillatur. * Syluestris cannabis virgas fert

althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cu-
biti altitudinem æquantes: folio sativæ, nigriore
& asperiore flore lychnidis, subrubro: semine &
radice althææ. Decocta radix, illitu inflamma-
tiones mulcet, tumores discutit, tofos articulorum
dissipat. Huius cortex torquendis funibus accom-
modatus.

Anagris.

Cap. CXLII.

A Nagris & frutex est arboris instar, per- * δι δι
quàm gravis odore: folijs & agni, vir- ἀνίσχυον
gisq; flore brassicæ: semen in siliquis non δι δι ἀκο
brevibus gignit, subrotundum, firmum, versicolori ποικίλον
facie, simile renibus, quod durefcit vna maturescen- λυσι.
te. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt. si * Viticis
partus hæreat & secunde mensesq; morentur,
drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspi-
riosi datur, & contra capitis dolores in vino. Dif-
ficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu
statim auferantur. Radicis cortex concoquendis di-
scutiendisq; adhibetur. Semen commaducatum vo-
mitiones vehementer ciet.

Cepæa.

Cap. CXLIII.

CEpæa portulacæ similis est, sed nigriora habet
folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota,
vrine stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus, opi-
tulantur: maxime id præstat, si cum decocto radi-
cum asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, cor-
rudam vocant, bibatur.

*Vulgò
plātago
aquati =
ca.
*Vox ex
Plin. ad=
iecta.

Alisma, * alij damasonion appellant : folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, * lacis niosa, conuexa q; in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi : flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma vna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarūt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, et contra vitia vulue prodest. Herba sistit aluū, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, lōgiora paulo : caulem dodrantalem: florem puniceum: radicē paruam: nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat : cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo sudores mouet.

Hypericum. Cap. CXLVI.

Nostra
Perfora=
ta.

Hypericum alij androsamon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam semen odorate resinam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, subrubro, folio rute: flore luteo, qui digitis tritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsamon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo

tando oblōga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locis cultis & asperis. Vrinam ciet, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Fossilia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. Cap. CXLVII.

Ascyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinosum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmum vocauere. Vsus seminis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nā biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ANNOTATIO.

* Vinoso succo } Marcellus sanguineo vertit, qui non vt Ruellius *ὀρωδν*, sed potius *ἐπαρωδν*, vt capite de hyperico, legisse videtur: quæ fortè lectio magis genuina. Nam & Plinius lib. 27. cap. 4. Androsæmi comam tritam sanguineo succo manare, tradidit.

Androsæmum. Cap. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenui-

DIOSCORIDIS

bus: rubentibus virgis, & folijs rufa, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita & vinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasq: circa quas, flores pusilli, latei: & in calyculis semen papaveris nigri, insignæ lineis. Huius comæ trita resinofum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, vulneribus sanguinem cohibet.

Coris.

Cap. CXLIX.

COris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio erica rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semē menses trahit, & vrmas: contra phalāgiorū morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illimitur. Radix vino decocta potaq: defectus opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quàm optimè cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex quare pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys.

Cap

CL.

Vulgo

lua arc

thritica.

Aiuga herba in terra repens: & incurua similis: folijs semperuiui minoris, multò te-

* densis, odore pinus flore tenui, luteo, vel cādidō. * ὁ πὸ
 radice cichorij. Folia septem diebus in vino pota, re xuptes,
 gio morbo medentur: & quadraginta diebus ex id est sub
 hydromelite, ischiadicis sanant: dantur peculiariz curua.
 ter vrinx difficultatibus, iocineris, & renum vis nuxa
 tū: torminosi profunt. Ea apud Heracieam Ponti id est, fre
 cam, perinde atque antidoto cōtra aconitum vtun quenti
 tur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum bus.
 polenta iure decocti subacta: trita in farinam &
 cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta
 melle, cum eris squama & resina deicit: apposita
 ex melle, vulue vitia extrahit: mammarum duris
 tias discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpūt,
 cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiuge,
 cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis,
 prætenuihus, coma supradictæ: flore candido: semine
 nigro: hæc etiam pinum redolet. Tertia mas no
 minatur, paruula, folijs exilibus albis, pilosis: cau
 le aspero, cādido: luteis flosculis, semine iuxta alas.
 Resipit & hæc pinum. Hæ duæ uim superioris ob
 tinent, sed non usque adeo efficacem.

TERTII LIBRI
FINIS.

PEDANI
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER IIII.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



RIBVS antè libris, amantissime Aree, tradidimus odora-
menta, olea, arbores, vnguen-
ta, animalia, frumenta, olera,
radices, succos, herbas, semi-
naq;. In hoc autem quarto dis-
seremus de radicibus, & eis,
que restant, herbis.

Betonica.

Cap. I.

CEstron psychotropho vocitatur, quoniam fri-
gidis locis inueniatur. Latini betonicam appel-
lant. Herba est, caulem ferens tenuem, cubiti altitu-
dine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mol-
lia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem
maiora: in summis caulibus, semine veluti satureie
spicatum inest. Decerpta huius folia siccantur, pluri-
mos ad vsus. Radicibus nititur, vt veratri, tenuis-
sibus. Que ex hydromelite in potu, pituitosam vo-
mitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuul-

sis, mulieribus vulue malo opportunis, & ad laxā
 dos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydro
 melite. tres in vini sextario drachma, contra serpe
 tium morsus ebibūtur. Herba magna vtilitate il
 latis à serpente uulneribus illinitur: aduersus etiā
 uenena drachma ex uno pota cōuenit: præsumpta
 ea, si uenenum hauriatur, nihil nocebit: urinā ciet:
 aluum subducit: medetur comitialibus & insaniis,
 pota ex aqua: & iocineris lienisq; uitij, drachmæ
 pondere in aceto mulso: concoctionem adiunuat, si
 quis eam fabæ magnitudine secundum cœnam cū
 melle cocto deuorarit: modo consimili acida ructan
 tibus propinatur. Stomachicis eam man lucare et
 succum deuorare proderit, si postea dilutum unum
 sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus
 obolis, cum diluti uini egelidi cyatho: ischiadicis, re
 num & uesicæ doloribus, ex aqua: aquæ inter cus
 tem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant:
 sin aliter, ex mulso: regio morbo laborātes recreat,
 menses pellit, orachmæ pōdere cum uiuo pota: aluū
 purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis
 decem cyathis. Facit cum melle ad tabem & puru
 lentam excreationem. Folia sicca tritaq; fictili uas
 se reconduntur.

Britanica. Cap. II.

Britanica aut uetonica, folia habet syluestris
 lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu ad
 stringentia: radicem tenuem & breuem: caulem

DIOSCORIDIS

paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vini habet adstringentem, primum depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lysimachia. Cap. CIII.

Lysimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altioresue, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectione supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pessa sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur: uulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

Cap. II II.

Nunc Ceterum **P**olygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt: folia ruta, sed molliora longioraque: semine sub omnibus folijs turgescente: unde marem appellari uolunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & urinae stillicidio: nam urinam aperte ciet. Cum

uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur, daturq; in febribus per horā ante significationes: fœminarum profluvia impositu sistit: idem succus purulentis auribus * instillatur. Facit eximie ad ge
nitallū vlcera, cū vino, adiecto melle, decoctus. Sto-
machi feruore, sanguinis reiectionibus, vlceribus
quæ serpūt, ignibus sacris, collectionibus, tumori-
bus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. San-
guinaria fœmina fruticat vno caule, aruidini tene-
re simili, densis geniculis, & in se tubarum modo
farctis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis
piceæ similes. Radicis nullus vsus: nascitur in ri-
guis. Huic quoque spissandi refrigerandiq; natura,
ad eadem valens, sed inefficacior.

* καὶ
σπὸς ὤ
ταλγί' ας

Polygonatum. Cap. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cu-
bito altiore: folijs lauri, latioribus, & leuiori-
bus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam
adstrictione: flores per singulos foliorum exortus
promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à ra-
dice supputatione: radicem habet albam, mollem,
longā, crebro geniculatam, densam, graueolentem,
digitum crassitudine æquantē: quæ vulneribus effi-
caciter illinitur. Quinetiā maculas in facie delet.

Vulgo si-
gillū Sa-
lomonis.

Clematis. Cap. VI.

Clematis humi serpit: lato, pinguiq; solo pro-
uenit, viticulas spargens crassitudine iunci exi-
guas: folio lauri figura & colore, multo minora. vocant.

Est quā
Latini

Vincam
peruincā
vocant.

DIOSCORIDIS

Flāmula
uulgò. Ea cū caulibus in uino pota, alui profluvia & dysenterias sedant: subdita in pecto cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus uulnū medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita serpentum morsibus, iuramentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis. Est et altera clematis, quæ uticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentū: folium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, ut smilax. Semen tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Polemonia. Cap. VII.

*** Polygoni.**
*** Struthio.** Polemoniam alij philateriā, Cappadoces chilyodynamin appellant, ramis exilibus, utrinque pinnatis: folijs paulo quā rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut * sanguinariæ proximis, quibus in summis uelut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicanee, * radiculæ simili: nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua aduersus urinae difficultatem, & coxendi cum cruciatibus. Datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: cumque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

*Flores lutei. } Ne moueare ficubi for
tè, vt nos plerisque locis, cādidis floribus
conspexeris: solent enim pro loci varieta-
te in vna eadēque herba flores non ra-
rò cōmutari: id quod Dioscorides etiā in
Atractylide, ac multis alijs plantis fatetur.
Symphytum, siue alus. Cap. VIII.

Symphyton petreon, id est alus, nascitur in pe-
stris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus:
capitulis thymi: * surculossum totum, odoratū, * Ita Pl
gustu dulce, saluam ciens. longa radice, subrusa, nius Gra
digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsā et eius συλῶ
potum pulmonis uitia purgat: sanguinem reuēciens, id est
tibus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysente- ligno-
riam, rubraq; sceminarum profluvia, in uino deco- sum.
ctum: ad conuulsa uerò & rupta, ex aceto mulso
bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat,
faucibus asperis subuenit, uulnera recentia ente-
rocelasq; conglutinat, & illitu cohibet. Carnes au-
tem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & al-
terum symphyton, quod aliqui pecton uocant: id Nūc Cō
caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassū, solida
leuem, angulosum, ut sonchi inanem, circa quē bre maior.
in interuacante spatia, folia exeunt angustā, bu-
glossa proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum
angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū
sinu prodeuntibus, in quibus * flores lutei, & circa

DIOSCORIDIS

ca caulem velut verbasci semina emicant. Tā can-
lis, quā folia, aspera lanugine horrēt, tactuq; pru-
ritum concitant radices demittuntur: foris nigrae,
intus candidae, viscosae quarum est vsus. Tritae &
potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt, re-
centia vulnera illita conglutinant: carnes quoque,
si concoquātur, cogūt additae: inflammationibus, pra-
sertim sedis, cū senecionis folijs vtiliter illinuntur.

Holostium.

Cap. IX.

Holostium herba est pusilla, tribus qua-
tuorue digitis supereminens, extra terrā,
folijs viticulisq; coronopo aut graminī
proximis, gustu adstringentibus: radice alba, pra-
tenu vsque in capillamenti speciem, longitudine
quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis.
Vsus eius ad rupta, in vino potae: nam & carnes co-
guntur, decoctionibus addita.

Stoebe.

Cap. X.

Stœbe vulgaris est notitia: cuius semen &
folia stringunt: quapropter decoctum dysen-
tericis infunditur: auribus quoque purulen-
tis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruētis pro-
sunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum.

Cap. XI.

Clymenum caule fert fabae, quadratum: folia
plantaginis, folliculis supra caulem in sese
inflexis, vt in iride, & polyporum cirrhis. Proba-
tissimum est ē montibus. E frutice toto cum ra-

dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: celiacos, rubraque; sicminarum profluvia, refrigerando infrenat sanguinem naribus erumpentem supprimit. Trita folia, aut si lique recētibus uulneribus imposita, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymentum. Cap. XII.

Periclymenon simplex fruticat, ex internodiis Vulgò parua folia habens, ipsum amplectentia, sub Caprifoliis, hederacea: inter folia surculi exeūt, in quibus bacca, hederæ similes. flos fabæ, candidus, alius quantum rotundis, & quasi in folium procubens: sylua. semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nasceitur in aruis ac sepibus, conuolvens se adminiculis, propter assilensibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pōdere detur in uino, quadragenis diebus, lienem absorbet, lassitudinē discutit: sed urinam ciēt, statim à sexto die cruentā. Orthopnœæ, & singultui prodest: partum acceterat. Folia sunt eisdem uiribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatē fucere produntur: per uētis ex oleo, febrium algores abigunt.

Tribulus. Cap. XIII.

Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus, uiliculis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris: iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum

DIOSCORIDIS

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum
somam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pedi-
culo longo: caule parte summa, quam ima crassio-
ri. Adsunt ei & capillamenta quaedam spicacea:
semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; re-
frigerantis & inspissantis est naturæ: idè inflam-
mationes omnes cataplasmate adiuvat. Ulcera in
ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasq;
persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum me-
dicinas, Semen dum recens bibitur, calculosis iuva-
mentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, il-
litæue, iectos à vipera recreat: contra venena cum
vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum
pulices nocat. Thraces qui ad Strymona amnem
habitant, virenti tribulo equos sagināt, et è dulci
semine & esculento panem, quo vescūtur, faciūt.

Limonium.

Cap. XIII.

Limonion, folia habet beta, tenuiora et longio-
ra, decem, saepe plura: caulem tenuem, rectū,
lilio æqualem, seminibus rubris scatētem, quæ gu-
stata adstringunt. Semen tritum, & ex vino ace-
tabuli mēsurā potum, dysentericis coeliacisq; pro-
dest: rubra fœminarum profluvia sistit. Nascitur
in pratis & palustribus.

Lagopus.

Cap. XV.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota: aut
in febris, ex aqua Eadem inguini alligatur, in
inflammatione. Nascitur in segetibus.

MEdion in saxis & opaci nascitur. folia habet * iridis: caulem tricubitalem, & in eo * Alij se florem gradem, purpureum, rotundū: semine trici, ridis. minuto: radicem dodrantalem, crassitudine hăculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses fœminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

Epimedium.

Cap. XVII.

EPimedium, caulis est non magnus, hedere folijs, dens atq; duodenis, neq; florem, neq; fructū ferēs: radice tenui, nigra. graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo tria, imposita cataplasmate, mammas increscere non sinunt. Rădix conceptū adimit. Folia trita quinis drachmu, post menstruas purgationes, quinq; diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Gladiolus

Cap. XVIII.

XYphion, alijs phasganon, alijs machæronion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo nucronatum, nervosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorū bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, su

DIOSCORIDIS

perna vberior: nascitur in aruis. Superior cum thu
re illita, admisto uino, spicula & aculeo è corpore
extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite
discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri so
let. Menses imposita trahit. Superiore radice ex vi
no pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta
sterilescere tradūt. Superiorem quoque vtiliter in
fantium enterocelis, cū aqua potui dare p̄cipiunt.

Sparganium. Cap. XI X.

Sparganium, aliqui xiphidion uocāt: folia habet
gladioli, sed arctiora, et in terrā magis procum
bentia: in summo caule ueluti pilula prominent, in
quibus semē. Contra serpentis uenena, radix cū ui
no datur. Xyris. Cap. XX.

XYris, folia habet iridis, latiora, & in cacu
mine mucronata: quorum medio caulis erū
pit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangu
lares dependent: in quibus purpureus flos, in medio
punicæ: semen in folliculis: simile fabis, rotundū,
rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Cōtra
capitis uulnera, fracta q; efficax est: aculeos & spi
cula omnia citra molestiam extrahit, adiecta flo
ris eris tertia parte, & radice centaurij ac mellis
quinta: tumoribus & collectionibus illita cū aceto
medetur. Rad. x ex passo bibitur, ad conuulsa, ru
pta, coxendicum dolores, strangurias & alui pro
fluui. Semen tribus obolis potum, urinam uehemē
tius im̄pellit: & cum aceto, lienem absumit.

Anchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia habet lactuce in acumē fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquoversum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ estate provenit, ac manus inficit sanguineo colore: lato sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est igni sacro cum polenta medetur: lepris & vitiligimbus illinitur ex aceto: partus extrahit, vulvæ indita. Eius decoctum renum vitij lieini, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt alium folia in vino pota. Radice pigmentarum utuntur ad unguentorum spissamenta. Est et altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum uergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ menses sanguineum succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsque inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est et alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latas ventris tineas excutit.

DIOSCORIDIS

Lycopsis.

Cap. XXII.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis uocatur, folijs lactuce, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore in ijs paruo purpurascente: radice rubra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cū oleo radix illita, uulneribus medetur: et cū farina hordeacea, ignibus sacris. sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium.

Cap. XXIII.

Vulgo
lingua
hircina.

Echion, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: caudiculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breuiora. flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti uiperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat, in uino aut sobritione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum. Cap. XXIIII.

* Melan
th.

Ocimoides, Latini ocimastrum uocant, folijs fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut & gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in uino potum, quæ uiperarum ceterarumque serpentium moribus

fibus medeatur. Datur ischia dicis cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Erinus.

Cap. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & flumines, folijs ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis, dodrantalibus surculis quinis senisue, flore candido: semine nigro, paruo & acerbo: folia & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

* Sic
Plin. In
Græco
simplici

Gramen.

Cap. XXVI.

Gramen geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, et, ut arundinis parua, lata, in exilitatem fastigiantur, eaq; iumenta et boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae difficultatibus. calculosa etiã vesicae excrementa cominuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur præsertim in Babylone, id, quod iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso mote gignitur, dẽsius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, cãdido: semine paruo, nõ inutiles: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, cãdidis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si in vino cũ melle pari, & myrrhe di

ter, Succo.

DIOSCORIDIS

midio decoquatur, adiſcianturq; piperis & iſturia
 tertie portiois, probatiſſimum erit oculorum me-
 dicamentum: id in area pyxide reconditur. Deco-
 ctum radicis ilem, quod herba, præſtat. Semen ve-
 hementius vrinam impellit, aluum vomitioneſq;
 ſiſtit. Natū in Cilicia gramē, quod incolæ cinnā ap-
 pellant, bones inflāmat, ſi eo virēti ſepe paſcātur.

Sideritis.

Cap.

XXVII.

Nūc herba Iudai-
 ca, et Te-
 trahil.

Sideritim aliqui heracleam vocant. folia habet
 marrubij, ſed longiora, ſatis ad frondem quere-
 cus aut ſaluia accedentia, minora tamen, & aſpe-
 ra: caules edit quadratos, dodrantē altos, acquan-
 doq; etiam maiores, non iniucundi guſtus, aliquan-
 tumq; ſubſtringentis: in quibus per interſtitia or-
 biculata vertebra, vt in marrubio, ſpectantur, &
 ſemen in eis nigrum: naſcitur in petroſis. Illita fo-
 lia, ſuapte vi, vulnere ſine inflammationis pericu-
 lo iungūt. Altera ſideritis binum cubitorum, ramu-
 lis exilibus: folio filicis, numeroſo, vtrinq; per oras
 diuiſo: pediculo longo, prodeuntibus ē ſummo ala-
 rum ſinu ſurculis, longis, tenuibus: capitulo in ca-
 cumine orbiculato, aſpero, in quo ſemē continetur,
 quā betæ rotundius aliquantū, ac durius. Huius
 vis, foliorumq; ad vulnere, præcipua eſt. Sideritim
 aliam eſſe tradunt, quam Crateuas heracleam vo-
 cat, in macerijs, & vineis naſcentē, folijs ab vna
 ra lice multis, coriandro ſimilibus, circa caniculos
 dodrātales, teneros, leues, ſubcādidos atq; ſubrubi

cundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & le-
to. Huius ea vis est, vt quannus recenti vulnere im-
posita, sanguinem supprimat.

Achillea. Cap. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sidentis, dodrā
tales aut maiores gerit scapos, fusorum effi-
gie, minutulis folijs circundatos, ex obliquo crebras
habentibus incisuras, sectionibus coriandro simili-
bus, subfuluo colore lentu, odore multo, non insua-
ui, verum medicato: umbella in cacumine rotūda,
floribus candidis { purpureis } & aurum amu-
lantibus: provenit leto solo. Trita coma sanguino
lenta glutinat, & ab inflammationum periculo tue-
tur: erumpentem sanguinē inhibet, et cruenta vul-
ne profluvia, i vellere. Decocto quoq; insidet scēmi-
na fluxioe vulnus laborātes. Ad dysenteria bibitur.

Rubus. Cap. XXIX

Rubus, notitie vulgaris. Vinū habet siccū
di, & adstringendi: capillum tngit. Ra-
morum decoctum, potu aluum sistit, &
seminarum profluvia, præsteris morsui accommo-
datissimum. Gingivas firman, & oris vitijs fo-
lia commanducata medentur, cohibentq; illita, vlce-
ra quæ serpunt. Vlceribus in capite manantibus,
oculisq; procidentibus remedio sunt, & condyloma-
tis, et hemorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis,
& stomachi doloribus, trita conuenienter imponi-
tur. Canes cum folijs tunduntur, exprimiturque

D I O S C O R I D I S

succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo masculinis, quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in vino poto.

Rubus idæus. Cap. XXX.

I Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priorre, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. Cap. XXXI.

H Elxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunq; contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deiecit aluum.

Elatine. Cap. XXXII.

E Latine folia habet helxine, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinque senisue, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

Eupatorium. Cap. XXXIII. Est Offi

Eupatorium, fruticosā herba est, vnicū esse cinarum
rens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, Agrimo
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliora. earū
rem: folijs per intervalla quinquēfolij, aut canna autē Eu
bis potius similibus, quinq; partito aut amplius di patoriū
missis, nigricantibus, & ipsis per ambitū serratis. se fortē cā
mē medio caule erūpit, pilosum, deorsum spectans, nabis syl
quod siccatum vestibis inheret. Contrita huius fo uestris,
lia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus, quae a de qua
gre cicatricem trahunt, medentur. Herba & semē precedē
in uino potum, dysenteria, iocineris vitijs, & serpēti libro.
tium ictibus, liberat. Nec desunt qui aberrantes * * Gre
argemonem hanc appellarint, cum tamen longē eius Arte
alia sit, uti exposuimus.

Quinquēfolium. Cap. XXXIII. hēt: sed

Quinquesolium ramulos fert festucarum simi esse, ut
litudine, tenues, dodrātales, in quibus semē. nunc vi
folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, des, arge
in ambitu serrata: florem ex cādido pallecentē, au monē le
ri a mulū. Nascitur in riguis, et aquarijs ductibus. gēdū, ex
Subrubram habet radicē, oblongam, ueratro nigro anemōe
crassiorē. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis deco (de qua
Etā ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolo li. ij.) nō
res sedat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arte obscure
rie scabritias, gargarizatu laeuigat: contra alui cognos
profluvia, & dysenterias auxiliatur: itē articu scas.
lorum coxendicūq; cruciatibus pota. Cocta in

DIOSCORIDIS

aceto, & illita serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, reduvias, condylomata, psorasq; sanat. Tenere radice succus, contra iocineris, pulmonumq; uitia prodest: item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto uino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana uero, ternum. in quotidiana, unius. Ea quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum melle et sale, tam uulneribus quam fistulis remedio sunt. enterocelicis auxilium praestant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

ANNOTATIO.

*Spicam lolio similem. Non obscure hinc elicitur Lolium spica esse insignitum. ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam uulgo cognominatam, cuius in segetibus ubique tam uber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureum florem emittit.

Phoenix.

Cap. XXXV.

Phenix folia habet hordei, sed breuora, & angustiora, * spicam lolio similem: calamos digitorum seminum, radici aduolutos: septenas octo.

nascē spicas. In aruis rectisq; recenter illitis nascitur. Harum virium compos, ut in uino austero posita, alui profluvium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinae impetus infrenet. Sunt qui adaleligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguine suppressere prodant.

Idæa radix. Cap. XXXVII.

IDæa radici folia sunt ea, quæ rusco: circum ea ueluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rodia radix. Cap. XXXVII.

Ignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, leuior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madesacta frōti & temporibus cum rosacei momēto imponatur.

Equisetum. Cap. XXXVIII.

Equisetum in rignis & scrobibus nascitur: Cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se farcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iunceæ circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herba spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipsa sistit: prodest dysentericis in uino potus: urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tri-

Vulgò
Cauda
equina.

DIOSCORIDIS

tis folijs; & illitis. Radix cum sua herba tuſſimam orthopneam, ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua portis, diſſectiones veſicae & inteſtinoris, enterocelaq; in vnum coaleſcere, cogiq; feruntur. Alterum equiſetum caulis eſt rectus, equalis, cubito maior, inanis: comis per interualla breuioribus, cãdidioribus, & mollioribus. Ad cum aceto tritum vulneribus remedio eſt, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectorium. Cap. XXXIX.

Coccum, quo infectores vtuntur, frutex eſt ſurculofus, paruus, cui grana ceu lentes adharẽt, quae electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia, deinde Aſia, & Cilicia: vltimũ ex omnibus Hiſpanicum. Vis huic ſpiſſandi: vulneribus, neruiſq; præciſis, conuenienter ex aceto tritũ illinitur. Naſcitur quoque in Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium ſimilitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium. Cap. XL.

Tragium naſcitur in Creta tantũ inſula, lentifeo ſemine, folio, & ramis ſimile, ſingulis tamen minoribus, * ſuccus ei lacteus, gummi non diſſimilis. Semen, folia, lacrymaq; illitu ſpicula è corpore eũciunt: omnia quoque corpori impaſta, euocant: pota ſtranguaria medentur, calculos veſicae frangunt, menſes trahũt. Modus in ſumptione eſt, drachma vna. Fama eſt, ſylueſtres capras ſagittis confoſſas, eius herbae pabulo ſpicula

* Ita
Pli. Graecus
cus co-
dex ſim-
pliciter,
ſuccus.

excutere. Est & alterum tragium, quod tragoceros aliqui vocant, folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam: quā crudam vel coctam esse dysentericis prodest. Folia **Nominis** autumnō, hirci virus olent: exinde sibi tragij nomē **causa**, adoptauit. Prouenit in montibus, & precipuijs.

Tragum.

Cap. XLI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut traganon vocant: maximē in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acinū decem ex vino poti, cœliaci, & scœminis fluxione vulue laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus vtuntur cum opus est.

Iuncus.

Cap. XLII.

Iunci duo genera: vnum leuis nominati, altiorum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera: vnum sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iuncus, qui vocatur oloschanos, prioribus carnosior, asperiorq;, is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diluto vino potum, sistit aluum, & rubra scœminarum profluvia: vrinam cit, capitisque dolores facit.

DIOSCORIDIS

Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus illicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

Cap. XLIII.

Offici-
nis He-
patica.

Lichen, qui saxi est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adhæret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluuiâ sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Lauat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & linguae defluxiones inhibet.

Paronychia. Cap. XLIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs illita paronychys atque durities, remedio est.

Chrysocome. Cap. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat. comâ specie corymborum, hyssopo simili: radice hirsuta, neratri nigri modo, tenui, cyperum equantem: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosis opacisq: nascitur. Radix excalescit, & adstrinxit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammato male habet: contra purgationes ualua, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. Cap. XLVI.

Chrysogonum dense fruticat, querni folijs: flore coronarij uerbasci: radix ut rapum exuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ tri-

ta cū aceto, atque imposita, muris aranei morsibus auxiliatur.

Elichrysum. Cap. XLVII. Alii He

ELichryson quidam chrysanthemon, nonnulli eliochry-
 & id amaranton uocant, quod eorum simulac- son. Offi
 cra coronant: ramulum habet candidum, virentē, cuius
 rectū, firmū: folia intercedentibus spatijs angusta, Stachas
 abrotono similia: comam aurea licis in orbem, uni- citra
 bella rotunda ueluti siccis corymbis dependentibus,
 radice tenui: nascitur in asperis, & torrentium ala-
 uis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores,
 urinæ stillicidia, ruptaq;, coma ē uino pota opitu-
 latur: ciet menses. Sanguinem concretum ventris
 ac uesica absunit, pota cum mulso. ieiunis, trium
 obolorum pondere, sistit destillationes, data in ui-
 no albo diluto: uestibus inseritur, ut eas ab eroden-
 tium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum. Cap. XLVIII.

Chrysanthemū aut caltha, nonnullis buphtal-
 mos: herba est tenera, fruticosa, laues proferēs
 caules, et multifida folia: flores supra modū splēde-
 res, luteos, orbē oculi imitātes, unde buphtalmi no-
 mē traxit: propter oppida nascitur. Cuius caules o-
 leris uice māduntur. Flores cū cerato triti, steatoma-
 ta discutere produntur: regio morbo correptis, colore
 breui reddūt, si sequēte lōgo balnei usu, post exitū
 ebibātur. Ageratū. Cap. XLIX.

ACeraton fruticosa herba est, palmam longia

DIOSCORIDIS

tudine asurgens, simplex, humilis, origano maxime similis: umbellā gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie cōseruetur. Vis decocti feruens: huius vsta nidor urinam cit, et vulue duritias emollit.

Verbenaca.

Cap. L.

Peristerion, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columba circa hanc perquam libenter versari soleant. Dondrantis altitudine, & interdum amplius adolescit: folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radiceq; sola, constare sepius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosaceo impasita, vulvarum dolores finire putantur, ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent, vulnura glutinant: veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba.

Cap. LI.

Sacra herba, quæ & peristereo nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus castio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cū radice in vino pota, illitæue, aduersus serpēte: pollent: eadē drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus ieiuno ore, contra regiū morbum bibum

tur: veteres tumores & inflāationes mitigant: sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tōsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur tricliniū, quāmaduerit, letiores conuictus fieri. Datur potandū in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum folijs circundantibus, quartanis, quartum. Sacram vocant herbam, quoniā multum ad anileta, expiationesq; commendetur.

Alstragalus.

Cap. LII.

Astragalus, parvus à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quā adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringētes nascitur in vëtosiss, opacis, et in nivalibus. eo Mēphis Arcadie scatet. Aluū sistit radix in vino pota: urinā mouet: vetustis vlceribus, sicca efficaciter īspargitur: sanguinem suppressit: agre propter duritiā tunditur.

Hyacinthus.

Cap. LIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: dodrācalē caulē, leuē, minimo digito tenuiorē, herbacei coloris: comā procūbentē, florum purpureorū plenā, incuruā: radicē quoq; bulbaceā. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatē coercet, et nō patitur erūpere: sistit aluum pota, et urinā īpellit, phalangiorūq; morsibus auxiliatur. Semē adstrin-

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum
emendat cum vino potum.

*Locū

Papauer erraticum. Cap. LIIII.

depraua-
tum esse
manifestè
apparet.

Sūt enim
herbae

quas hic
comemo-

rat Dio-

scorides,

diuersa

plane fa-

cie, ut mi-

eidē q; re-

etē cōpa-

rari ne-

quaquā

possint:

P

Apauer erraticum, quod rheada vocant,
vere quidem in aruis cum hordeo nascitur
flore prothius deciduo, unde et nomen apud
Graecos accepit. * Folia eruca, aut origano, aut ci-
chorio, aut thymo similia spectantur: sed longiora,
diuisa, scabra: inueniuntur ei caulis, rectus, cubitalis,
asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum
albus: oblongum caput, sed quā anemones minus:
semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digi-
ti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq;
aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta
potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semi-
na acetabuli mensura ex aqua misca pota, alimen-
teniter emolliunt: ad idem praestandum mellitis plas-
centulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cum
calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem
fotu & persusione, somnus allicitur.

Papauer satium. Cap. LV.

E

Sativi papaueris genere, quod hortense est, se-
men in panem densatur, qui sanis in usu sit:
eo etiam ex melle pro sesama utuntur: thylacium
vocant. Capitulum habet longum, & semen cano-
didum. Sylvestre vero, caput insidens demissumq;
& nigrum semen, quod pithitis nominatur: non
nullis tamen & ipsum rheas dicitur, quoniam eius

scapolacteus succus emanat. Tertium magis syl-
uestre, & ad medicinas volentius, multò his lon-
gius, productiore capitulo. Omnium in commune
natura refrigeratrix: quare si capita ipsa & folia
decoquantur in aqua somnum sotu conciliabunt.
Bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum po-
lenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sa-
cris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur
quoq; virides, & digeruntur in pastillos, qui sicca-
ti ad usum reconduntur. Capita quoq; per se in
aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto mel-
le, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id me-
dicamentum in tussi, arteria fluxionibus, & cœ-
liacorum affectis, doloris levamentum præbet. Effi-
cacius tamen redditur, addito hypocistidis succo et
acacia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bi-
bitur, contra citam alvum, & sceminarum proflu-
via: in peruvigijs fronti temporibusq; illinitur, ex
aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, sic-
catq;: sumptum erui magnitudine, dolorem finit,
concoquit, & somnum allicit: tussi, atq; cœliacoru
valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauria-
tur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad
dolores capitis cum rosaceo persusum efficax est:
aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco
instillatur: inflammationibus oculorum cum torre-
facto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

DIOSCORIDIS

Opium eo: somnum accersit, subditū sedi pro balneo. Opti-
 quod op= mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 timum. odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, lae-
 ue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod
 inter volandum non vt cera coeat, et in sole diffun-
 datur: dein admotum lucernis, non atra luceat flā-
 ma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opiō
 glaucio, gummi, aut syluestris lactuca succo, adul-
 Eius as= terant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci
 altera = colorem reddit: lactucaceo succo fictū, oxiliter spi-
 tio. rat, & asperis spectatur: gummi vitiatum, splen-
 descit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò demen-
 tia deuenierint, vt adipem ei admiscerent. Fictili
 nouo torretur ad oculorum medicamēta, dum mol-
 lius, atq; rufius appareat. Diagoras, vt Erasistra-
 tus author est, vsum eius damnauit, oculorum lip-
 pitudinibus & aurium vitij infundi vetās, quo-
 niam visus aciem hebetaret, & soporem gigne-
 ret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si
 non adulteraretur. Mnesidemus vsum duntaxat
 olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum
 somnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdi-
 cit. Quae commentitia esse, experimento deprehen-
 duntur: siquidem effectus, viriū huiusce medica-
 menti, fidem faciunt, quare non alienum fuerit
 scriptis mandare, quoniam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, et pra-
 lo exprimunt, terentesq; in mortario, digerant

in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignas-
 uis. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum ros in Opj col-
 eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus ligendi
 adigatur, ex obliquo in reclusum summam cutem in ratio.
 cidere oportet, lacrymam exeuitem, digito in con-
 cham abstergere. nec multo post redire, vt cōcreta
 inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam
 offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos
 cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, no
 vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer.

Cap. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatim, fo-
 lia habet candida, hirsuta. verbasco simi- Vulgò
 lia, in ambitu syluestris papaueris more papauer
 ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo cornutū.
 scænigræci, in corniculorū modū inflexo, vnde nomē
 mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq;: radice
 per summa cespitum nigra, crassa: nascitur in ma-
 ritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua
 decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affe-
 ctus, potu sanet: prodest his, qui crassa quædā, aspe-
 ra, aut araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter
 purgat semen, acetabulo in aqua mulsa poto. Cru-
 stas emarginat, illita ex oleo folia floresq; & ar-
 gema ac nubeculas iumentorum perunctas, abster-
 gunt. Sunt qui glauciū, hoc papaueris genere facti
 tari existimarut, falsi quadā foliorū cognatione.

DIOSCORIDIS

Opium co:somnum accersit, subditū sedi pro balano. Opti
 quod op= mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 tinum. odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, le-
 ue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod
 inter colandum non vt cera coeat, et in sole diffun-
 datur: dein admotum lucernis, non atra luceat flā-
 ma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opiō
 glaucio, gummi, aut syluestris lactuca succo, adul-
 terant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci
 adultera = colorem reddit: lactucaceo succo fictū, oxiliter spi-
 tio. rat, & asperis spectatur: gummi vitiatum, splen-
 descit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò demen-
 tia deuenerint, vt adipem ei admiscerent. Fictili
 nouo torretur ad oculorum medicamēta, dum mol-
 lius, atq; rufius appareat. Diagoras, vt Erasistras-
 tus author est, vsum eius damnavit, oculorum lip-
 pitudinibus & aurium vitijis infundi vetās, quo-
 niam visus aciem hebetaret, & soporem gigne-
 ret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si
 non adulteraretur. Mnesidemus vsum duntaxat
 olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum
 somnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdi-
 cit. Quæ commentitia esse, experimento deprehens-
 duntur: siquidem effectus, viriū huiusce medica-
 menti, fidem faciunt, quare non alienum fuerit
 scriptis mandare, quonam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, et præ-
 lo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt

in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignas-
 uis. Porro opij faciundi ratio hæc est: Cum ros in Opij col-
 eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus ligendi
 adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem in ratio-
 cidere oportet, lacrymam exeuitem, digito in con-
 cham abstergere. nec multo post redire, ut cōcreta
 inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam
 offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos
 cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne
 vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer.

Cap. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatim, fo-
 lia habet candida, hirsuta. verbasco simili. Vulgò
 lia, in ambitu syluestris papaueris more papauer
 ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo cornutū.
 sænigræci, in corniculorū modū inflexo, vnde nomē
 mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq: radice
 per summa caputū nigra, crassa: nascitur in ma-
 ritimis & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua
 decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affe-
 ctus, potu sanet: prodest his, qui crassa quedā, aspe-
 ra, aut araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter
 purgat semen, acetabulo in aqua mulsā poto. Cru-
 stas emarginat, illita ex oleo folia floresq:, & ar-
 gema ac nubeculas iumentorum perunctas, abster-
 gunt. Sunt qui glauciū, hoc papaueris genere factū
 sari existimarūt, falsi quadā foliorū cognatione.

DIOSCORIDIS

Spumeum papauer. Cap. LVIII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali: folijs admodum parvis, & radicle similibus: fructis inter ea candido. *** Struthio.** Nam herbula alba est, & spumea tota: *** radice** *** Sic ex in summo caespite.** Legitur aestate semen, cum inter Theophrasto. gre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum ac et ab ipso mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat prius. Videtur uatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest. **enī locus** Hypocoum. Cap. LVIII.

i Græco Hypocoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur Dioscoridis codicibus. **H**in segetibus aruūq; folijs rute, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

ce corruptus Apollinaris, siue hyoscyamus. Cap. LIX.

pius. **H**ioscyamus, frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores e latere caulis, ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaueris. Tres eius differentia: Vna semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini præduris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut irionis, flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores. Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in communi vsu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis rucleribusq; nascentis. Cuius occasio si non adsit, rursus usurpari oportet: niger, ut deterimus, im-

probat. Recēti semine, caulibus folijsq; tussis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum usque prorogatur: nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. Liguamentum autem succo lacteo prestantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liguamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum auferunt, commodissimè inferi solent: contra acutas calidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vulue malla, profunt: cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, cæterarumq; partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tussi, distillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax: contra mensium abundantiam, & rumpentem aliuinde sanguinem, oboli pendere cum papaueris semine, & aqua mulsa, bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, vtilissimè imponuntur: recentia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinuntur: cum vino terna, quaternæue pota, sanant algidas febres, quas epialos vocant. Cocta plerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, me-

DIOSCORIDIS

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si, colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium.

Cap. LX.

Psyllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa fœni modo, in totâ herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili: vnde & nomen. in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aque sextario madefactum, vbi concreuit aqua, illinitur: si quidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virēs domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & que cacœthe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

Cap. LXI.

Hodie solatrum

Hortense solanum, frutex cibus idoneus, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore quam ocymi, & latiore: fructu rotundo, viridi, quo

post maturitatem nigricat, aut fulvescit: herba in nocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polente illinuntur: ægylopiæ, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æstoanti stomacho auxiliantur: parotidas, cum sale detrita, illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera, quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad ægylopias cum pane. infantium adustioni, quam syriasm vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in vellere subditus. Succus fuluo galinarum curtaliū fimo subactus, & linteo appositus, ægylopijs presentaneo est remedio. Est & aliud solanum, quod peculiari nomine halicacabon aut physalida, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoluerunt, prona terram spectant: folliculis orbiculatis vesiculis similibus: semine intus fulue, rotundo, leui, acinorum vix effigie: quo coronarij utuntur, corollis intorquentes. Vini usumque hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine poto, & urinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatus in vmbra, reconditur, ad eadem valens.

Offici-
nis Al-
kekengi
Arabū
exēplo.

Solanum somniferum. Cap. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicacabō appellānt, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotonea q̃; mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydro picis dantur: si quid numera adijciatur, alienationē mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsæ, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dētium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorū hebetudines tollit.

Manicum solanum. Cap. LXIII.

Solanum manicon, aliqui persion, alij thryon appellant. Huic folium erucæ simile, maius aliquantò, satis acantho, quem paderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolēcentes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verum maius, latius q̃;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, densis aut duodenis acinis constans, similibus hedere corymbis, vt vix mollibus: radice firmatur candida.

didā, crassa, caua, cubitali : gignitur in montibus, vëto perflatus, et platanetis. Radix drachmæ vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non iniucundas obuersari : sed duplicatus hic modus, ad treis usque dies mentis alienationem affert. quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsā copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium Cap. LXIIII.

DOrycniō Cratenas halicacabon, aut caleam vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modū scabris : flore candido: siliculis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, leuibus, firmis, versicoloribus : radix ad digitum crassitudine et cubiti longitudine adolescit. Id somniferū esse cōstat. Copiosius haustū mortē adfert, Nec desuere, qui dicerent, semē in amatoria expeti.

Mandragoras. Cap. LXV.

MAndragoram, aliqui antimalum, alij circæam vocant. quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera : niger, quæ scemina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactuæ, viridis ac graueolentibus, in terra sparsis : mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum : radicibus inhaeret bene mas-

DIOSCORIDIS

gnis, binis, ternisue, inter se cōuolutis, nigris foris,
intus albis, crasso cortice vestitis, caule viduus est.

* Alij Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis & norion
morion. vocitatus: huius folia magna, alba, leta, lenia vt
beta: mala quàm alterius duplo maiora, colore in
crocum inclinante, in eūde cum gravitate quadam
olentia: quorum pomorum cibo, aliquantum opilio
nes soporantur. radix, alterius similis, maior &
candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è corti-
ce recentis radici tuso, & prælis subiecto: qui in-
solatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis
quoq; succus depromitur, sed aliquantò ignauior.
Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad
vsum suspēditur. Aliqui radices in vino ad tertias
coquunt, & defecatum ius seruant: cyathosq; vno
vtuntur, in peruligijs, & doloribus, et ante sectio-
nes vsteonesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis
ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bile
atram pituitamq; extrahit: verum potu largiore,
vita adimitur. medicamentis ocularibus, & his,
que dolores finiunt, pessis quoq; emollientibus, ad-
miscetur: semioboli pondere inditus, per se menses
& partus expellit: subditus sedi pro balano, sōm-
nificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis
horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quā
effingere optaueris, formā, ipsum facile præstat.
Folia recentia conuenienter oculorum inflāmatio-
nibus, et collectionibus, quas vlcera citarunt, cum

polenta illinuntur. duritias omneis, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delēt, si quinis senisue diebus, sensim perscrutantur. Folia seruantur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpētium ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat. articulorū cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum ē cortice radice, ad hunc modum: Ternæ mīna in vini dulcis metretam cōiūciuntur. Dantur ex eo termi cyathi ijs, qui secari aut amburi debēt, vt antē dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed vterno quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vulnus purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra scēminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamētum autem succo lacteo pręstantius est: sed non vbiq; vt experientia docet, radices lacteum succū delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragorę, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quę mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine equat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniōne,

DIOSCORIDIS

drachma pondere deuorata, vsum rationis interceptum. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternis uè, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum. Cap. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cāmoro, alij thelyphonon, alij myoctonon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caulis palmato altum: radice scorpj caudam emittitur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones ad mota radice, stupentq;: qui rursum hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis lenandi doloris gratia adijcitur. Enecat subaspe pantheras, sues, lupos & feras omnes in carnibus. Utra obiectum. Est & alterū aconitum, quod aliqui cyautē le noctonon, alij lycoctonon appellant. Huius generatio pos sunt tria. vñ, quo utuntur uenatores: alia duo in tior, her usum suum uertere medici, è quibus tertium, quod bæ, si Ponticū nominatur, plurimū in Italia, montibus Inquādo se stinis exilit: à priore distās, quoniā folia faciat effe se obtu gie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo lerit a nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cū spectus bitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis ilicabit. oblongis recondit: radices in modū squilla marum cirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem lu-

porum utuntur: insertæ siquidem crudis carnibus,
& deuorata, lupos enecant.

Cicuta.

Cap. LXVII.

Cicuta caulem edit geniculatum, ut sceni-
culi, gradem * folia ferule, angustiora, * Pli.li.
gram odoratur: rami, mox umbellæ i sum 25.c.13
mo prodeunt: flores quoque albi antes: & semen Corian-
aniso candidius: radice non alta, concava. Cicuta le dro asie
thale uenenum inest, suaq; ui refrigeratoria necat. milauit,
Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimi- cui pro-
tur contusis cacuminibus, triusquam semina & pins sa-
come siccescant: qui sole densatur in pastillos. nè, quã
Multus ad medendi rationem usus est aridi, commo ferule,
dè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia quæ sce-
temperantur: ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, niculi cõ
illitu restinguit. Herba cum come trita, & testi- stat fo-
bus circumlita, libidinum imaginationes in somno, lijs, Ci-
compescit: sed genitale resoluit. lac puerperarum cuta om-
mammis apposita extinguit: in uirginitate mam- nibus ho-
mas coerces, & increscere non patitur: pueris præ- die com-
stat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, inta- perta, ui-
bescant. Efficacissima uis Creticæ, Megarësi, mox detur a c
Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti. cedere.

Taxum.

Cap. LXVIII.

SMilax à Grecis, taxus à Latinis appellatur,
& arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-
dem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispa-
nie contermina nascent. Auicula quæ Italica tax-

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum
emendat cum vino potum.

*Locu

Papauer erraticum. Cap. LIIII.

deprava
tum esse
manifeste
apparet.
Sunt enim
herbae
quas hic
comemo
rat Dio-
scorides,
diversa
plane fa-
cie, ut uni
eideq; re-
ete copia
vari ne-
quaquam
possint:

quo autē
instaurā-
dus, peri-
tioribus
cogitādū
relinqui-
tibus.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant,
vere quidem in arvis cum hordeo nascitur
flore protinus deciduo, unde et nomen apud
Græcos accepit. * Folia eruce, aut origano, aut ci-
chorio, aut thymo similia spectantur: sed longiora,
diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis,
asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum
albus: oblongum caput, sed quā anemones minus:
semen rufum. radix longa, subalbida, minoris digi-
ti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq;
aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta
potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semi-
na acetabuli mensura ex aqua missa pota, aluum
leniter emolliunt: ad idem præstādum mellitis plas-
centulis, & dulciarijs iibis admiscuntur. Folia cum
calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem
fotu & perfusione, somnus allicitur.

Papauer sativum. Cap. LV.

ESativi papaveris genere, quod hortense est, se-
men in panem densatur, qui sanis in usu sit:
eo etiam ex melle pro sesama utuntur: thylacitis
vocant. Capitulum habet longum, & semen can-
didum. Sylvestre vero, caput insidens demissumq;
& nigrum semen, quod pithitis nominatur: non
nullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius

scapolacteus succus emanat. Tertium magis syl-
uestre, & ad medicinas volentius, multo his lon-
gius, productiore capitulo. Omnium in commune
natura refrigeratrix: quare si capita ipsa & folia
decoquantur in aqua somnum sotu conciliabunt.
Bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum po-
lenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sa-
cris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur
quoq; virides, & digeruntur in pastillos, qui sicca-
ti ad usum reconduntur. Capita quoq; per se in
aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto mel-
le, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id me-
dicamentum in tussi, arterie fluxionibus, & cœ-
liacorum affectis, doloris levamentum præbet. Effi-
caciùs tamen redditur, addito hypocistidis succo et
acacia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bi-
bitur, contra citam aluum, & sceminarum proflu-
via: in peruvigijs fronti temporibusq; illinitur, ex
aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, sic-
catq;: sumptum erui magnitudine, dolorem finit,
concoquit, & somnum allicit: tussi, atq; cœliacoru
valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauria-
tur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad
dolores capitis cum rosaceo persusum efficax est:
aurium dolori, cum amygdalino, myrrha & croco
instillatur: inflammationibus oculorum cum torre-
facto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

DIOSCORIDIS

Opium co:somnum accersit, subditū sedi pro balano. Opti
 quod op= mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 timum. odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, le-
 ue, candidū, neq; asperum, neq; grumosum, quod
 inter colandum non vt cera coeat, et in sole diffun-
 datur: dein admotum lucernis, non atra luceat flā-
 ma: extinctū deniq; odoris vim conseruet. Sed opio
 glaucio, gummi, aut syluestris lactuce succo, adul-
 Eius a= terant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci
 altera = colorem reddit: lactucaceo succo fictū, oxiliter spi-
 tio. rat, & asperis spectatur: gummi vitiatum, splen-
 descit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò demen-
 tia deuenerint, vt adipem ei admiscerent. Fictilis
 nouo torretur ad oculorum medicamēta, dum mol-
 lius, atq; rufius appareat. Diagoras, vt Erasistra-
 tus author est, vsum eius damnauit, oculorum lip-
 pitudinibus & aurium vitijis infundi vetās, quo-
 niam visus aciem hebetaret, & soporem gigne-
 ret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si
 non adulteraretur. Mnesidemus vsum duntaxat
 olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum
 somnum conueniret, alioqui nobis vt noxio interdi-
 cit. Quae commentitia esse, experimento deprehen-
 duntur: siquidem effectus, viriū huiusce medica-
 menti, fidem faciunt, quare non alienum fuerit
 scriptis mandare, quonam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, et prae-
 lo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt

in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignas-
 uis. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum ros in Opij col-
 eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus ligendi
 adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem in ratio-
 cidere oportet, lacrymam exeuntem, digito in con-
 cham abstergere. nec multo post redire, ut cōcreta
 inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam
 offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos
 cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne
 vestibus succus deradatur.

Corniculatum papauer.

Cap. LVI.

Papauer ceratites, id est, corniculatim, fo-
 lia habet candida, hirsuta. verbasco simi- Vulgò
 lia, in ambitu syluestris papaueris more papauer
 ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo cornutū.
 scenigræci, in corniculorū modū inflexo, vnde nomē
 mutuatur: semine papaueris, fusillo, nigroq;: radice
 per summa caespitum nigra, crassa: nascitur in ma-
 ritimis & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua
 decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affe-
 ctus, potu sanet: prodest his, qui crassa quedā, aspe-
 ra, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter
 purgat semen, acetabulo in aqua mulsa poto. Cru-
 stas emarginat, illita ex oleo folia floresq; & ar-
 gema ac nubeculas iumentorum perunctas, abster-
 gunt. Sunt qui glauciū, hoc papaueris genere factū
 tibi existimarūt, falsi quadā foliorū cognatione.

DIOSCORIDIS

Spumeum papauer. Cap. LVIII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali: folijs admodum parvis, & radicle similibus: fructis inter ea candido. **Struthio.** Nam herbula alba est, & spumea tota: & radice. **Sic ex in summo caespite.** Legitur estate semen, cum inter Theophrasto. gre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum ac etabuli mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat prius. Videtur uatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest. **enī locus Hypecoum. Cap. LVIII.**

Hypocoon, aliqui hypopheon vocant: nascitur in segetibus aruisq; folijs rutes, exilibus radicis codicis. **Natura eadem, quæ papaueris succo.** **Apollinaris, siue hyoscyamus. Cap. LIX.**

Hioscyamus, frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores e latere caulis, ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaueris. Tres eius differentia: Vna semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini praeduris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut irionis, flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores. Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in communi vsu damnantur. Tercium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis rudibusq; nascens. Cuius occasio si non adsit, rufum vsurpari oportet: niger, ut deterrimus, im-

probat^{ur}. Recēti semine, caulibus solijsq; tussis, suc-
cus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus
ad annum usque prorogatur: nam facile corruptio-
nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine sepa-
ratim in aqua calida tuso, & expresso. Liquamen-
tum autem succo lacteo præstantius est, & magis
dolores finit. Contusa herba recens, addita trime-
stri farina, digeritur in pastillos, & reconditur.

Liquamentum primum, & quod à sicco semine
exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum aufe-
runt, commodissimè inseri solent: contra acutas ca-
lidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vulue ma-
la, profunt: cum farina autem aut polenta, oculo-
rum, pedum, cæterarumq; partium inflammatio-
nes placant. Semen eadem præbet: tussi, distillatio-
nibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax:
contra mensium abundantiam, & rumpentem ali-
unde sanguinem, oboli pendere cum papaueris semi-
ne, & aqua mulsa, bibitur: podagris subuenit: te-
stibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tri-
tum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasmatibus,
quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet.
Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus,
per sese, & ex polenta, vtilissimè imponuntur: re-
centia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinun-
tur: cum vino terna, quaternæue pota, sanant al-
gidas febres, quas epialos vocant. Cocta plerum-
modo folia, si acetabuli mensura manduntur, me-

D I O S C O R I D I S

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si, colo ulcus sentiente insundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium.

Cap. LX.

P Syllion folijs coronopo non dissimilibus, his suis, longioribus: sarmentosa scæni modo, in tantâ herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili: vñle & nomen. in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aque sextario madefactum, vbi concreuit aqua, illinitur: si quidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virēs domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & que cacoe the vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

Cap. LXI.

Hodie so **H** ortense solanum, frutex cibus idoneus, pusillulatum lus, multis concavis alis: folio nigro, maiore corrupte quàm ocymi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qu

post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba in
 nocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare for-
 lia ulceribus que serpunt, & ignibus sacris, conue-
 nienter cum polline polentæ illinuntur: ægylopiæ, ca-
 pitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æ-
 stoanti stomacho auxiliantur: parotidas, cum sale
 detrita, illitu discutunt. Valet succus eius aduersus
 ignem sacrum, atque ulcera, quæ serpunt, cum cea-
 russa, rosaceo & argenti spuma: ad ægylopias cum
 pane. infantium adustioni, quam syriasin vocant,
 cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel
 oui vicem exhibet contra acutas fluxiones illitus:
 aurium dolori instillatus prodest. Mensium abun-
 dantiā sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gal-
 linarum curtalium fimo subactus, & linteo appo-
 situs, ægylopijs presentaneo est remedio. Est & a-
 liud solanum, quod peculiari nomine halicacabon
 aut physalida, id est vesicariam vocant, folijs an-
 tediecto similibus, verum latioribus: cuius caules,
 posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant:
 folliculis orbiculatis vesiculis similibus: semine in-
 tus fulue, rotundo, leui, acinorum vix effigie: quo
 coronarij utuntur, corollis intorquentes. Vini usum
 que hortensis solani habet: verum cibus nequa-
 quam expeditur. Regium morbum purgat, semine
 poto, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus
 extrahitur, qui siccatus in umbra, reconditur, ad
 eadem valens.

Offici-
 nis Al-
 kekengi
 Arabū
 exēplo.

DIOSCORIDIS

Solanum somniferum. Cap. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicacabō appellunt, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotonea q; mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ pondere positus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydro picis dantur: si quid numero adijciatur, alienationē mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis, quæ doloris lenamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dētium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorū hebetudines tollit.

Manicum solanum. Cap. LXIII.

Solanum manicon, aliqui persion, alij thryon appellauere. Huic folium eruca simile, maius aliquantō, satis acantho, quem paderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolēcentes: caput in cacumine, olivæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verū maius, latius q;: florem nigrum: postquam eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hedere corymbis, vt vix mollibus: radice firmatur candida.

didā, crassa, caua, cubitali: gignitur in montibus, v̄eto perflatus, et platanetis. Radix drachmæ vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginēsq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad treis usque dies mentis alienationem asfert. quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsā copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium Cap. LXIIII.

Dorycniō Cratenas halicacabon, aut caleam vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modū scabris: flore candido: silisquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, leuibus, firmis, uersicoloribus: radix ad digitum crassitudine et cubiti longitudine adolescit. Id somniferū esse cōstat. Copiosius haustū mortē adfert, Nec desuere, qui dicerent, semē in amatoria expeti.

Mandragoras. Cap. LXV.

Mandragoram, aliqui antimalum, alij circaeam vocant. quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ scemina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactuce, virosos ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inheret bene mas-

DIOSCORIDIS

gnis, binis, ternisue, inter se cōuolutis, nigris foris,
intus albis, crasso cortice vestitis, caule viduus est.

* Alij Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis & norion
morion. vocitatus: huius folia magna, alba, leta, leuia vt
betæ: mala quàm alterius duplo maiora, colore in
crocum inclinante, iucunde cum grauitate quadam
olentia: quorum pomorum cibo, aliquantum opilio
nes soporantur. radix, alterius similis, maior &
candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è corti-
ce recentis radici tuso, & prælis subiecto: qui in-
solatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis
quoq; succus depromitur, sed aliquantò ignauior.
Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad
vsum suspēditur. Aliqui radices in vino ad tertias
coquunt, & defecatum ius seruant: cyathosq; vno
vtuntur, in peruligijs, & doloribus, et ante sectio-
nes vsteonesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis
ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilē
aerem pituitamq; extrahit: verum potu largiore,
vita adimitur. medicamentis ocularibus, & his,
que dolores finiunt, pestis quoq; emollientibus, ad-
miscetur: semioboli pondere inditus, per se menses
& partus expellit: subditus sedi pro balano, som-
nificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis
horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quā
effingere optaueris, formā, ipsum facile præstat.
Folia recentia conuenienter oculorum inflāmatio-
nibus, et collectionibus, quas vlcera citarunt, cum

polenta illinuntur. duritias omneis, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delēt, si quinis senisue diebus, sensim perficentur. Folia seruantur in muris, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpētium ictibus ex melle aut oleo, ineditur: strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat. articulorū cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum ē cortice radice, ad hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi ijs, qui secari aut amburi debēt, vt antē dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterino quodam pressi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vuluas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra sceminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamētum autem succo lacteo præstantius est: sed non vbiq; vt experientia docet, radices lacteum succū delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine equat. Tradunt eam in pane, offa, obsonione,

drachmæ pondere deuorata, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternisue, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum. Cap. LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cāmoro, alij thelyphonon, alij myoctonon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris

* Ita Plin^{ius}, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: cauli. Græc^{us} lem palmo altum: radice scorpj caudam emulatur, & alabastris modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones ad mota radice, stupentq;: qui rursum hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur. Enecat subaspe pantheras, sues, lupos & feras omnes in carnibus ra. utra obiectum. Est & alterū aconitum, quod aliqui cy autē le- noctonon, alij lycoctonon appellant. Huius generatio po= sunt tria. vnū, quo utuntur uenatores: alia duo in tior, her usum suum uertere medici, è quibus tertium, quod be, si Ponticū nominatur, plurimū in Italia, montibus In quando se stinis exilit: à priore distās, quoniā folia faciat effi se obtu= gie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo lerit a= nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cu spectus bitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis ilicabit. oblongis recondit: radices in modū squilla marina cirrorum nigrescunt. Quibus ad uenationem lu

porum utuntur : insertæ siquidem crudis carnibus,
& deuorata, lupos enecant.

Cicuta.

Cap. LXVII.

Cicuta caulem edit geniculatum, ut sceni-
culi, gradem * foliis ferule, angustiora, * Plin. li.
gravi odoratu: rami, mox umbellæ i sum 25. c. 13
mo prodeunt: flores quoque albi antes: & semen Corian-
aniso candidius: radice non alta, concava. Cicuta le dro aspi-
thale uenenum inest, suaq; u refrigeratoria necat. milauit,
Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimi- cui pro-
tur contusis cacuminibus, triusquam semina & pius sa-
come siccescant: qui sole densatur in pastillos. nè, quã
Multus ad medendi rationem usus est aridi, commo ferule,
de miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia quæ sce-
temperantur: ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, niculi cõ
illita restinguit. Herba cum coma trita, & testis stat fo-
bus circumlita, libidinum imaginationes in somno, lÿs, Ci-
compescit: sed genitale resoluit. lac puerperarum cuta om-
mammis apposita extinguit: in uirginitate mam- nibus ho-
mas coerces, & increfcere non patitur: pueris præ- die com-
stat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, inta- perta, ui-
bescant. Efficacissima uis Cretica, Megarësi, mox detur a s-
Attica, & in Chio & Cilicia nascenti. cedere.

Taxum.

Cap. LXVIII.

SMilax à Grecis, taxus à Latinis appellatur,
arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-
dem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispa-
nie contermina nascent. Auicula quæ Italica ta-

DIOSCORIDIS

xi baccas deuorāt, denigrātur: et qui ederint easdē hoīes, alui proflumio corripitiūtur. Narbōe tā prāsē tis est venēi, vt si qui dormiāt sub ea, aut eius um bra subsideāt, ledātur, et saepenumero moriātur: quare de taxo haec traduntur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. Cap. LXIX.

Apocynum, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis viticulis constans, malō olentibus, lentis, vititiumq; modo obsequiosis, fractus erē inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, ditigi longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

Cap. LXX.

Nerion aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocant. frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala folijs, crassioribusq; flore in rosam conformato: fructu & nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem, radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa: nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus verò cō-

* Amygdale.

tra serpētium morsus praesidia, è vino pota: eo magis ruta addita: imbecillae etiam animantes, vt pectus & caprae, si aquam bibant, in qua folia ea maderint, moriuntur.

Fungi.

Cap. LXXI.

Fungorum differentias duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arborē suae, quae priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales sunt, nescio quod strigmentum concretamque pituitam, terraque eruti, quam celerrime computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & egrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida muria, aut feruesfactae satureiae, aut origani iusculum: debellantur etiam gallinaei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed egrè dissoluntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

Colchicum.

Cap. LXXII.

Cēsetur

Colchicō, aliqui ephemerō, sunt qui agrestem Hermobulbū vocant, autūni exitu florem edit croci, dactylis candicante, ab eo tempore, folia bulbi, sed pinguiora: lūs ossificaulē palmo altum, ferentē rufum semen: radicē cinarū.

DIOSCORIDIS

foris è nigra rufescentem, quæ deliberata, candida
& mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustu
statu dulci inuenitur: bulbus eius mediam habet
rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in
Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungo-
rum more, strangulando enecat. Hanc autem de-
pinximus, ne à quoquã imprudenter pro bulbo de-
uoretur: mirum enim in modum saporis volupta-
te imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quæ sunt
gig: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaque
cum adsuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. Cap. LXXIII.

Fortè no-
stru Li-
liu con-
ualliu.

Ephemerum, aliqui syluestrem irin appellant. fo-
lia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: flo-
rem candidum, amarum. semen molle radicem vnã,
digitali crassitudine, longam, adstringentem, odo-
ratam: nascitur in syluis & opacis. Huius radix
dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in
vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ
nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est muralis herba. Ca. LXXIII.

Offici-
nis Pac-
ietaria

Helxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis
& segetibus: folia ei mercurialis insunt, hir-
suta: cauliculi subrubentes, & circa eos veluti se-
mina aspera, adhaerentia vestibus. Folia refrigerã
di spißandiq; naturam habet, qua ex causa sanant
illitu sacros ignes, adusta, condylomata, panos in-
cipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius

cum cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ ser-
punt, commodè illinitur, imponiturq; podagris cum
hircino adipe aut cerato cyprino: veterem tussim
emēdat instar cyathi haustus: tōsillis inflāmatio-
nem sentientibus vtiliter & gargarizatur, et obli-
nitur: aurium dolorē cum rosaceo instillatus leuat.

Alfine.

Cap. LXXV.

Alsinen, aliqui anthyllion, nonnulli myos ota Vulgò
vocant, quoniam masculorum aures folia mossus
imitantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alsine dicta gallina.
est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humilior es-
set, & folijs minoribus, *nec hirsuta. cū teris *Ex Pli
tur odorem cucumis reddit. ¶ Vini refrigerandi ad nio adie
stringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus cta.
cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus ine-
funditur: quin & emendat omnia quæ helxine, id
est, muralis herba.

Lens palustris.

Cap. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluente, Offici-
muscus lenticula similis, refrigeratoria natu- nis leni
re. Propter quod conuenienter collectionibus, igni cula aq.
sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta:
glutinat & procidentia puerorum interanea.

Semperuium, seu sedum.

Cap. LXXVII.

Semperuium magnum ideò nominatur, quo-
niam perpetuò folia vireant: cuius caules cu-
biti altitudinem implent, interdum excedunt, pin-

DIOSCORIDIS

* Vox addita ex Plinio
 gues, crassitudine pollicari, virentes, characia tithy
 mali modo infecti folia pingua, * carnosae, & ma
 gnitudine pollicari, in cacumine linguae similia, alia
 in terram convexa, alia in capite stantia invicem,
 ita ut ambitu effigiem imitentur oculi: nascitur in
 montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feri-
 tur. Eius vis refrigerare, & adstringere: medentur
 igni sacro, nomis, ulceribus quae serpunt, oculorum
 inflammacionibus, ambustis igni, podagris per se,
 & cum polenta illita folia. Succus capiti, in dolori-
 bus, cum polenta aut rosaceo perfunditur: datur in
 potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, alui
 quae profluvia: teretes tineas potus in vino excutit:
 subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit:
 succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio co-
 ceptis, inungitur. Sempernium paruum in petris,
 parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis na-
 scitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, cre-
 bro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mis-
 cronatis: caule à medio emicante, palmum alto: um-
 bellam herbidosq; flores, & tenues gerente. Folia
 eisdem cum priore viribus praedita sunt. Tertium
 videtur sempernii genus, quam aliqui andrachne
 agriam, aut telephion vocauerunt, Romani illece-
 bram, pusillis, crassioribusq; folijs, hirsutis, por-
 tulaca proximus: nascitur in saxis. Vis ei excalsa-
 Etoria, acris, exulcerans: illita cum axungia stru-
 mas discutit.

Vulgò
 vermicu-
 laris.

Vmbilicus

Vmbilicus Veneris. Cap. LXXVIII.

COtyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formā tornato, in euidenter cōcauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliue modo rotāda. Succus cum vino circulitus, instillatū siue, coniecta genitalia nudat: inflāmationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frāgunt, vrinam cient, hydropicus ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Est & alterū genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis circa radicē, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadē, quae semperuiuum.

Vrtica.

Cap. LXXIX.

DVo vrticæ genera: syluestris, asperio, latioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini, sed minore. Altera non eque aspera, minuto semine. Folia vtriusq; illita, canis morsibus, addito sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sordida vlcera, & quae cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cū cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita: procidē.

DIOSCORIDIS

tes vulvas, recentia contactu resilire cogunt. Seme
 potum ex passo, venerem stimulat, vulvae ora pate
 facit: cum melle delinctum, orthopnoeae, lateris &
 pulmonum inflammationibus prodest: thoracem
 expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur.
 Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, urinas
 mouent, inflationes discutunt: decocta cum ptisa
 na, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euo
 cant, cum myrrha modico pota. Inflammationem
 turgentem vnam gargarizatus succus reprimat.

Galiopsis. Cap. LXXX.

Galiopsis frutex in totum caulem, & folia ha
 bet vrtice, leuiora, & quae grauem odorem
 trita reddant: flore purpurascete, tenui: nascitur
 circa sepes, edificiorum areas, ac semitas vbique.
 Folia, caules, semen, succusq; duritias, & carcino
 mata dissipant: strumas, panos, & parotidas dis
 cutiunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplas
 ma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentia,
 gāgrenas, & nomas, cū sale efficaciter illinuntur.

Galion. Cap. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in contrahen
 do lacte, coaguli vicem impleat: ramulum fo
 liumq; habet aparina simillimum, rectum: florem
 in cacumine luteum, tenuem, dēsum, copiosum, odo
 ratum. Flos igni ambustis illinitur, sanguinis pro
 fluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, in
 solatum usquedum albescat. lassitudines reficit. Ra

dix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

Senecio. Cap. LXXXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, solijs
continuis, eruca modo per extremitates diu
sis, sed minoribus multo: luteis floribus, qui
celeriter disseci vanescunt in pappos. Nomen vero
sibi vindicauit, quoniam flores capillorum ritu, ve
re canescant radice superuacua: nascitur maximè
in macerijs, & circum oppida. Folia cum floribus
refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per se
se, testium & sedis inflammationes sanant: quin
& ex manna thuris medentur, cum reliquis vulne
ribus, tum ijs quæ nerui acceperunt. Illiti per se cū
aceto pappi, idem munus præstant: verum recentes
epoii, strangulant. Totus caulis, si coctus in passo
potui detur, Stomachi dolores à bili contractos, per
sanat.

Thaliætrum Cap. LXXXIII.

Thaliætron folia coriandri habet, pinguiora
paulo: cauliculum rutæ crassitudine, in quo fo
lia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem
perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Marinus muscus. Cap. LXXXIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, te
staceisq; hand procul à mari, gracilis,
capillaceis, caulis expers. Præcipua ei
spissandi vis, & collectiones cohibendi, & poda
gras, quas refrigerare opus sit.

DIOSCORIDIS

Phycus marinus. Cap. LXXXV.

Phyci marini generibus, quoddā latum, & alterum sublongius, & rubens: tertiū candidū, nascens in Creta iuxta terrā, floridū valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratoriā, non podagra morbo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem verū ijs vii humidis conuenit, priusquā exarescant. Nicāder puniceum aduersus serpētes dedit. Hoc fūco quidā putāt mulieres suū calorē mētiri, cū tamē sit radícula eiusdē noīs, qua sese fucant.

Potamogeton. Cap. LXXXVI.

Potamogeton, folium beta simile, hirsutū paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra veterum vlcerum nomas. Nomen ex eo inditū est, quod palustribus, et aquosis enascatur.

Stratiotes. Cap. LXXXVII.

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomen traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere nō sinunt. ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Vulgatū Stratiotes millefolium. Cap. LXXXVIII.

millefolium. **S**tratiotes millefolium exiguus frutex, palmi saltitudine, aut amplius assurgit: folijs auicu-

larum pennas imitantibus, breui admodum disse-
ctoq; foliorum exortu. Folia syluestre cuminum si-
mulant, præsertim breuitate atq; scabritia, bre-
uiora paulò, densiore umbella, & plenior. Surcu-
los in cacumine gerit, exiguos, & capitula inter-
dum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in
asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus
ad vlcera vetera, recentiaq; , profluentem sangui-
nem, & fistulas.

Verbascum. Cap. LXXXIX.

Verbascum differentias summas habet duas. Tapsus
hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœ barba-
mina intelligitur. Fœmina igitur folia sunt bras- tus vulo
fica; pilosiora multò, & latiora, candida: caulis gò.
albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores al-
bi, aut subpallidi: semen nigrum: radix longa, gu-
stu acerba, crassitudine digiti: nascitur in campe-
stribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, * Sic
albis folijs, et angustioribus, tenuiori caule. Sed ni Plin. qui
grum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latio- Zulo' d'm
req; constaret folio. Syluestre folia fert saluie, al- videtur
tas virgas, & * lignosas, & circa eas ramulos, legisse.
quales marrubiū: flores luteos, auri emulos. Sūt et Grecus
phlomidēs due, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. codex
Tertia lychmitis appellatur: ab alijs aut thryallis δεδρα'
folijs ternis, aut quaternis, vel paulò pluribus, hir- das, id ē,
sutis, crassis, pinguibusq; apta ad lucernarū lumi- arbores
na: Radix priorū duarum adstringit: quare quod scentes.

DIOSCORIDIS

magnitudine ludicrum talum aequet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiq; tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasco, cui flos autem, capillos tingit, et quocunq; abijciatur, blatas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata, ulcera, ex vino & melle illinuntur: cū aceto quoq; vulneribus medentur: contra scorpionū ictus, sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aunt in folijs eius, quam feminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

Aetiopis.

Cap.

X C.

A Ethiopis folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaq; in orbem circa radicē imā redacta: caulem quadrangulum, crassum ac scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concavum alis: semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem caespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quae siccae nigrescunt duranturq;, ut cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Troadis, et in Mesenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischia dicis, pleuriticis, arteriae scabritijs, decocta radix, et pota: quin et cū melle, eclegmatis vicem praebet.

Arction.

Cap.

X C I.

A Rction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco folijs, nisi quod hirsutiora,

& rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo radice tenera, alba, luleiq;. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta pernionesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicū dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. Cap. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & hirsutiora, nigriora & crassiora: caulembicantem, quanquam & interdum vidua caule reperiatur: radice grandi, intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pinis nucibus, purulenta & cruenta extusientibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur.

Vulgò
lappa
maior, et
bardana

Petasites.

Cap. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrāde solum, galeri modo amplū, ceu fungus depēdet. Contra phagedenas, et vlcera, quæ cacoethe vocāt, efficaciter illinitur.

Epipactis.

Cap. XCIII.

Epipactis ab alijs helleborine, parua herba, exiguis folijs. locineris vitijs utilis, & contra venena pota.

Capnos, seu fumaria.

Cap. XCV.

Officinis

Fumaria fruticosa herbula est, prætenera, co-
friandri similis: folijs candidioribus, vni-
sumus
que terra.

DIOSCORIDIS

numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemq; unde nomē traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biosam urinam trahit.

Lotus urbana. Cap. XCVI.

Lotū urbanam alij trifolium vocāt: nascitur i hortis. Extractus succus, addito melle, oculo rū argema, nubeculas, cæterasq; caligines discutit.

Syluestris lotus. Cap. XCVII.

Syluestris lotus, quā trifolium minus appellat, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis. semine fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter alstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cū mallue semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus. Cap. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargēs cubitales, sæpe maiores in quibus folia fœnigræci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucā olent, gustataq; cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, sicut cū pane trita illinantur. Decoctū potu urinā ciet. Nomulli, quod apes alliciat, prope aluearia serūt.

Est & in Aegypto lotus, quae in campis fluminis inundatis provenit, caule fabae: flore paruo, candido, * lilio simili, quem tradunt occidente sole * ^{αεινω,} comprimi occludiq; ad ortum autem aperiri: ad ^{αριστην.} nondum duntq; caput ipsum vespere aquis cōdi, et ad exortum Solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milij, quae Aegyptij excant, & in panes cogūt. Radicem lotos haec habet, mali cotonei similitudine, quae cruda cocta q; manditur: decocta q; lutei oui qualitatem exhibet.

ANNOTATIO.

Aliud est à nostro Millefolio, quod paulò ante stratiotem millefoliū esse monuimus.

Millefolium. Cap. C.

MYriophyllon, siue millefoliū, caulis est tener, singularis, vnica nixus radice: plurimis folijs, leuibus, sceniculo similibus: unde nomen accepit. Caulis flauescit, varius, ac veluti ex industria delimatus: nascitur in palustribus. Vulnere recensitia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum ex aceto oblinatur: praecipitatis in potu cum aqua & sale datur.

Myrrhis. Cap. CI.

MYrrhis, simillima est cicuta, caule folijsq; radice ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis. Quae pota in vino, phalangiorum

DIOSCORIDIS

moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundus purgatque: à puerperio feminas: subuenit & phthisi cum cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis terue die potam ex vino in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Myagrum.

Cap. CII.

MYagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea, folijs rubia, pallidis, tripedanea: semen oleosum, * scenograeco simile. Quod coctusum igni torrent, perunctusque virgis ad lucernarum lumina utuntur: hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

* τήλιδι
non τρε
χήλω.

Onagra.

Cap. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maderit, in potu data feras mitigat, et cicures facit: illitu quoque tetra ulcera mulcer.

Cirsium.

Cap. CIIII.

Cēsetur Cirsium, caulis est tener, duorum cubitorum, Buglossa triangulo similis. ab imo foliola, rose specie officinae referentia, anguli spinosi, per internalla molles: forum. lia buglossa similia; * maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen nora. caulis orbiculatū, hispidum, in quo capitula in summo purpurea, quæ soluantur in lanugines. Radicē

huius loco laboranti ad alligatam, dolores vari-
cum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis.

Cap. C V.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in
cacumine habens purpureum, luteumue, per
ambitum, anthemidis capituli modo diuisum, fo-
liolis stelle modo radiatis: quæ autem caulem cir-
cundant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruenti sto-
macho, oculorum inflammationibus, procidua se-
di, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpu-
reum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pue-
ris comitiale malum sentientibus, opitulari. Ingui-
num inflammationi recentem illinire conuenit. Si
aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, &
inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum.

Cap. C VI.

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinem vo-
cant, quoniam folium, quod est aniso simile, in
pampinos torquetur: capitula sunt in summo cau-
le tenuia, plena seminis, melanthij gustum imitan-
tis. Contra tussim, & cetera pectoris vitia, semẽ
ex aqua mulsa bibitur: hepaticis, & sanguinem
excreantibus vtile.

Viola purpurea.

Cap. C VII.

Viola purpurea folium habet hedera minus,
tenuis ac nigrius, nec multò dissimile: cauli-
culus à radice medius prodit, in quo flosculus

DIOSCORIDIS

suauissimè olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sedi q; proeidenti.

Cacalia. Cap. CVIII.

Cacalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut mäducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita, & cum cerâ to illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium.

Cap. CIX.

Bunium caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatët: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus, Vrinam ciet, excalfacit, secundas euocat: lieni, vesicæ, renibus utile. Tam humidi quàm sicci, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq;, vsus inualuit: ex aqua mulsa. Pseudobunium palmi altitudine fructu cat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acri gustus. Tormina, atq; stranguriâ, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua illiti quoq; cum sale & uino, tepentes, strumas discutiant.

Chamæcissus. Cap. CX.

Chamæcissos, folio est hedera, tenuiore, longior
 re, ramulis à radice quinis senisue, dodrantali Non est,
 bus, foliosis: flore violæ alba simili, candidiore, ac te quanuis
 nuiore, gustu supra modum amaro: radicetenui, cadi id sonet
 da, inutili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissi Græcani
 me ischiadici folia, tribus obolis i aqua cyathis tri ca dictio
 bus, tricenis quadragenisue diebus: eodẽ pota mo= hedera
 do, senis aut septenis diebus, regium morbum purgat. terrestris

Chamæleuce. Cap. CXI. uulgo no

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est, minata:
 herba vires, incuruis folijs, surculisq;: flo= quod eã
 re rosaceo. paulo

Buglossum, seu lingua bubula. studio aCap. CXII. sius cum

Bvglossum nascitur in campestribus, & sabus descri=
 blis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ ptione cõ
 treis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, ferens, li
 potamq;: contra tertianos horrores prodesse: quæ quidõ co
 quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur, her= gnosces.
 bam abscessibus vtilem esse volunt. Verbasco simi Vulgaris
 le est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, Borago.
 bubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectum,
 animi voluptates auget.

A N N O T A T I O.

Nostrium Cynoglossum caulem & purpureos flosculos edens, non esse verum ac legitimum, historia eius apertissimè indicat.

DIOSCORIDIS

Cynoglossum. Cap. CXIII.

Cynoglosson folia latifoliae plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, et humi sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cū suillo adipe veteri, medentur moribus canum, alopecij, & ambustis. Emollit alium, decoctum herba ex vino potum.

Phyteuma. Cap. CXIII.

* S. tra-
shij.

Phyteuma folia habet * radicle, minora: copiosum semen, perforatum, radicem parua, tenuem, per summa terrae nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium. Cap. CXV.

Leontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum, quaternumue digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lanuosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri semen usque adeo spissum lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: radice parua cohaeret: quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. Cap. CXVI.

Hippoglosson, frutex est folia habens ruscigenae figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas e folijs excurrentes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmati radix succus admiscetur.

Antirrhinum, alij anarrhizon vocant, herbā caule & folijs anagallidi similē: flore albæ violæ purpureo, minore tamē, ideoq; syluestris lychnis nominata est: semine vituli narium simili. Tradunt perunctos ea, cū oleo lilino, venustiores fieri: nec vllō medicamento lēdi posse, si quis appensum gestet. **Catanance. Cap. CXVIII.**

EX eo genere vna folia coronopi habet, longa, radicē iunci modo prætenuem: capitula sena, septenāue, in quibus erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parui magnitudinē explet, radice exiguae oliuæ magnitudine: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, vt cicer, minutum, in virgulis dependet, puniceo coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thessalica mulieres his vti traduntur.

Tripolion.

Cap. CXIX.

Tripolion ī marinis nascitur locis, q̄ allidit vnda, recedēs q; dimittit, neq; in mari, neq; in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradūt, flores colorā ter die mutāt, mane cādidi, meridie purpurei, sero punicei cōspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquā, vrinamq; per aluū extrahit. In medicamēta digeritur, q̄ venena arcet

Officinarū Capillus Veneris . Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxi. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscus obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiantum, cōparatum, album potius, quā nigrum, appareat.

Adiantum. Cap. CXX.

A Dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, pratenues, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neq; fructū, neq; florem profert. Decoctū herbe potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinae difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet, et menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit fursures, et manātia capitis vlcera, ex lixiuio emēdat: defluentes capillos continet, cū ladano & myrtino, & sinino, aut hyssopo, vinoq;. Decoctum eius cū lixiuio & vino in fusum, idem praestat. coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additū. Seritur gratia vtilitatis pecorū circa ouilia. Vmbrosus,

brofis, & palustribus, circa parietum aspergines,
& frontium specus enascitur.

Trihce manes. Cap. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus
Adianton filici simile, sed exilius: folijs lenti- Offici-
cula, tenuibus, in ordinem vtrinque digestis, aduer- nis poly-
sis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore trichon
splendentibus. Eadem quæ & Adianton præstare quod idē
posse constat. tamē cū

Xanthium, siue Lappa. Cap. CXXII. Adianto

Xanthium nascitur lato & pingui solo, &
lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, Vulgò
pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atripli lappa mi-
cis habet, infecta, nasturtium odore imitantia: fru- nor.

Etñ grandis oliuæ modo, rotundum, & vt platani
pilula, spinosum, qui cōtactu uestibus adhærescit.
Is ante collectus quàm perfecte siccescat, tūdatur,
& fictili vase recōditur. Flauos aut facit capillos,
si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox ca-
put nitro antè perfriētum, illinatur. Alij in vino
tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumo-
ribus imponitur.

Aegilops, siue festuca. Cap. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed mol-
liora, in summo capite semina bina ternæue,
rubra, quibus arista quasi capillacea exeunt. Allita Marcel-
cū farina herba ægilopis medetur, duritias discus- lo suppo-
tit. Succus farina admixtus, siccatur, & eorundē sititia.

DIOSCORIDIS

gratia reponitur. Bromus herba agilopi similis, exiccatoriam vim habēs, decoquitur cū sua radice in aqua ad tertias, et iuri colato par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteū eo humore imbutū, & naribus inditū, contra graueolentiam vlcerū efficax est. Aliqui tritam aloen addunt, et eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauē oris balitū emēdat.

Glaux. Cap. CXXIIII.

Glaux cytiso aut lenticulae folijs similis, quae superne virent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exiliūt quini senīue, tenues ab radice, dodrantem alti: flores violae albae, purpurei exeunt, minores tamē: nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Polygala. Cap. CXXV.

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticula, gustu adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. Cap. CXXVI.

OSyris, frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia, quaternaria, quina, senaue, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arguatos.

Cēsetur
Linaria
vulgò ap
pellata.

SAspera smilax. Cap. CXXVII.
Milax aspera, folia habet periclymeni: sarmen

ta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata: arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordet. Nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia et acini, & ante & post epoti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritū propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiā ad alexi pharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcetur.

Læuis smilax. Cap. CXXVIII.

Læuis smilacis folia hederae similitudinem habent, molliora, leuiora, tenuiora huius sarmenta nullis horrent spinis: conuoluitur aboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circunquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam factitantur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus. Cap. CXXIX.

Sylvestris myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: officium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronis Brunnatum: baccae per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes: osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo

DIOSCORIDIS

lenti, fractu cōtumaces, foliosi: radice graminis simili, acerbā, & subamara. Folia et baccae in vino pota vrinā cient, mēses pellunt, vesicæ calculus frangunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanāt, & regiū morbū. In asperis et præcipitibus locis enascitur. Decoctū radice in vino potū, eosdem præbet effectus. Cauliculi recētes, asparagorū vice, in cibo sumūtur. Amari aut sunt, sed vrinā mouēt.

Laurus Alexandrina. Cap. CXXX.

Laurus Alexandrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodrā tales, interdum longiores: radice * syluestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio vrinæ auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. Cap. CXXXI.

Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modū viscosus ramos vestit: folia lauri graciliora, et molliora, fractu cōtumacia, quorū gustatu os & fauces incendūtur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitus extrahit foetum recens vel aridum in potu, menses cient & vomitus. caput inanit commanducatū, sternut amēta mouet. Baccae quindecim pota aluum resoluunt.

Vulgò
Laureo =
la.

Chamædaphne. Cap. CXXXII.

Chamædaphne virgas emittit cubitales, singu-
lari ramulo constantes, rectas, tenues, leues fo-
lia lauri similitudine, leuiora multò, ac viridiora :
semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinütur
capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores
mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur.
Potus cum vino succus, menses & vrinam ciet: idẽ
facit pesso appositus.

Veratrum album. Cap. CXXXIII.

Helleborum album, Latini veratrum albũ vo-
cant, fert folia plantaginis aut betæ sylue-
stris similia, sed breuiora, & nigriora, * rubescen * Plin.
tia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolu canaliũ
rum, quas abdicat cũ arefcere incipit: radicibus ni dorso r
titur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capi bescẽtia.
te caparũ modo exeuntibus: nascitur in montibus
& asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum
habetur candidũ, friabile, carnosum, modicẽ exten-
tum, nec tamen iunci modo mucronatũ, quod fran-
genlo puluerẽ emittit, & tenuem habet medullã,
gustu non admodũ feruens, neq; salinam subinde
ciens, (huiusmodi aut strangulat.) Primatũ Cy-
renaicum tenet. Galaticum aut & Cappadociũ,
candidiora, et puluere quodam obsita, celerius strã-
gulatus mouët. Vomitione aut varios extrahit hu-
mores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculo-
rum discutiunt. Partus impositum necat, menses

pellit, sternutamenta excitat, mures interficit cum melle & polenta subactum, absumit carnes si coquatur vna. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cū aqua mulsā, aut pulte, aut quauis alia sorbitio ne. Cogitur cū pane, & ita inassatur. Preparatio corporū, ac victus ratio, diligēter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarūt, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assectimur, quippe longū nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi ratio nem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus stragulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones cōcitant subditæ ex eo bala ni, cum aceto.

Veratrum nigrum. Cap. CXXXIIII.

Helleborum nigrū, appellatur melampodium, quoniā caprarum pastor, nomine Melāpus, furētes in se. Prætidās, primus purgasse, & sanasse, fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen cnici, quod

in Anticyra sesamoides vocant: quo deiectiones moluntur: radicibus cohaeret nigris, tenuibus, à capitulo capæ simili confibratis. quarū est vsus: in collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimū est, quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrū inibi probatissimū gignitur. Eligi debet corpulentum et plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, seruēs q̃: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natū: attamen Heliconium praecellit. Veratrū nigrum purgat vētrem, detrahit bilem pituitasq̃; datum per se, aut cum scammonia, et tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente & insculis, quæ purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insipientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit, partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. Itē contra gravitatem auditus in aurem demittitur, ibiq̃; in alterum aut esiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pisce, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat erodentibus medicamentis cōmiscetur: hydropicorum vētri vtilissimē imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: confectum proximē radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrantur: quare inter fodiendū stantes, Apollinem,

DIOSCORIDIS

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquila volatus: aduolare enim non sine periculo tradūt: namq; si avis effosionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, auguriū est. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter, ad id arcendum, fossuri allium praesumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxae opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. Cap. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborū vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut ruta: lōgo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cetera sesame simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitaq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorū cacumine capitula, florū penē purpureorum, medio eorum albo: semen sesame, fuluum, amarum. radix tenuis. Detrahit bilē pituitasq; semen ex aqua mulsa potū dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nas citur in asperis.

Syluestris cucumer. Cap. XXXVI.

Vulgò
Cucu =
mer asi =
ninus.

Cucumis syluestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longē minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atq; sarmenta

satiui refert: radice candida, magna: nascitur in sa-
buletis, & ruderibus frutice in totum amaro. In-
stillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit.
Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem
discutit: imposita cū resina terebinthina, tubercu-
la rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discus-
tit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes
in dolore colluuntur. Aride farinae imperiginem, le-
pras & vitiligines absterget: nigris cicatricibus
colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Ra-
dicis succus sequioboli pondere, & item cortex, ace-
tabuli quarta parte, bilem pituitamq; deiciunt, præ-
sertim in hydropicis: (deiectiones aut citra stomas-
chi iniuriam mouet) radice selibra, in vini præse-
tim Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo ter-
ni cyathi triduo, dum tumor abundè deprimi cæ-
natur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamen-
tum, quod elaterium vocatur, ad hunc modum: De-
cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruā
tur nocte vna: postridie imposito supra craterem
variore cribro, utrisq; manibus prehensi, sigillatim
supino cultro, sursum versus aciem habēte, findun-
tur, atq; per cribrum humor in subiectum vas ex-
primitur: simulq; carnosum quod hæsit cribro, quò
facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, resi-
dere finitur, atque in uicinam peluim demittitur.
Coacervata autem in cribro segmina, dulci aqua
perfunduntur, & denudò pressa abijciuntur. Hu-

Elateriū

DIOSCORIDIS

mor in pelui agitur, & linteo, opertus Soli expo-
 nitur: dumq; steterit, tota supernatans aqua cū hu-
 more concreto, effunditur. Hoc vero identidē fieri so-
 let, donec existēs aqua lique scat: qua stillatim ex-
 hausta, sedimentum mortario suscipitur, & conte-
 rendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam
 protinus succi abundantia, cribratos cineres humi-
 inspargant, & medium cauantes, triplicatum lino-
 teum obtendant, per quod elateriū cum sua humi-
 ditate diffundunt, siccaturq; in pila, vt dictū est,
 conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam persun-
 dentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionē, mul-
 sam aquam respergunt. Elateriū optimū esse cō-
 stat, leue, non ponderosum, cum candore leniter hu-
 mectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum
 luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum ta-
 men scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui
 cinerisq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet.
 Nec desunt, qui cucumis succo amyli immisceant,
 vt candorem ipsum & leuitatem imitentur. A bi-
 matu ad decennium deiectionibus utile est. Integer
 modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chal-
 ci duo: si quidem copiosius, periculum adfert. Bilem
 ac pituitam vtriusque parte extrahit. Optima suspi-
 riosis est purgatio. Quod si in animo sit deiectionē
 moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare
 sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia da-
 to, postea cyathus vnus aque tepida sorbeatur: ad

20. p. 1.
 20. p. 1.

20. p. 1.

ritandas tamen vomitiones aqua diluens elateriū,
 subiectas linguae partes penitissimè penna oblini-
 to: quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut
 vnguento irmo resoluito, somnū inhibeto. Porro his
 qui eximie vacuantur, continue vinum, & oleum
 dari conuenit: etenim vomendo restituantur. Quòd
 si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta,
 posca, poma, & quae stomachum desando corrobo-
 rant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, et par-
 tus enecat, in pessa subditū: morbo regio medetur,
 cum lacte naribus insusum, et diuturnus capitis do-
 loribus liberat: efficacissimè anginis illinitur, cum
 vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. Cap. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia ha-
 bet labrusca, diuisa: & cauliculos rectos, mol-
 les, nigrosq: fert florem glasti, et folliculos virides,
 similes ciceri, & in his nucleum triangulum, sca-
 brum, ex nigro subfuluescentem, intus album, qu-
 stu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mul-
 sa dentur, crassum humorem per vomitum pur-
 gant: sed qui hauserunt, ambulare debent: pruden-
 ter tamen attendere oportet, & aquam mulsam
 continuo potui dare: quoniā pericula strangulatio-
 nis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo
 illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris.
 Cit plurimam pituitam commanducata. decocta
 in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuinit: rheu-

DIOSCORIDIS

matissimum gingiuarum sistit: vlcera oris manantia, cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Tapfia.

Cap. CXXXVIII.

Thapsia nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis Insula primum inuenta sit. Tota vero natura ferula similis est: graciliore caule: folijs fœniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale ferula, latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: factò in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excanata, cooperitur, quò merus succus confluat: oportet illuc sequenti die se cõferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallũ expressus fictili crasso insolatur. Aliqui foliũ vnã terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc aut̃ interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs aut̃ extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet nō obuersus uento: aut potius, cū dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustula: ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illiunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radices,

quàm succus, purgandi vim habet, & lacteus succus in aqua malsa potus: nam vtrinq; bilem exirahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus unus: quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiciosi, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tã radix, quàm succus omnium maxime, quæ pares cum eis vires adepta sunt, vim habent extractoriã ex alto, ubi ex imo aliquid euocandũ est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affricu, alopecias explèt. Radix succusq; cum equis ceræ thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt: sed nõ plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitia cutis in facie emendat, cũ melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discentit, perimetus cũ sulphure. In diuturnis pulmonũ, laterũ, pedũ, articulorũq; uoletudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendã colic glandem, ijs qui natura, non circuncisione, curti sunt: tumorẽ enim excitat, qui pinguiũ sotu emollitus, præputij iacturã resarsit.

A N N O T A T I O.

* Sine folijs, & Spartiũ, vt in agro Monfessulano eius feracissimo sæpe obseruaui (à G. Rondelletio eius loci clarissimo Medico primũ admonitus) cùm primum

DIOSCORIDIS

erumpit, plurimis foliolis turget, quibus omnibus cum ad consistentiam peruenit (quo solo fortassis tpe visum Dioscoridi) exuitur, adeo vt ramuli eius iucei deinde appareant. Est tamen hoc diuersum plane ab eo, cuius Plinius lib. xix. cap. 11. meminit. Cæterum an spartium hoc loco depictum, sit idem cum genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quæ eorum iudicio subscribere, qui diuersi generis plantas esse contendunt: & pro genista fruticem quendam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis, cum lentam appellet, satis innuit) parum idoneum ostendant.

Spartium. Cap. CXXXIX.

Spartion frutex est: longas ferens virgas, & sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vites vincuntur: semen lenticule, in folliculis phasiolorio modo nascentis florem, vt albæ violæ, luteum. Purgant per superna uehementer, hellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinque obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiunii bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

Silybum. Cap. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recēs cum sale oleq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pōdere potus, vomitiones ciet.

Glans vnguentaria. Cap. CXLI.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myrica similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus græcarum nukum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa unguenta pro oleo vtantur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæā. Præfertur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ pondere posita, lienem absomit: cum lolij farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varos & papulas in facie, et cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potus ciet. Cortex eius magis adstringit: verum tusa & expressæ succus abstergentibus medicamentis adiucitur, quæ aduersus pruriges & scabritias idonea sunt.

Narcissus. Cap. CXLII.

Narcissum sunt qui ut lilium, lirim appellauerint, folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis uacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

DIOSCORIDIS

crocus, in quibusdā *purpureus* : *radix* intus *alba*,
rotunda, *bulbosa* : *semen* uelut in *tunica*, *nigrum*, *lō*
gum : *probatissimus* nascitur in *mōtib*us, *suau*i *odo*
re : *cateri* *porrum* *imitatur*, atq; *herbaceum* *uiru*s
olent. *Radix* *cocta*, *siue* *estur*, *siue* *bibitur*, *uomito*•
ria *est* : *ambustis* *igni* *prodest*, *cum* *exiguo* *melle* *tri*
ta : *precisos* *nervos* *illitu* *glutinat* : *luxatis* *malleo*•
lis, *diuturnisq;* *articulorum* *doloribus*, *trita* *ex* *mel*
le & *imposita*, *subuenit* : *uitia* *cutis* *in* *facie*, *uitili*•
ginesq; *cum* *semine* *urtice*, & *aceto* *emaculat* : *cū*
eruo & *melle*, *ulcerum* *sordes* *expurgat* : *abscessus*
rumpit *cōcoctioni* *repugnantes* : *infixa* *corpori* *ex*•
trahit, *illita* *cum* *lolij* *farina*, & *melle*.

Hippophaes. Cap. CXLIII.

Hippophaes, quo *fullones* *uestes* *interpolant*,
in *sabulosis*, *maritimisq;* *nascitur*, *surculac*•
ceo *frutice*, *undique* *denso* & *largo*, *folijs* *oleæ*, *longi*•
gioribus, *mollioribusq;* : *inter* *quæ* *candicantes* *spic*•
ina *emicant*, *siccæ*, *angulosæ*, *interstitio* *quodam* *dis*•
stantes : *flores* *hederæ* *corymbis* *similes*, *racematim*
coherent, *minusculi* *tamen*, & *molles*, *candidi*, *ex*
parte *rubescents* : *radix* *lacte*o *succo* *madet*, *cras*•
sa, *mollis*, *amara* *gustanti* : *ex* *qua* *perinde* *ac* *thapsia*,
succus *eximitur*, *qui* *per* *se*, & *cum* *erui* *farina*
subactus, *siccatur*, & *ad* *usum* *reconditur*. *Syn*•
cerus, *pituitas*, *bilem*, *aquasq;* *detrahit*, *oboli* *ponde*
re : *erui* *uero* *farina* *subactus*, *quatuor* *obolis*, *cum*
aqua *mulsa*. *Frutex* *cum* *radicibus* *siccatur* *condi*•
tur,

tur, & cum aque mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentū depromitur, uti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. Cap. CXLIII.

Hippophæston, id, quod aliqui hippophæes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophæes, estq; spinæ sullōia genus, huiusmodi herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsæ, aquā pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorū vitijs, & orthopnœe conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus.

Cap. CXLV.

Clci, aut croton, nomen accepit à ricini animæ similitudine: arbor provenit parvæ ficus altitudine, folio platani, maiore, læviore, & nigriore: ramis, caudicibusq; canis, in arundinis morem: semine in vis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal repræsentat: ex quo oleū, nomine cicinum, exprimitur, cibis fœdū, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt: vomitionesq; movent, sed iniucunda admodū est, & molesta purgatio: siquidē stomachum vehementer subvertit. Tusa & imposta, vitia cutis in facie,

Vulgo
Catapuz
tia ma-
ior.

varosq; expurgat: Folia cū polenta trita, Inflammationes oculorū, tumoresq; leniūt: rigētes māmās cohibēt. eadē ex aceto illita, ignes sacros restringūt.

Tithymali. Cap. CXLVI.

Tithymali genera septem, quorum masculus, characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter, myrtites, qui fœmina existimatur, eumq; myrsinitem aut caryiten vocant: tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helioscopius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides: septimus, platyphyllos dicitur. Characiæ caules supra cibiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atq; acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustioribus, et longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur: nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat: trahit pituitam bilemq; hînis obolis in posca sumptis: & cum aqua mulsa, vomitiones mouet. Appetente vindemiæ tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quater nasue guttas instillant, vt cum his inarescāt: quas ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, et in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac neq; quò ventus aspiret, stare quenquam, neq;

manus oculis admoouere cōuenit: sed antequam col-
ligas, corpus praesertim faciem, collum, scrotumq;
genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fan-
tes autem exasperat: quapropter catapotia, cera
aut decocto melle oblini par est, & hoc modo da-
ri: binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia,
sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, permictos in
sole capillos euellit, renascentesq; flauos, & exiles
efficit: deniq; omnes perimit. Dentium caernis in-
clusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne
suo delapsu, fauces & linguam vitiet. Tollit illius
impetigines, formicantes verrucas, pensiles, et quae
thymi florem representant. Valet aduersus ptery-
gia, carbunculos, phageduenas vlcerum, gangrae-
nas, fistulasque. Legitur semen autumnio, & sic-
catum sole leuiter tunditur, feruesactumque loco
inundo reponitur. Folia item siccantur. Semen
& folia lactei succi effectum praebent, dimilio
acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum
lacte lepilio, & caseo contuso. Radix drachmae
pondere in hydromelite pota, per inferna trahit.
Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, col-
luto ore. Foemina, quam myrsiniten, aut caryiten
vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: folijs
myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis,
& purgentibus: ramulos ab radice mittit dodran-
tales: fructum fert alternis annis, nuci similem,
mordaci gustu: nascitur & haec in asperis. Suc-

cus, radix, semen, folia, consimilem antedicto fort
tiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones
inualidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur
paralios, quem tithymalida, aut mecona aliqui ap
pellauere. Nascitur in maritimus, ramis subrubetis
bus, palmum altis, quinis senisue à radice exeuntia
bus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus
quosdā digestis: capite in cacumine orbiculato, in
quo semen, vt eruum, vario colore emicat: flos al
bus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget.
Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur,
folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusq;: ra
mulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinq;
rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis
copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitu
lis incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniā comas
cum sole circumagat. circa oppida nascitur, potissi
mum in ruderibus. Colligitur succus semenq; , vt
aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamē
vsque adeo valide. Ciparissias in caulem exit do
drantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia
piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, &
tenuiora: & in totum nascentem piceam emulas
tur, vnde nomen traxit. Candido succo madet, cui
eadem vis quæ superioribus. In petris nascent, den
droides cognominatur, ampliter opacat, in cacumi
ne frōdosam spargens comā, succo lacteo prægnās
cauliculis rubetibus: folijs myrti tenuioris: fructu

charac'ie. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo recoditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aqua inspersus. Reliqua tithymalorum genera, quae supra scribuntur, idem efficiunt.

Pityusa. Cap. CXLVII.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, eisi tithymalorum generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, gemiculatus: folijs picea, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine instar lenticulae lato: radice crassa, cãdida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic praegrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsã: item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur: modus foliorum drachmae tres.

Lathyris. Cap. CXLVIII.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine ala, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & laxiora: quae autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiae, aut oblongae hederae figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparim, in quo gra-

Offici-
nis Ca-
taputia
minor.

DIOSCORIDIS

na intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in cata potio, aut cū ficis, aut palmulis deuorata, aluū purgāt: sed aqua frigida postea sorbēda: trahūt autē bilē, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectū præbet. Cū gallinaceo aut oleribus folia decoquuntur ad eosdem effectus.

Peplus.

Cap. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rute, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet. supernuacua, ex qua fruticat: nascitur inter vires, & in hortis. Colligitur messibus: siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus tusus, & feruesfactus reconditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho potio: obsonijs inspersa conturbat aluum. muria conditur.

Peplis.

Cap. CL.

Peplis, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maxime nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo, feruens

te gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Collig
gi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri so
let. Easdem habet vires.

Chamæsyce.

Cap. CLI.

Chamæsyce aliqui syce nomināt. Ramos emit
tit quaternum digitorum, teretes, succosos, in
terram deiectos: folia lentis, parua, peplum, planè
referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur. se
mine sub folijs rotundo, ut in peplo: neque caulem,
neque florem promit: radice firmatur tenui, super
uacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedāt, in
pesso appositi, tollūt tumores ac verrucas omniū ge
nerū illiti: decoctorū cibo, aluus resolvitur. Succus si
mili effectu prodest: illitus contra scorpionis icctū
auxiliatur: aduersus caligines oculorū utilis, et he
betudines, incipiētes suffusiones, nubeculas, cicatrices
cū melle inunctus. In squallidis petrosissq; nascitur.

Scammonia.

Cap. CLII.

Scāmōnia, ramos ab vna radice emittit trium
scubitōrū, multos, pingues, & qui nonnihil cras
situdinis præ se ferant: folijs helxine, aut hede
raceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangu
lis, flore candido, rotundo, in calathi modum ca
uo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cu
bitali, candida, grani odore, succo grauida. Legi
tur adhuc modum succus. Capite exempto radix
in testudinis speciem cultro excauatur, quo fit ut
in cauum confluat succus, qui conchis demum ex

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu for-
 diunt, in quos subiectis inglandium folijs, profun-
 dunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autē
 scāmonium laue, nitidum, rarum, & colore quā-
 simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fi-
 stulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur.
 Nec attendere solum par est, si lingue tactu albes-
 scat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit
 tithymali lacte) sed longe magis antea narratis.
 Item si non vehementer linguam exurat, id quod
 misti tithymali argumentum est. Natione autem
 Syriacum & Iudaicum deterrima habentur, gra-
 uia, densa, erui farina & tithymalo vitata. Suc-
 cus drachmæ vnius aut quaternum obolorum pon-
 dere haustus, ex aqua pura vel mulsā, per inferna-
 bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendā aluū
 binos obolos cum sesama, alioque semine, sumpsisse
 satis est. Dantur efficacioris purgationis causa,
 succi tres oboli, cum duobus veratri nigri & aloes
 drachma vna. Fiunt purgatorij sales, drachmis vi-
 ginti succi scāmonia, i senos salis cyathos adiectis.
 Horū modus proportionē virium: integer quidem,
 tria cochlearia: medius, duo: minimus, vnu. Radicis
 drachma vna aut altera purgat, cū ijs quæ retuli-
 mus. Nonnulli decoctū radicis ebibunt. Coquitur in
 aceto, & cū hordeacea farina teritur, cataplasma-
 te ischiadicis vtili Partus enecat succus, vuluæ i la-
 na subditus: tubercula discutit cū melle aut oleo illi

tus: decocto i aceto peructa lepra abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto et rosaceo perfunduntur.

Chamælea. Cap. CLIII.

Chamælea surculosa fruticat, ramis do- Offici-
dratalibus: folia oleæ similitudinē habet, nis Me-
tenuiora & amara, quæ gustata linguā xereon,
mordent: & arteriā deradunt. Detrahut pituitam Arab
bilemq; , folijs præsertim in catapotio deuoratis : more.
nanque duæ absynthij partes, adiecta chamæleæ
vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia co-
guntur: ea autē in ventre non liquescunt: siquidē
quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cū mel-
letritis sordida ulcera & crustosa repurgantur.

Thymælea. Cap. CLIIII.

Thymælea est, qua granum gnidium, quod est Granū
semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apolinum Gnidiū.
vocant, quoniam satui lini frutex suapte natu-
ra similitudinem referat. Virgas edit per pulchras,
multas, tenues, binum cubitorum altitudine: folijs
chamæleæ, angustioribus, & pinguioribus, vi-
scosis, gummosisq; , si mordantur: flore candi-
do: fructu myrti in modum rotundo, qui inter ini-
tia virescit, & tandem rubescit: inuolucrum fru-
ctus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per
inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahut, si vi-
ginti granorum pars interna bibatur: verūm san-
ces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in
muc acino dari debet, aut melle cocto obductū deno-

DIOSCORIDIS

rari. Qui a grè desudant, trito semine cum nitro et aceto, iunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in vmbra recondi. Quibus dare libeat, antea tunde re, & nervos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo, cum diluta vini potione, aquam extrahit: m. diocrius purgat, addita lente cocta, aut cōtritīs oleribus. Thymeleæ farina vna acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba Stomacho ī festa, partus imposita necat. Nas citur in montibus & asperis. Hallucinantur, qui coccon gnidium fructum esse chameleæ existimant, decepti quadā foliorum similitudine.

Sambucus.

Cap. CLV.

S Ambuci duo genera: vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia inglādis: terna, quaternāue, ex interuallis circa ramos exeunt, graua odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculisq; circinata vmbelle, quæ florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterum genus, chameæactē vocatur, Romanis ebullū, longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu serrat

ris: muscario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque vis, & vsus exiccans, aluo detrahens aqua, Stomacho inutilis. Folia, olerum more coquantur, ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat: prodest viperarum morfibz, eodem pota modo: vulvas emollit insidentium decocto, patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere: demigrant capillos illiti, Folia, si præternera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis & canis morfibz illitu prosunt: vlcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant: ijs, qui podadra tentantur, cum senu taurino aut hircino prosunt illita folia.

Pygnocomum. Cap. CLVI.

PYgnocomon constat erucae folijs, acrioribus, scabris & crassis, caule quadrangulo: flore ocymi: semine marrubij: radices nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terrâ redolente: inuenitur in saxosis locis. Semen grauiasomnia, & tumultuosa facit, drachmæ instar potum: tumores discutit, illicum cum polenta, & spicula, adactosque corpori aculeos, extrahit. Folia illita tubercula, panosque discutiunt. Radix eius in aqua malsa duum drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem extrahit.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamē & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastulæ regie, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda: intus habet corpus cædidum, extrà cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, et agitata aqua, quod supernatat pēna selectū, exiccatur. Purgat utraq; parte is succus, sesquibolo potus.

Colocynthis. Cap. CLVIII.

Coloqui
rida offi
cinis,

Colocynthis sarmenta foliaq; satiuū cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pile conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsæ, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arescētæ pile teruntur, & infusæ clysteribus prosunt nervorum resolutioni, coxendicū doloribus, & colicis vitijs, ut quæ bilem, pituitam & strigmēta, inter lūm etiam cruorem eliciant: fietus admota enecant: dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cum aceto et nitro inferuescat,

hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua mul-
sa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo
refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta
alui detrahet: stomacho supra modū aduersatur.
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.
Virentis succo utilissimè schiadicī perfricantur.

Epithymum. Cap. CLIX.

Epithymon, flos est è thymo duriore, saturēia
similis: capitula habet tenuia, & leuia, & in Aliud à
eis caudiculas, quasi capillamēta. Potum cum mē nostro
le detrahit pituitam bilem q; atram, per inferna. Epithy-
Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, aceta mo.
buli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle,
sale, et aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia et
Pamphylia gignitur.

Alypum. Cap. CLX.

Alypon, surculosa herba est, subrubra: gracili-
bus ramulis: tenuibus folijs, flore molli, le-
ui, & copioso. radice betae, tenui: reserta acris suc-
co, semine epithymi. gignitur in maritimis, maxi-
me Libye, quā largissima: quanquā alibi quoq;
plurima prouenit. Semen atrā bilem deijcit, si mē-
sura epithymo pari cum sale & aceto sumatur:
verū interanea leniter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga. Cap. CLXI.

Empetrō aliqui *phacoides vocāt, nascitur * Gale-
in mōtib, & maritimis, salso gustu, sed nus pra-
quò propius terrēo fuerit, amarius sētitur. foides.

DIOSCORIDIS

Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in
iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris. Cap. CLXII.

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo praelon-
ga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, fo-
lijs hortensis solam, longioribus ac latioribus: mus-
coso flore, & capillatæo. fructu exiguis vuis simili
post maturitatem rubente: rotunda est acinorum
facies. Feruesceta radix in aqua, & in cyathis
duobus vini aqua marina diluti pota, humorem
alui ciet: idè hydropicis datur. Vux eius, vitia cu-
tis in facie, & maculas omneis expurgant. Enas-
centes viticula, cibi gratia, sale conduntur.

Vitis alba. Cap. CLXIII.

Officinis
Bryonia.

Vitem albā aliqui bryoniam vocant. Folijs
viticulis, pāpinisq; satiuam vitem imitatur,
sed hirsutiora sunt oīa: ea, quos prope se nacta sit
frutices, suis clauiculis complectitur fructus rubēs
in vua dependet, quo eoria pilis spoliuntur. Ex ea
asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti
in cibo, aluum et vrinā cient. Folia, fructus, radix,
acrem vim sortiuntur: itaq; ulcerum phagedænis,
gāgrenis, chironijs, putrentium tibiarum tedio, ef-
ficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit,
& cutem erugat. vitia cutis in facie, varosq; lēti-
gmes, & cicatrices nigras emēdat, cum eruo, creta
Chia, et fœnogræco. Eadē effectū prodest decocta
in oleo, vsq; dum liquecat: sugillata tollit, & rec-

duuias cōmittit: inflāmationes discutit illita ex vi
 no: suppurationes rumpit: medicamēto aptè immi
 scetur, quod carnem exest: infracta ossa extrahit,
 trita & imposita. Datur comitialibus in potu dra
 chma pondere, quotidie, anno toto. Predest attoni
 tis, & vertigine laborātibus, consimiliter assum
 pta. Contra viperarum ictus potadrachmis dua
 bus, auxiliatur: partus necat, mentē interdū sub
 turbat: scēminarum locis apposita, partus secun
 dasq; morātes trahit: cit vrinā pota. Eclegma ex
 ea fit cū melle, difficilē spirātibus, strāgulatu op
 pressis, tuſsientibus, vulsis, ruptis, & laterū dolo
 ribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta
 diebus, cōsumit: illinitur ad eadē cū fico. Ad mulie
 bres īfessus decoquitur: siquidē vuluas purgat, sed
 abortū facit. Succus ē radice vere exprimitur qui
 trahit pituitā, cū aqua mulsa potus. Ad psoras et
 lepras, semē efficaciter illinitur. Lactis abūdantiā
 facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra Cap. CLXIIII.

Nigra vitis, quam aliqui nigram bryoniam
 vocant, folia fert hederae, smilacem proxi
 ma, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis
 suis arbores, quasi adminicula, comprehendit:
 fructus racematim coherent, qui inter principia
 virent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo
 ris nigra, intus buxexo colore. Viticulae, quae pri
 mo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur.

DIOSCORIDIS

tur: menses pellunt, vrinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tatis, prosunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratumementorum ceruicibus commodissime illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

Cap.

CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pennata, subgravi odore: radice per summa cæspitum nigra, oblonga, filices multas fundente, subadstringente gustu: nascitur in montibus, & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammonia aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debet. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & poru & illitu cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quæ per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contra, euanescens abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Filix foemina folijs est filicis, surculosis, altioribusque, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt: aliquæ etiamnunc rubræ inveniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle. elegmate sumpto: potæ cum vino, drachmis tribus,

terretes

teretes tineas eijciunt : data sceminis, Sterilitatem faciunt, & pręgnantibus abortum, si supergrediatur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur vt ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

Cap. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, presertim quercuum, palami altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuifura: radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aque mulsę insparsa, detrahit bilem & pituitam. trita luxatus effusacaciter illinitur, & aduersus rimas, quę inter digitos fiunt.

Dryopteris.

Cap. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilotrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

DIOSCORIDIS

Cnicus.

Cap. CLXVIII.

Offici-
nis, Car
tamus.

CNicus folijs constat oblongis. per ambitum di-
uersis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capi-
tulo magnitudine grandis olivæ: flore croci. semine
candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore
in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi suc-
cus cum aqua mulsa, vel iure gallinacei alium pur-
gat, sed stomacho adversatur. Ex eo autem fiunt
offula, quas placentulas vocant, adiectis succo a-
mygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ alium
emolliunt. Hæ in partes quatuor fiuntur, quæ nu-
cis inglandis magnitudinem impleant: è quibus an-
te coenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio
temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amyg-
dalorum tostorum & delibratorum cyathi tres,
anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum
carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cor-
git, et magis ipsum resolvende alui facultate donat.

Mercurialis.

Cap. CLXIX.

LYnoxostis, alij qui parthenion, alij hermubio-
tanion appellant: folijs constat ocymi, hele-
xine cognatis, sed minoribus: ramulis du-
plici geniculorum nodo cinctis, alarum canis mul-
tis: fructu femine, copioso, quandam racemorum
speciem præbente: mari, e foliorum sinu dependente,
parvo, rotundo, ceu binis testiculis una coherenti-
bus: frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in e-
ribus manditur, ad alium ciendam: cocta in aqua,

epoto iure, bilē aquamq; detrahit. Cōstat vt mares
gignātur, hūc facere: vt fœminæ, illā, si à purgatio
ne bib. itur, et trita folia genitalibus admoueātur:

Cynocrambe. Cap. CLXX.

CYnia aut cynocrambe, cauliculum binūm
dodrantum altitudine emittit, mollem,
subalbidum: folia mercuriali aut hederæ
similia, certis interstitiis subalbida: semē solijs ad-
heret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pos-
ta, aluum cient: oleribus commendantur. Ius deco-
cti & pituitam & bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium. Cap. CLXXI.

HELIOTROPIO magno flos est effigie scorpionis
cande, vnde scorpiuro ei nomen: & quoniā
folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Fo-
lia ocymi habet, hirsutiora, candidiora et maiora:
ramuli à radice terni, quaterni, aut sepe quini exis-
tunt, multis alis concaui: flos in cacumine candi-
dus, aut subfuluus incuruatur vt scorpionis cau-
da: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis.
Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plene,
potu pituitam bilemq; per aluum extrahit: contra
scorpionum ictus ex vino potum, & illitum pro-
dest: adalligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per
horam vnā ante accessiones, seminis grana
quatuor cum vine quartanas finire: tria verò,
tertianas. Illitum semen formicantes verru-
cas pensilesq;, & thymos, & epinyctidas exic-

DIOSCORIDIS

cat. Folia infantium destillationibus, quas syrias
seis vocant, podagris, luxatisq; utilissimè illinun-
tur: menses cient: partus trita & imposita pellunt.
Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iux-
ta lacus, folijs, ante dicto proximis, rotundioribus:
semine, acrochordonum verrucarum modo, pensil-
li, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto, ni-
tro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas tere-
tesq; excutit. Pensiles verrucas, quæ acrochordones
vocantur, cum sale illita tollit. Scorpioides herbula
est, folijs paucis, semine cauda scorpionis effigie.
Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

QUARTI LIBRI FINIS.

PEDANII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICINALI MATERIA,
LIBER V.

Ioanne RVELLIO Sueffionensi
interprete.



Vperioribus quatuor libris,
amicissime Aree, tradidimus
de aromatibus, oleis, vnguētis
& earundē lacrymis ac fructi-
bus, item animalibus, melle, la-
cte, adipe, cerealibus, oleribus,
necnō de omni radicum, herba-
rum, succorum, seminumq; ratione. In hoc autem
totius operis quinto differemus de vinis & metalli-
cis, a vite nostram commentationem auspicati.

Vitis Vinifera.

Cap. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolores il-
litu mitigant, & inflātionem stomachi ar-
doremq; cum polēta: folia etiā per se, vi quæ refri-
gerent & adstringāt, imponi solent. Potus eorum
succus dysentericus, sanguinē excreantibus, stoma-
chicus, & gravidarū malacie medetur. Eadē effi-
ciūt madefacti in aqua capreoli et poti. Lacryma
vitii, quæ veluti gūmi in candidibus cōcrescit, ex-

DIOSCORIDIS

vino pota calculos pillit : illita lichenas & psoras
 leprasq; nitro prius perfrictas sanat : eadem cum
 oleo sæpius pilis illitis , psilothri effectum habet :
 maximeq; sanies, quam accensa sarmenta vitium
 viridia exudarunt : qua & peruncta verrucarum
 informicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum
 & viuaceorum, detractis in sede condylomatis , et
 thymys , illitus ex aceto medetur: prodest luxatis
 & viperarum morsibus : contra lienis inflammac-
 tionem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto. La-
 brusca duorum generum est: alterius vua non ma-
 turescit, sed flore tenuis cenanthen nominatum per-
 ducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, ni-
 gra, & adstringens. Folia, caules, et clauicula, qui-
 bus repunt, vim habent cultæ viti similem.

Vua.

Cap. II.

Vua recentes aluum turbant, & stomac-
 chum inflant. innocentiores, quæ decer-
 ptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia
 humoris exiccatur) vtilesq; sunt stomacho, & grise-
 que, atque cibi auiditatem excitant. In vinaceis et
 ollis seruata, ori & stomacho grata sunt : aluum
 sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sangui-
 nem excreantibus conueniunt. Similesq; , quæ in mu-
 sto fuere. Sapa aut passo conditæ, stomachum ma-
 gis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua ce-
 lesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosi, ar-
 dentibus & longis febribus salubres. Reconditi

vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac prae-
duris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysen-
tericos, coeliacos, & foeminas fluxione vulvae labo-
rantes iuuat infusa: ad defecationes, ac fetus assue-
mitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent.
Stomacho utiles sunt: inspargitur farina tostorū,
polenta modo, dysentericis, & coeliacis, & solutis
stomacho. Vua passa alba adstringentior est: pro-
dest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac
vesicae. Estur in dysenteria per se cum nucleis: &
decocta in patinis cum melle, admista milij ac hor-
dei farina & ouo, valet ad purgandū caput: eius-
demq; gratia cum pipere commanducatur. Testiū
inflammationes sedat, illita cum lomento fabarū,
aut cum lini farina. Fauos, epinyctidas, carbuncu-
los, enatas in articulis putredines, & gangrenas,
sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: po-
dagra conuenienter cum panacis succo illinuntur:
mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe.

Cap. III.

OEnanthe vocatur vitis syluestris fructus,
cūm floret. Recondi debet fictili non picato,
collectaque substrato lenteo, in umbra siccatur.
Laudatissima in Syria & Cilicia & Phoenice.
Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac ciun-
de vrinae utilis: aluum sistit, ac sanguinis excrea-
tiones: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca
& illita efficax est: capitis doloribus tam viri-

DIOSCORIDIS

dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes ægyloplas, oris vlcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat, pessis miscetur, ad sistendū sanguinem: contra oculorum delacrymationē, & stomachi ardores, cum polline polenta & vino illinitur. Cinis cremata in testa, candētibz prunis, facit ad oculorū medicamētā: redunias & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium Cap. IIII.

Omphacion, succus est acerba viue, nondum maturefcentis, è Thasia uite aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, in solare, usque dum cogatur semperq; quod ceruici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctuq; à subdialibus locis in lectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest cōtra tonsillas, vñā, vlcera oris, humida gingiuarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritie, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem san-

guinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed paucio, & aquatiore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura.

Cap. V.

Vino vetere nervi leduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suavius est. quare cauendum est, qui intestinae alicuius partis imbecillitate sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, egre coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aestate medium, vtraque vitia fugit: quare ad victus sanorum egrorumque vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum vero, crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod medium est, medias inter vtrunque vire: habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distant: siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius a corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt mustum, turbat: sed minus inebriat, renibus & vesicae aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusque urinam expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum stomacho aduersatur: sitim stimulat,

DIOSCORIDIS

nervos infestat, aluo aptum, à valetudine se recol-
 ligentibus inutile. Passum, quod vuis sole siccatis
 in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur,
 Creticū cognomine, aut praninion, aut protropō:
 & sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion
 aut hepsenia appellant: nigra quidem, & quæ di-
 cuntur melāpsythia, crassa sunt, & corpora mut-
 tum alunt: cādidum, tenuius: & heluola inter hæc
 media, medias sortiuntur vires. Omnia tamē ad-
 stringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus
 venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, &
 vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium,
 pharicon, toxica & concretum in grumos lac: itē
 contra renum, ac vesicæ pruritus, rosion, exulcera-
 tionesq;: Inflant tamen, et stomacho aduersantur.
 Priuatim, prodest melampsythium, si venter rheu-
 matismum sentiat. Album, magis ceteris emollit
 aluum. Gypso conditum nervis officit, caput ag-
 grauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra
 venena ceteris aptius. Picata, aut resinata, ex cal-
 faciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus ini-
 mica. Quæ vero aparachyta vocant, vt quæ admi-
 stam saram recipiunt, caput implent: tumultentiā
 gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum
 malè habent. Inter Italica vina Falernum princi-
 pem locum obtinet, quod inueteratum per quā
 facilè coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstrin-
 git, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ys, quæ

visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros
 minime idoneum. Albana crassioribus constāt par
 tibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emol
 liunt (sed concoctionem non æquē adiuuant,) &
 nervosa minus infestāt: vetustate, eadem austerū
 saporem concipiunt. Cecubum, cū sit dulce, est
 & Albano crassius: corpus & colorem alit: agrē
 tamen coquitur. Surrentinum, valde austerum est:
 quare intestinorum & stomachi fluxiones cohi
 bet, & cū tenue sit, caput minus tentat: inuete
 ratum suavius redditur, & stomacho vtile. Adria
 num & Mamertinum in Sicilia æquē crassis par
 tibus gignuntur. modicē adstringunt, & ocysis
 mē inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem,
 nervos tentant. Parætypianum, quod ex Adriatico
 sinu defertur, odoratum ac tenuius est. quare libe
 raliter epotum fallit. diu servat ebrietatem, & so
 porem adfert. Istricum, Parætypiano simile est, sed
 vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedi
 ctis mollius, & aptum potui est: bene alit, & mi
 nus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medica
 mentis vtile. Lesbium facile membra subit, Chio
 leuius, & alio idoneum. Ephesium eandem vim
 habet, quod Phygelites nominatur: verū Asia
 num ē Tmolo monte, Mesogites appellatum, capi
 tis dolores ciēt, & nervos lēdit. Cum vero &
 Claxomenium, quoniā multam sibi maris aquā
 vendicant, facile corrumpuntur: status mouent,

DIOSCORIDIS

alium turbant, nervis officiant. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac syncerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in membra distribuitur, Stomachum adiuuat, appetentiã ciborum inuitat, vires alit, ac robur auget: somnũ conciliat, & commendat colorem. Potũ liberalius auxilio est contra assumptam cicutã, coriandrum, pharicam, ixiã, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosue: contra serpẽtium morsus, & omnium ictus, quæ refrigerando necãt, aut Stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorum, ac distentiones, Stomachi resolutionem, & si venter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoria, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maximè alba, vetera, & odorata. Quæ tamẽ vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: tetra vlcera, & phagedænica, & fluxionibus obnoxia, commode perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campanie, & Paeretypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò & nigra, Stomacho negotium exhibent, inflationem

pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentant. In media etate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & consuetudinē, & qualitate vini definiatur. Non sitire, & modice cibos prolu, optimū est præceptū. Nocet ebrietas omnis, & maxime assidua: si quidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborū adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maxime post aquæ potus, utilis: nanque modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per ceca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: si quidem valetudinis alicuius gratia factæ temulentie remediū adfert frigida. Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri vna, paulo ante maturitatē decerpta, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ille dolore laborantibus: item prægnantium malacie, & crudis: in pestilentia quoq; sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellāt, fieri solet, adiectione metretis tribus aquæ, i vinacea, quibus triginta vini

DIOSCORIDIS

metreta extracta fuerint calcatis vinaceis, expressa; decocto ad tertias partes, & addito in singulos congios modi eius, qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolescit. Cōuenit & gris, quibus timemus noxam vini, coacti sepe desiderijs eorum obtemperare: item à longa ualitudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo: Pares aque, & musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marinæ, & cœlestis aque, mellis et musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syziuestri vru. nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites. Cap. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: namque alium leuiter emollit, vrinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus, abstemijs: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vino uetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò ma-

his ad effervescedum locus pateat, fieri oportet, sem-
 fim asperso sale: cumq; effervere desierit, in alia va-
 sa transfunditur.

Mulsum.

Cap. VII.

Mulsum è uetere uino austeroq; & bono mel-
 le factum, præfertur: minus enim inflat,
 ac celeriter id genus in usum uenit. Vetus corpus
 alit: media etate, aluo prodest, urinâ pellit: à sum-
 mo cibo sumptum nocet: & inter initia potum, im-
 plet dein appetendi auiditatē reuocat. Fit mulsum
 duabus uini metretis, admixta una mellis. Aliqui,
 quò celerius præberi possit, mel cum uino coquunt,
 & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sex-
 tarios sex musti feruētis, unū mellis adijciūt et ubi
 ferbuerit, uase recondūt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa.

Cap. VIII.

Aqua mulsa ea sdem quas mulsum uires pos-
 si det. Cruda utimur, cum moliri deiectionē,
 aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs, qui uene-
 na hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis,
 & hominibus elanguescentes pulsus, quos illi di-
 xere mycrosphyctos, tussientibus, peripneumoni-
 cis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam
 paratum conditiuūque, quod aliqui hydromeli
 propriè uocant, media etate adynamo uino, aut
 lore in recreandis uiribus, respondet, & similem
 uim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius
 membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen

usus damnatur, inflammatis, aut cōstrictis: sed laboranti Stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit, duobus pluuiæ aquæ veteris ad vnā mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adiiciunt, ad tertias partes decoquant, & ita recondunt. Nec desunt, qui hydro-meli appellent, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius consieri conuenit: aliqui id coquant. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

Cap. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera: nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur: ad hæc, quæ & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minime corruptescit. Aqua maris calida est, & acris: Stomacho aduersatur (aluum enim conturbat) pituitam expellit. Si vero calida ad foras adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitijs, & perniciis, aut è vlceribus prodest. Miscetur cataplasmati ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepescit infunditur, & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lentes, & mammas rigentes

tes, fœueri vtile est: liuores fotu discutit: ad venenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidâ descendat, auxiliatur. Et malo habitu confestis iâ diu corporibus, nervisq; balnea ex ea vtilis: hydro picos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mixtione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

Thalassomeli. Cap. X.

Quod thalassomeli vocatur, vehementer purgare cōstat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marine coctæ singulas mellis adijciunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

Acetum. Cap. XI.

Acetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, & appetentiam excitat: erumpentem vndecunq; sanguinem, potu in se sibiue sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibus: cruentis vulneribus inditur & inflammationes arcet, in luccidis lanis aut spongia impositum: reprimat.

procidencia sedis, vuluaq; item abscedentes gingi-
nas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quae serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phar-
gedenas vlcerum, nomasq; fotu continuo cohibet:
podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur.
fugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capi-
tis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut
spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, graui-
tatem aurium, & sonitus, sibilosq; feruentis vas-
por proficit: instillatum quoq; aurium vermes ne-
cat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto
spongia admoveatur, & pruritus permulcet. Con-
tra venenatos serpentium ictus, qui refrigeran-
nocent, calidum commodè fouetur: & frigidū ijs,
quae exurens virus eiaculatur. Calidum potū, atq;
vomitionibus redditum, aduersus oīa venena effi-
cax est, praesertim contra meconium, & haustam
cicutā, conglobatum in ventre sanguinem, lac coa-
gulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale. Hau-
stu voratas hirudines, si sorbeatur, eūcit: tussim
veterem mitigat, & recentem lacebit. In ortho-
pnea calidum cōmodè sorbetur, gutturis fluxiōes
gargarizatum inhibet, anginis & vna procidēti
conuenit: contra dentium dolorē, calidū colluitur.

Acetum mulsum. Cap. XII.

A cetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,

salis marini pondo, mellis minas decem, aque sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atq; vbi refrixerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitilibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiâmue, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. Cap. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur, & prociduum sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat: fursures & manantia capitis vlcera extergit.

Thymoxalme. Cap. XIII.

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos, in articulis morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo factitatur: Thymitriti acetabulum, salis idem modus, ruta, pulegi, polenta, singulorum exigua portiones in vas conijciuntur, aqua terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo subsidio madescent.

Scillinum acetum. Cap. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traicctaq; li-
no segmenta modicis interuallis, ne se contingant,
siccantur in vmbra quadraginta diebus: mina eo-
rum in aceti boni sextarios duodecim immergitur,
et vase diligenter operto septenis diebus in sole ma-
descit: post eum numerum dierum scilla eximitur,
& expressa abijcitur: defecatum acetum trāsfun-
ditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam, quinque
aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem re-
purgantes, parem mensuram adiiciunt, & senis
mensibus macerari patiuntur. Id multo magis hu-
morum lentitias digerit: gingiuas humore prægnā-
tes collutione stringit firmatq; , & motos dentes
stabilit: putredines oris, & graues halitus tollit:
durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem
expedit, & limpidam canoramq; reddit. Datur
stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melēcho-
licis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item
vuluarum strangulationibus, lienis incremento lac-
borantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodum re-
creat: corpus sanum reddit, & bonum colorē præ-
stat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque
aurium infusione purgat. In summa, ad omnia ef-
ficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationi-
bus, in capitis dolore, aut nervorum vitijs. Datur
quotidie ieiunis sorbendum, inter initia exiguum,

paulatim adaugendo, ad cyathum vsq;. Nonnulli
binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. Cap. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vt
dictum est, scillam, & sole siccata, contundi
to, minam eius tenui cribro incernito, & linteo ra
ro illigatam, in videnos sextarios musti recentis ac
boni demergito: vbi trimestri spatio maduerit, elu
triatum vinum, obstructo diligenter vase, recondi
to. Licet quoq; sic humida scilla vti: In orbiculos,
rapi modo, dissecta duplicato pondere, quadragin
ta diebus insolari oportet, & valde inueterascere.
Alia parandi ratio: Scille dissectæ & repurgatæ
tres minas, in Italicam metretam musti demittito
& senos menses in vase obstructo macerari sinie
to: post id tempus defecatum & excolatum vini
recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum
corruptiones: item ijs, qui reuomunt cibum, & spi
ritu in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lie
nosis, male habitis corporibus, aquæ inter cutem,
regio morbo, difficili vrine, torminosi, inflationi
bus, resolutioni nervorum, horroribus longis, verti
ginosis, & vulsis. Menses pellit, minimeq; nervos
infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus
in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. Cap. XVII.

Marina variè faciuntur: Aliqui enim st.
tim quum deceptæ sunt vine, aquam maria

DIOSCORIDIS

admiscent. Alij in area vuas sole seccant: quibus calcatis, marinam adiiciunt. Alij passas prius vuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint. aluum subducunt: prosunt purulentæ extusisientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex Ammeis visis sunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatus creant. Verum quo plenior habeatur historia, ijs, qui, huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in vsus: uti quæ ex cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. Cap. XVIII.

CYdonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo sciinduntur, et duodecim minarum pondo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defæcatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumq; adicere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenterie, hepaticis.

renum vitij, et vrine difficultati. Melomeli, quod
 & cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mala fe-
 minibus suis castrata, in quàm plurimum mellis,
 quo penitus demersa contegantur, coniiciuntur: id
 post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat
 eadem, quæ superior compositio.

Hydromelum. Cap. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ,
 et sub Canicula sydius insolate, additis ad unā
 melomelitis factis ex cotoneis. Vis huius eadē est.

Omphacomelites. Cap. XX.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acer-
 bæ uuæ adhuc immaturæ, & tribus diebus
 insolate exprimuntur, & ad ternas succi partes
 mellis optimi despumati singulæ partes adiungun-
 tur, & insolatur in uasa transfusum. Vim repri-
 mēdi ac refrigerādi habet: stomachicis celiacisq;
 conuenit. Vsus post annum est.

Apijtes. Cap. XXI.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, uinum,
 apijtes nomine sed ita ut pyra non magnopere
 maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, si-
 mili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba
 sunt, & adstringunt: stomacho utilia sunt, atque
 intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. Cap. XXII.

Fit è feraci uite syluestri, quod uocatur oenan-
 thinum: Siccæ flores minis duabus musti ca-

DIOSCORIDIS

do macerati: post triginta dies mutatur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatē, cibi fastidia, coeliacos, & dysentericos. Rhœtes. Cap. XXIII.

Fit ē punicis malis maturis quod rhœten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocāt, ac decocti ad tertius, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiο exortam: Stomacho utile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites. Cap. XXIIII.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tussarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum uinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli uocant, quod arterie scabritijs conuenit.

Myrtites. Cap. XXV.

MYRTITES fit, baccis nigris, quæ maturitatem exceßerint, tussis, & organo expressis. Alii qui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aque heminas adiiciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

re adstringit stomacho vtile, fluxionibus ventris
ac stomachi prodest: & contra intestinas vlceras
tiones, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites. Cap. XXVI.

MYrsinites sic temperatur: Rami nigra myrti
cum suis baccis & folijs tusi, decem mina
rum pondo, in tribus musti congijs seruescunt, do-
nec duo supersint, aut certè dimidium. id vinum co-
latum ad vsus reconditur. Contra furfures, vlce-
ra in capite manantia, eruptiones papularum, gin-
ginas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est:
sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

Cap. CXXVII.

LEntiscinum similiter vt myrsinites tempera-
tur: nec secus terebinthinum. Nanq; bacciferi
eorum rami sumi debent: Similes insunt vires: ad-
stringunt stomacho accommodantur, & defluxio-
nibus intestinorum, vesicæ, & stomachi, & san-
guinis profluvio: vlcera omnia fluxionibus obno-
xia, solum ad cicatricem perducunt: fluxiones vulua-
ac sedis in se sione cohibent.

Palmeum vinum. Cap. XXVIII.

PAlmulas maturas, quas vocant chydeas, in
vrceolum imo pertusum, & obstructū picata
arundine, demittito: lino foramen sit obturatū, &
quadragenis sextarijs ternos aque congijs infun-
dito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq;

DIOSCORIDIS

Ægrios infudisse satis est: post decē dies detracto ab arundine linteo assumito vinū crassū et dulce, et reposito. Suae illud quidē, sed capiti noxiū: contra fluxiones, propter adstrictoriā vim, efficax: stomachicis, cœliacis, sanguinē expuentibus cōuenit. Aliqui idē addita aqua iterū capiūt, et tertio, quarto, quinto, sexto ne, faciūt: quod tandē acore vitiatur.

Catorchites. Cap. XXIX.

CAtorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita vt palmeum. sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiiciunt, in quo recēter pressa vinacea maduerint. Caricæ, quæ chelidonie aut phœniceæ appellantur, præsertim nigra, macerantur, vt diximus, & post decē dies humor excipitur, atq; iterum aut tertio, idem modus aquæ, in qua vinacea maduerint, infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acore contrahit, & aceli vsum præbet. Id tenue est: flatu gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit: alio tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactis vbertatē facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, vt potio, quam xythron appellamus. Aliqui sex amphoris, decē salis sextarios adiiciunt. Alij murie amphoram: quod nō facile vitia cur, & alio idoneum fore censent. Alij thymū & fœniculū imo subiiciunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vas explerint. Fit & è sy

comoris eodem modo vinum, sed in acetū acre dege-
nerat: quoniam non ita præualet vis eorū, vt fluen-
tis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. Cap. XXX.

Resinatum vinū populatim factitari solet:
copiosum in Galatia: quoniā vinū illic coā-
cescat, vna non maturescence, ob cæli algore, nisi
picea resina tēperetur. Resina aut cum cortice tun-
ditur, et amphoræ dimidiata hemina permiscetur.
Aliqui, vbi efferbuit, excolant, separantes resinā:
alij relinquunt. Hæc vina vetustate dulcescūt. Om-
nia capitis dolore, & vertigines faciunt: concoctio-
nem tamen adiuuant, & vrinā cient: tussientibus,
ac destillatione vexatis conueniunt: itē cæliacis, dy-
sentericis, et hydropicis, et fœminis fluxione vulue
laborantibus: altis exulcerationibus infunditur. In
hoc aut genere nigricans magis albo constringit.

Strobilites. Cap. XXXI.

Strobilites fit maceratis ī musto nucibus pineis,
recentibus, fractisq; præbetq; resinati effectus.
Si quis madefactas nuncis pinū musto decoquat: po-
tū affatim cōuenit ijs, qui tabitudine cōficiantur,

Cedrinum vinum. Cap. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-
num, pineum, aut abiegnum, simili ratione
fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt,
aut Soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet;
vti consudent, congioq; vini minimam vnā permi-

DIOSCORIDIS

scere, & post duos menses transfundere, & antea
quàm recondantur, insolare. Factitiorum vinorum
vasa impleri debent: nanque non plenis vasis, vina
in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina,
rectè valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt,
urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen
vehementius excalfacit. Fit quoque è fructu cedri
maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum bac-
carum selibra: diebus quadraginta insolari debet,
& defecatum in vasa transferri.

Fit etià vinum è buccis iuniperi, non aliter quàm
cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo
fit: Cedrià dulci aqua lauant, & singulas ampho-
ras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent.
Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussi antiquæ
utile sine febre, pectoris laterumq; doloribus, tormi-
nibus ventris, & interaneorum ulceribus, purulentis
excreationibus, mulieribus vulvæ causarijs, hydro-
picijsq; facit aduersus ventris tineas & horrores:
contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat:
aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. Cap. XXXIII.

Picatum ex liquida pice et musto temperatur.
Picem aut primum marina aut muria tantis-
sper eluere oportet, dum in albuerit, & sincera ma-
ris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: cōgijs
octo musti, uncia picis una aut altera adijcitur:
ubi efferbuerit, & constiterit, in vasa diffunditur.

Hoc genus vini excaľfacit, cōcoquit, purgat, abster-
git: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis et
iulue, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exul-
cerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs,
cōcoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, prę-
sertim in succida lana impositum.

Absynthites. Cap. XXXIIII.

Absynthite faciundi ratio euariat. Aliqui enī
duodequingenta sextarijs Italicarū am-
phorarum, admistā absynthij Pontici libram deco-
quunt ad tertias: et vbi infuderint sex aceti sexta-
rios, & absynthij selibrā, ac diligenter permiscue-
rint, diffundunt in vas: dumq; conqueuerit, defæ-
cant. Alij absynthij minā in amphorā demittunt,
tusamq; & raro linteo deligatā, in cado musti ma-
cerant, binis mensibus. Alij absynthij quadrantē,
alij trientē, & nardi Syriace, cinnamomi, cassiæ,
floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singu-
los sextantes inijciunt in metretrā musti, & tun-
dentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis,
ternisue mensibus dimittunt: postea defecatum vi-
num transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti
cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, et
absynthij drachmas quadraginta, linteo inuolu-
tas: & post quadragesimum diem elutriāt. Alij in
senos sextaros musti, absynthij librā, & sicce pi-
ni resinæ sextantem immittunt, & post decē dies
excolant, & recōdunt. Vtile est stomacho: vrinam

DIOSCORIDIS

ait: tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitij auxiliatur: fastidia discutit: ijs prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; ventris tineas, & remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quæ plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites.

Cap. XXXV.

HYSSOPITES è Cilicio hyssopo maxime laudatur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti cõiecta, linteolo raro cū quibusdam lapillis, folia inuoluntur, vt degrauius ponduscula fasciculus sidat: vinū post quadraginta dies defecatū elutriatur. Contra pectoris, laterū, & pulmonis vitia, vetere tussim, & suspiria prodest: vrinam cit, torminibus, & horribus febriū circuitu repetētib; auxiliatur: menses mouet.

Ex diuersis plantis factis.

Cap. XXXVI.

SIMILI modo chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tarde cõcoctioni, incipienti aquæ intercutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stæchadites nõ secus temperatur. Congijs sex, stæchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum, neruarumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè datur, cum pyrethro.

Sagapeno. Fit ad eadem acetum est stoechade herba, ut paulo ante diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit vinum est betonica, quod est tron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo pregnantem, cum suis ramulis mine pondendo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaenorum vitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in vniuersum dicatur, factitia vina, sibi misturam vires adsciscunt: quare non difficile fuerit ijs, qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: ueruntamen vinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum est betonica acetum, ad eadem vitia utile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agris concoctionibus. E napiis fit vinum, nomine bunites, drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc

DIOSCORIDIS

vinum pectoris vitūs, & omnibus, quibus maribus
bium. Thymi tusi & cribrati uncias centū linteis
colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra
aegras coctiones, fastidia, dysenteria, nervorum
& precordiorum dolores, hybernos algores, & ve
nenata animalia, quorum morsum frigus insequi
tur, aut putrescit locus. Simili modo est satureia vi
nū fit, quod eadem quae thymites praestat. Sic quoque
origanites ex heracleotico origano conficitur cum
supradicto. Facit eadem quae thymites. E calamin
tha, pulegio, & abrotono vina sunt eodem quo thy
mites modo prosunt stomachicis, cibū fastidientia
bus, et regio morbo: quod urinā moveant. Fit itē
conyx a vinū, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites.

Cap. XXXVII.

Aromaticis ita fit: Palmae, aspalathi, calami,
nardi gallici, singulorum quatuor sextarios se
mito: postquam contriueris, passo subigito, coactis
ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri
musti deiectis, operculato vase, quadraginta die
bus quiescere finito: deinde ubi fece expurgatum
fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, plu
drachmae septem, costi drachmae duae, nardi Syriae
drachmae sex, cassiae uncia, croci drachmae qua
tuor, amomi drachmae quinque, asari drachmae qua
tuor: omnia simul trita & linteis colligata in cas
dum musti demerguntur, & postquam vinū defer
huerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & late

rum,

rum, & pulmonis dolores: difficile vrina, horribilibus, retardatis mēſibus, atq; ij, qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita craſſitiem extenuat: colorem alit, ſonnum cōciliat, dolorem finit, renum & veſicæ vitijſ auxiliatur.

Ex diuerſis odoramentis facta.

Cap. XXXVIII.

Fit & vinum ad deſtillationes, cruditates, tuſſim, inſtationes, et ſi humor in ſtomacho cōt: Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ ſex, aniſſi drachmæ tres: omnia plenius tuſa & linteolo inuoluta in ſex vini ſextarios cōiunguntur: vinum poſt triduum colatur, & in lagenâ reconditur. Datur poſt deambulationem, meraculum, cyathi vnus meſura. Fit quoq; nectarites ex helenio herba: Radice ſicca pondo quinq; drachmarum linteolo colligata, & in congios ſex muſti addita, & poſt tres meſes effuſa. Facit ad ſtomachi et pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; vinum factitatur, hac ratione: Singulorum ſelibrâ in binos muſti congios mittito, poſt meſes duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax eſt contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinæ difficultatem: prodeſt ſtomachicis, atque ijs quos pallor decolorat. Alij vnciâ, aut ſextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem, in muſti amphoram adiungunt. Aſari quadran-

DIOSCORIDIS

tem in senos musti sextarios Itidem demittito. Id uero
in genus urinam ciet: hydropicis, & regio morbo
laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Ra-
dicis syluestris nardi recentis & tritæ cribratæq;
bessum in congiū musti coniungito, duos menses que-
scere finito. Vtile est hepaticis, difficili urina, infla-
tionibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis factis.

Cap. XXXIX.

Radicis dauci cōtuse drachmas sex in musti
amphoram imposito, et similiter transfun-
dito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, &
vulue menses pellit, ructus ciet, et urinam: prodest
tussi, ruptis, vulsi s;q; Saluie vnciam in musti am-
phoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet
contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectio-
nes sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos
menses. Panacis vnciam in musti coniugium mitti-
to, & transfundito. Prodest ruptis, vulsi, cōtusi,
ortopnææ: lienis crassitiem extenuat: contra tormi-
na, coxendicum dolores, efficax est: tardas conco-
ctiones accelerat: menses & partus extrahit: aqua
inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vi-
na ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt.
Oportet enim singulorum vncias octo in senos con-
gios mittere, tribus mēsi-
bus macerare, mox in vas
transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & uri-

nam mouent. Seminis apij recentis, maturi & cribrati vncie nouem in linteo colligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat stomachicis, et difficili urina auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex fœniculo, anetho, & petroselino, uina eodẽ modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore salis uinum, multo ad purgandum efficacius, quàm uinum aqua marina temperatum. Fauces, uesicæ, renes, & stomachum infestat: quare neq; in secunda, neque aduersa ualetudine prodest. Fit etiam uinum quod phthorion uocant, quoniam partus necat, et abortus facit: veratro, aut scammonia, aut fyluestri cucumere, iuxta radices uitiũ sato: si quidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Id uinũ partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè uo- muerunt, cyathorum octo mensura, dilutũ. Ramorum thymeleæ cum suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congius tres musti, & leuĩ igne coquito, donec cõgũ duo supersint, defecatũq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absunit. Chamælea dum floret, cum folijs tusa et cribrata decem drachmarum pondere, in musti cõgiũ additur. Post duos menses uinũ in uas transfer- tur. Aqua inter cutẽ hepaticis, et lassitudine cõfra- Etis, efficax est: itẽ mulieribus, q̃ a partu egre pur- gantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadẽ conueniens: urinam quoque ciet. 1 librum radicis mandragoræ concidito, segmenta lino traicito,

DIOSCORIDIS

quod selibram aequat in musti cadum demittito,
 ibiq; esse finito ad menses treis, deinde transfundito
 Media potio, hemina dimidium, bibitur, passo in
 duplū addito. Aiunt heminam vini congio mistā,
 potu soporem adferre: cyathus vnus cum sextario
 vini potus, enecat: mediocris usus eius, doloris sen-
 sum aufert: fluxiones inerasat: olfactu, potuq; &
 cum inditur, idem praestat. In cōgium musti aqua
 marina diluti, drachmas duodecim nigri ueratri
 triti in linteo mundo, mittito: dumq; efferbuerit, in
 marinae aquae congios quatuordecim aut quindec-
 cim, ubi pleniuscule fregeris, inijcito: post aliquot
 dies colato, & utitor. Dato cyathū unum ex aqua
 balnei in potu, ad aluū soluendam, ijs qui euomue-
 runt a coena. Alia ratio: Veratri drachmas uiginti,
 iunci odorati uncias duodecim, spicae Syriacae un-
 cias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in se-
 ptem uini Coi sextarios diebus quadraginta mace-
 randas indito, postmodū colato: dabis in potu ses-
 quiheminam. Aliter: Decocta marinae aquae ex al-
 to petite sextarios duodecim, ueratri cāldidi libras
 sex, in musti amphora quadagesimo die, quā-
 madefeceris, colato, & utitor. Alia ratio: Veratri
 drachmas duodenas, & aphronitri quaternas, in
 senis musti sextarijs diebus quinisdenis macerato,
 mox colato & semestri exacto, utitor. Id uini ge-
 nus abortus facit, & partus necat. Aut uinas in
 sole siccatas imposito in musti metretam (implet

autem metreta cōgios duodecim) & gypsum in uinum mittito pon lo drachmarum uiginti, et biduo residere finito, conijcito ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorū drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos et trientem, myrrha & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas tres aut duas dilutas. Pargat à partu, & abortu sieminas: fœtus extrahit, contra strangulatus uulua efficax. Scammonites sic fit: Radicis scammonie per messes effosse, trite, & linteo colligatæ drachmas quinque in musti congiū mittito, ad dies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primūm

Cadmia. Cap. XL.

EX cadmie generibus optima est Cypria, bostryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatē magis declinans, racemosa facie, colore spodiū, quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, irentatis uenarū discursibus, onychite lapidi similis, cuiusmodi sunt, quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, crustosa diciuntur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Quæ testaceam faciem habet, terram amplexa

DIOSCORIDIS

est. Improbatur candidula. Oculorum medicamentis
 botryitis nomine, & onychitis, utiles: reliquæ ad
 emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis
 insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Mace-
 donia uero, Thracia, & Hispania delatæ impro-
 bantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua exple-
 re, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus in-
 farcire, excrescentia in carne coercere, crustas crea-
 re, & ulcera, quæ cacoethe uocantur, ad cicatricem
 perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus
 cadente, fuligine egesta flatu, & lateribus came-
 risq; fornacum inherente. Prægrandes autem ac fer-
 reæ sunt rixles, ab officinis appellatæ acestides, per
 summa fastigia conuexæ & cōcamerate, ut quæ
 ab ære iactantur sursum corpuscula cohereant, et
 inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in cor-
 pus concresecunt, & modo genus unum eius, modo
 duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia
 in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato la-
 pide, cui pyritæ cognomen est. in quo etiam monte
 quadam quasi uenæ chalcitis, misyos, foreos, melā-
 teria, cœrulei, chrysocolle, atramēti futorij, diphry-
 gisq; inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in la-
 pidum fodinis inueniri tradant, falsi quadam lapi-
 dum cognatione. qualis inuenitur & apud Cumas
 lapis, nullam sui uim ostendens. Si eo deprehendun-
 tur, quod sunt cadmia leniores, nullumq; alienum
 mandentibus saporem exhibent: commanducatus

item lapis dentes offendit & cadmia, ut pote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Itē tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fumum igni similem ei aculatur: cadmia uero quiescens manet, fuliginemq; luteo colore aut aereo splendentem expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac lenior multo fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda aëria. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguitur uino Amineo, quæ ad emplastra preparatur: sed quæ ad psoriarum medicamenta preparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur: iterumq; tritam ex uino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens: hac spodij uice utuntur. Lauatur aut in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

Cap. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & ple-

DIOSCORIDIS

runque ponderosior est, palearum pilorumq; plena,
 quasi purgamentum quoddam, quod ab arariorū
 officinarum pavimentis & fornacibus euerritur:
 pōpholyx uero pinguis est, & candida, usque adeo
 levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerūt
 genera: unum ad aeris colorem uergens, subpingue:
 alterum magnopere candidum, summamq; leuita-
 tem nactum. Candida sit pompholyx, quoties in-
 perficiundo ære fabri præstantiorem facere uolentes,
 detritam cadmiam cumulatiuè insparserint.
 Nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pom-
 pholygen coit. Ceterum pompholyx nō ex aris mo-
 do materia, et fabrilī industria factitatur, sed ex
 cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximiè folli-
 bus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In do-
 mo gemina cōtignatiōe operta, fornax extruitur,
 iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à
 supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci
 proximus, tenui foramine ad fornacem usque per-
 foretur, ad excipiendam folliis narem: ostium me-
 diocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabri-
 catum: domuncula altera huic cōiuncta sit, in qua
 & folles, & flator suo munere fungatur: deinde
 carbonibus in camino succensis, assidens artifex
 cadmiam particulatim fractā inspargit, à locis su-
 pra infurnibulū extructis: idem negotium obit in-
 fernè artificis minister, simulq; carbones adūcit,
 usque dum indita cadmiæ copia prorsus absumat

tur. Itaq; egesta suffitu tenuis pars, & levis mate-
 ria in summā domum euolat, et parietibus, lectis,
 fornicisq; adhaerescit. cōflatum aut inde corpus, in-
 ter initia erūpentibus, aquarum bullis simile pro-
 dit, postea maius incrementum capeffens, glomusca-
 lis uellerum simile redditur. Ponderosius autem in
 ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offulditur,
 illud domus pauimento cohaeret. Quod tenuiore
 deterius existimandū est, ideo quòd multum terræ
 collegerit, & spurcitia in acervatione referciatur.
 Sunt qui hoc modo tantū fieri spodium arbitran-
 tur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cy-
 pria, quæ accepto aceto halitum aeris præstat, colo-
 re aliquantū piceo, sapore cœni horrido: & si frus-
 dem non experta, flagranti carbone inferuescit,
 aereum colorem contrahit. Antedictis aut notis di-
 ligenter attēdendum est. Siquidē à nonnullis adul-
 teratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut maris
 no, aut crematis grossis, et quibusdā consimilibus.
 quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs pro-
 bādīs inuenietur eorum quæ antè dicta sunt. Pom-
 pholygem in commune ita lauari oportet: Ligatā
 linteo mundo modiceq; raro, aut siccam, aut aqua
 respersam, in labellū demittito, quod imbrem conti-
 neat, & huc atq; illud fasciculū deferens, immer-
 git o: ita enim limosa pars eius ac uilis, effluet, &
 omne sedimentū in linteolo remanebit. Postea resi-
 dere sinens, aquā cum cinere colis incernilo, & no-

DIOSCORIDIS

uam infundens, agitato, & effusulito: mutata tan-
 tiſper aqua, et colata, dum arenosi nihil fidat. De-
 mum aquam exprimito, & siccatum cinerem re-
 condito. Alij quantũ maximè fieri potest, siccant,
 & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassa
 mentum imitetur: deinde luteo faucibus excepturi
 uasis obteto, aut laxius illigato, colant, & quò fa-
 cilius transeat, infusa per linteum largiore aqua,
 cinerem conturbant: mox spumofum, quod traie-
 ctum est, & supernatat uasi, concha excipiunt, et
 fiēt ili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit,
 sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, reli-
 cto arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa si-
 dere patiuntur, & in uas aliud excolant: hoc idem
 faciunt, donec cinis merus & arenæ expers
 inueniatur. Alij paulatim integram in aqua re-
 spargunt, arbitrati arenas lapillosq; suo ponduscu-
 lo degrauates, pessum ire: pilos aut & paleas leui-
 tate sua in sublime attolli. Ceterum cinerem me-
 dium separant, & in pilam coniectũ, ut cadmiã,
 eluunt. Quinetiã lauatur uino Chio marina aqua
 diluto, modis, quos supra diximus: & ita redditur
 adstringētior, quàm aquis elota. Vis pompholygis
 adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstrue-
 re, & aliquantum exiccare. Inter medicamēta nu-
 meratur, qua leniter crustas obducunt. Quod si spo-
 dion torrere libet, diligentior tritam, & irrigatam
 aqua, colliges in pastillos, fiētiliq; nouo, subiectis le-

nibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum as-
 siccati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argē-
 to, plumboq; fieri spodium: uerum post Cyprium,
 plumbeum maxime commendatur. Quoniam spo-
 dios sepe numero desideratur, necesse est ostendere,
 quæ simili uirtute polleant, ut in spodij locum suf-
 fici possint, antispodia uocāt, quoq; modo sumi de-
 beant. Folia itaque myrti, cum floribus, & baccis
 immaturis, in fictile crudum coniecta, indito oper-
 culo continua foramina habente, uruntur fornaci-
 bus, donec siglinum percoquatur: iterum in fictile
 aliud crudum transferuntur, quod ubi perassatum
 fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoque fit
 è termitè syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, sa-
 tinae cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis,
 & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis lini-
 teolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in
 sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco,
 ænanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma,
 uel pseudocypereo cum flore. Alij ficulnea frondes in
 sole antea siccatas, eodem modo parant: alij tauri-
 nū gluten: alij succi, las lanas asperas, pice aut mel-
 le irrigatas, quæ omnia in spodij uicē usurpātur.

Aes uisum.

Cap. XLII.

AEs uisum probatur rubrum, & quod con-
 tritu colore cinnabarim imitetur: nigrum
 uero plusquam deceat exustum est. Fit autem è
 clauis solutarum narium, fictili crudo compositis:

DIOSCORIDIS

subperso ſu'phure cū ſale pari, omnibus uiciſſim
inſparſis, fictile circumlito ſigulari creta ſpiramena
to, fornacibus inditur, donec ſiglinū percoquatur.
Quidam pro ſulphure & ſale alumen inſpargūt.
Alij ſine ſulphure ac ſale, fictili multos dies urunt.
Alij ſulphure ſolo utuntur, fuliginem tamen excu
tiunt. Alij oblitos ſciſſili alumine clauos, cū ſulphu
re & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla
aceto reſperſos urunt, & iterum ac tertio idem ef
ficiunt, poſtea recondunt. Principem locum tenet;
in Memphide combuſtum: proximum in Cyp̄o. Ad
ſtringit, exiccat, reprimi, extenuat, attrahit: ulce
ra purgat, & ad cicatricem perducit: initia oculo
rum emendat, excreſcentia in carne conſumit, no
mas cohibet, uomitus ciet, cum hydromelite potū,
aut cū melle delinctum, illitūmue. Lauatur ut cad
mia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus
ſordes emergat. Aeris recrementum, ſtercūſue quā
ſcoriam uocant, eodem modo lauatur: & eandem
uim, ſed imbecillioſiorem, habet.

Flos æris.

Cap. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum ueterū pſeg
ma, quaſi reſegmen aut ſegmentum, nomina
runt, optimus eſt friabilis, in attritu fulueſcens, mi
lū effigie, & numero, breuis, ponderoſus, modicē
ſplendens, atq; conſtringens, qui delimatam æris
ſcobem nō recepit, qua ſæpe adulteratur. Sed id fa
cilē deprehenditur, cū dentium illiſu dilatantur ra

menta. Fit autem, cum ex fornacibus fusum, in receptacula delabatur, per cola fistularum ad ea pertinentium: tum huic negotio addicti ministri, sor-des expurgantes, aquam clarissimam infundunt. refrigerandi proposito: itaque repentino concretu, ac addensatione, uelut expuitur, & erumpit antedictus flos. Adstringit & excrescentia coerct: offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit: carnosam narium & sedis uitia absomit. eruptiones papularum cum uino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur: uuam, tonsillasque reprimat, farina eius cum melle admoda.

Squamma æris. Cap. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cypræ officinarum clauis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est clauaris, nominatur, sed ex uili promiscuoque ære, aut candido, uitiosa intelligitur: quam utpote tenuem, et inuolidam damnamus, maximè approbantes crassam, rufam præsertim si aceti respersu æruginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coerct, ulcera ad cicatricem perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta, quod genarum scabritiam absomit, et fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: Sicca æris

DIOSCORIDIS

squamma expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pestū ierit: abijcitur quod subsidit et effusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi destringenda sit, vehementer confricatur: dumq; lēto rem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terrendo ualide: squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur: quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamēta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernant, & linteo apertum biduo cōquiescere sinitur, effusaq; extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, & reponūt. Squamma ex acie aut mucronibus decussa, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad molientiam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis.

Cap. XLV.

AErugo rasa fit his modis: In cadū, aut aliud cōsimile uas acetum quā acerrimum infunditur. superponitur inde inuersum æneum uas, præsertim concameratum: sin minus, planū: sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum: exempto, quo doliolū obturaueris, operculo, decimū post diem insidens ærugo deraditur. Aut eris lamina in

eadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidē post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una pluresue, vinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo tersantur. Quinetiam ex delinata æris scobe æruginē facere licet, necnon è laminis, quibus bractee auri conclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidē, & boni coloris, sed uitiosam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterāt. aliqui pumice admisto, alij marmore, alij tramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, æruginis pontiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin & dentium appressu, si quidem sincera cedit, laevis, & sine asperitate. Atramentum uero sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atramentum sutorium

DIOSCORIDIS

acceperit: quod id uſtum ſuapte natura talem ſor
 titur colorem. Aeruginis, quam uocant ſcoleciam,
 duo ſunt genera: quædam foſſilis eſt, altera facti-
 tia ad hunc modum. In mortario Cyprii æris dimi-
 diam heminā aceti albi acrisq; piſtillo cupreo con-
 terito, donec ſtrigmenti craſſitudinē imitetur: dein
 de aluminis rotundi drachmam unam, cum ſalis
 foſſitius, tranſlucētis, aut marini quān albiſſimi,
 ſolidiq; aut certē cum nitri pari pondere terito in
 ſole, æſtuoſiſſimis diebus, ſub ſydis Canicula, do-
 nec colorem æruginis contrahat, et concretu ſtrig-
 mentoſum fiat: ubi autem ſe in uermiculorū Rhoe-
 diacis ſimilium ſpeciem coegerit, recondito. Efficax
 & ualde boni coloris redditur, ſi duas parteis urie-
 næ ueteris cum una aceti adieceris, & alia, quæ di-
 ſta ſunt, perageris. Sunt qui æruginem raſitē, quæ
 in apparatu non reſpondit, gummi miſto digerant
 in formas, & ita uendant: quod genus, ut uirio-
 ſum, improbaturi. Fit & quædam ærugo ab auri-
 ficibus, mortario & piſtillo Cyprii æris, cū urina
 pueris impubis, qua aurum ferrumināt. Antediſta
 æruginem genera, uſto æri omnino reſpondent, ſed
 magis effectū ualēt. Sciendum foſſilem ſcoleciam
 præſtantiffimam eſſe: de raſam ſequi: poſtremo lo-
 co factitiam. Mordaciſſima tamen eſt hæc, & ma-
 gis adſtringens. Aurificum autem ærugo raſa re-
 ſpondet. Aerugines omnes adſtringunt, extenuāt,
 excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lac-

erymas cient, nomas sifiunt, vulnera ab inflāma
 tione tuentur. Vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem
 perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cum
 melle cocta. callum fistularum erodunt, cum am-
 moniaco, collyrij modo in eas adacta. Ad gingina-
 rum autem excrescentias, & extuberationem vtis-
 les. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cū
 melle illita: verū post illitionem sponsia ex aqua
 calida locus fouendus est. Resina terebinthina ex-
 cepta, cum ere & nitro lepras abigunt. Vritur
 erugo, quancunque velis, minutissimē fracta com-
 minutaq; in fictili patina, flagrantibus prunis su-
 perposita: versaturque donec se mutet, & colorē
 cinereum cōcipiat: postea refrigerata reponitur ad
 vsum. Sunt qui cruda olla eā vrant, vt dictū est:
 sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. Cap. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit sceminarum
 profluuia, admota, potūque prestat ne con-
 cipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papula-
 rum eruptionibus medetur. Perquā vtilis ad
 scabritias genarum, reduuias, & pterigia: con-
 dylomatis prodest, gengiuas firmat, podagras illi-
 ta lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in qua
 cadens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dy-
 sentericis, lienosis, cholera laborantibus, & disso-
 lutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam sco-
 viam vocant, eadem post que rubigo, sed ineffica-

DIOSCORIDIS

cus. Aconito, ex aceto mulso potum, capitulatur.
Plumbum elotum. Cap. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortarium plum-
beum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito,
donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat,
aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aqua
superfundens, quò facilius quicquid est resolutum
incerni possit. Hoc iter facito, vsquedum satis tibi
habuisse videatur. Vbi confederit, priore aqua effu-
sa, novam adiciens, vt cadmiã lauato, donec nul-
la extet nigritia: postea in pastillos cogens reponi-
to. Quidam scobem mundi plumbi lima quasita,
mortario pistilloq; i lapideis terunt, aut manibus cū
aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat:
mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in
pastillos. Nam tritum vehementer, cerussa, simile
redditur. Alij elimata scobi modicā, plumbaginem
adijciunt, affirmantes ita elotum plumbū præstan-
tius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere,
mollire explorare, caua, sistere oculorum fluxiones, et
ulcerum excrescientia. Sanguinem suppressit: pro-
dest contra sedis ulcera, condylomata, & hemor-
rhoidas, ex rosateo: itē ad ea, quæ egrè cicatricem
ducunt: et in totū spodij effectus præbet, nisi quòd
nō obducit crustas. Syncerum plumbum affrictu,
marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

V Plumbum vstū. Cap. XLVIII.
Ritur plumbum sic: Super quā tenuissia

mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interies
 Eto semper sulphure, vsquedū vas expleueris, suc-
 cendi o flagrante autē plumbo, ferrea rude versa-
 to, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilq; è
 plumbo non vstū hæserit: tum demum, obstructis
 naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius
 sentitur: Aut elimatam plumbi scobem in olla sul-
 phure vriso. Alij laminas in fictili crudo, vt dictū
 est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlimentes
 operculū, dato exili spiramento, vrunt. Alij pro sul-
 phure cerussam aut hordeum inspargunt. Alij inte-
 gras laminas imponentes, acri igne vtuntur, et ru-
 dicula ferrea continuè mouent, dum in cinerem sol-
 uantur. Sed difficilis huiusmodi vstio: & si vehe-
 mentius vratur, contrahit spumæ argenti colorē.
 Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plū-
 bum vstum lauatur vt cadmiā, & reconditur.
 Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed
 multò acriores. Recrementum plumbi, quod scoriā
 vocant, optimum est, densum, fractu contumax, ce-
 russam planè representans, nihil plumbosi habēs,
 quod ad luteum calorem accedit, & vitri splendo-
 rem imitatur. Eadem, quæ plumbum exustum, po-
 test, sed magis adstringit. Lauatur in mortariis in-
 fusa aqua, & resusa summa aquæ parte, quæ lu-
 teum colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-
 tum absumatur. Dein vbi consederit crassamen-

DIOSCORIDIS

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdois lapis à plumbi similitudine dictus, respondentē recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

Cap. XLIX.

S Timmi optimum, quod splendidissimū est, modoq; nitedularum emicat, contractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellarūt, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrementa in carne cohibere, vlcera ad cicatricē perducere, sordes & vlcera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & vt in vniuersum dicatur, vis vsto plumbi similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erūpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, non cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exēptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulo magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, vt cadmia & es. Sunt qui vt plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. Cap. L.

Molybdæna optima est flaua, argentea spuma emula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Vis

tiōsa est, quæ aerem aut colorem plumbeū refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quedam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spuma argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur lauatūq; eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris nimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. Cap. LI.

Recrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdene vim habet: quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducūt, utpote cū adstringat, extrahatq;.

Spuma argenti. Cap. LII.

Spuma argenti quedam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus cōflata, donec perfectè igni incandescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: hæc sequitur quæ sit Dicearchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argeno

DIOSCORIDIS

to, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, exple-
re caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatri-
cem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argen-
ti spuma, confractis partibus ad magnitudinem in-
glanbium, prunae superpositis: ita accensa folli-
bus, ut conflagret: abstergitur insidens spurcicia, & re-
conditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguentes,
rursus vrunt, & eadem prosequuti reponunt. La-
uatur ut cadmia. Ut argyritidi nominata, aut, si
desideretur, alteri calor detur, ea in partes magni-
tudine fabarum confracta, chœnicis Attica mensu-
ra, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi triti-
ci pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo
puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, donec
hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum
craterem oris ampli transfunduntur: triticum ob-
ijcitur, spuma argenti vehementer manibus affri-
cando infusa aqua lauatur, assiccataq; in Thebaï-
co mortario teritur, affusa feruente aqua, donec so-
luta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teri-
tur, & vesperi infusa calida aqua sinitur: man-
colis excernitur, alia infunditur, atque ter die exco-
latur. Id septem diebus fieri solet: postea additis
ad singulas minas spume argenti, quinis salis
fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die te-
ritur, & addita aqua excolatur, cumq; inalbuerit,
calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus sal-
sedinem resipiat. Demum ardētissimo sole siccata.

sedimen

eieeto prius humore, reconditur. Sin minus, mina
 spuma argyritidis diligenter teritur, addito sale
 fossili trit, triplicato pondere, in fictile nouum cō-
 iicitur, aqua infunditur, ita vt superemineat: moue-
 tur quotidie mane & vesperi, aqua q; superinfun-
 ditur, priore nequaquam effusa. Hoc fit triginta
 diebus: nanque nisi moueatur, crassescit, vsque in
 duritiem teste. Post hæc effusa leniter muria, in
 Thebaico mortario spuma argenti teritur, conio-
 eta q; in fictile aquam continens, manibus diligen-
 ter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum
 falsuginis indicium præbeat. Deinde quod ex argē-
 ti spuma candidum apparet, in vas aliud transfer-
 tur, & reductum in passillos, plumbea pyxide con-
 datur. Alij spumam argenti in fabarum magnitu-
 dines cōfractam, in ventre suillo crudo ex aqua co-
 quunt, dum viscus eliquescent, contabescat, exem-
 ptam q; cū sale pari terunt, & vt supra dictū est,
 lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spuma ar-
 genti tantundē, in sole terant, aqua continuē muta-
 ta, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantā
 vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris,
 fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum re-
 centium repurgatarum q; decoquito. Cum q; fabæ
 disruptæ debiscent, lana q; non denigretur, exemptā
 argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterū
 coquito, cyathū aquæ & parem fabarum modum
 adiciens: eadē tertio, quæ supra, facito. i. summa,

DIOSCORIDIS

tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper
transfundens in mortarium, ad singulas salis fosi-
sitij libras, adijcito octogenas spumæ argenti dra-
chmas Atticas, et terito: intermittenſq; nitri quàm
albissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta
septem indito. iterum terito, donec satis candoris cõ-
traxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto
in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, vbi con-
sidere defierit, colato: tum nouam superadijciens a-
quam, manibus probè versatâ finito vt considat,
ac rursus per colum traũcito. Alternis eadem prose-
quere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam
falsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouo
translatam, colato sensim omni humore, Soli qua-
draginta diebus sub Canicule sydus exponito, &
siccata vtitur. Elotam autem constat ad oculorum
collyria prodesse, & ad cicatricem fœditates tollen-
das, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq;
& macularum plenas.

Cerussa.

Cap. LIII.

Cerussa fit hoc modo. In fuso in vrcei oris
lati, aut fictile labellum quàm acerrimo
aceto, laminam plumbeam supra fictilis
spiraculum, subiecta prius arūdeinea tegete, firma-
to: superiectisq; velaminibus, ne halitum expiret
acetum, vbi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, hu-
more purū ad summa delatū colato, crassamētūq;
transfundito: debet quoque siccari in sole, mox tra-

*fatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea
 quod superest duri, in tenues partes redigendum,
 cribrandumq;: viciſſim eadem tertio quartoq; fa-
 cienda. Melior, quæ primò cribrata eſt, & medica-
 mentis oculorū aſſumenda. Secundum locū tenet ſe-
 quēs, & reliquæ ſuo ordine. Nec deſunt, qui ligneas
 rudes, in medio vaſe appendant, & deaſo ceu ſitu
 impoſito, ita vt acetum nō contingat, inditoq; oper-
 culo circumlinentes dimittunt. Poſt dies decem, la-
 ceato obturamento viſunt: cumq; reſoluta materia
 fuerit, reliqua, vt ſuprà diximus, exequuntur. Si
 autē quis in paſtillos velit digerere, aceto acri ſub-
 acta, diuiditur in paſtillos, qui in ſole ſiccantur.
 Aeſtate tamen ſuprà dictum opus obeundum eſt:
 ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiā
 hyeme paratur, vrceis ſuprà furnos, balnea, aut
 fornaces impoſitis aſcendens enim calor, idē quod
 ſol præſtat. Laudatiſſimam fieri putant Rhodi, et
 Corinthi, aut Lacedemone, proximā Puteolis. Tor-
 retur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, ſi-
 citili nouo, maxime Attico, tritam ceruſſam impo-
 nito, & aſidue uerſato: cumq; cinereum colorem
 traxit, eximens refrigerato, & vtitor. Eſt & illud
 vrendi genus: Trita patinis nouis ſuprà prunas
 imponitur, & ſerulacea rude mouetur, donec co-
 lore ſimilis ſandarache fiat: extractaq; ad vſus
 miniſtratur. Quæ vero ita parata eſt, ſandyx à
 quibusdā dicitur. Lauatur ceruſſa cadmiæ modo.*

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq;: insuper excrescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris, quæ lipare vocantur, pastillisq;: est autem lethalis eius potus.

Chrysocolle. Cap. LIIII.

Chrysocolle laudatissima Armeniaca, colorem porri quam simillimè reddens. Secundum locum sibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricato, & statim quam cōsederit, colato. Alteram infundens aquam, rursum terito: hæc vicissim proseguere, donec pura synce-raq; spectetur. Dein siccato in sole, & ad vsus recondito. Quod si vrere volueris, ex ea terēs quod satis esse uidebitur, patinis supra carbones apponito, & alia facito, quæ supra diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrescentē carnem coer- cet: adstringit, purgat, excoalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones cōcitāt, et necē iſſerre possunt.

Lapis Armenius. Cap. LV.

Armenius lapis præfertur lenis, colore cœruleo, perquā æquabilis, calculo carēs, & friabilis. Eadem quæ chrysocolle præstat, sed inefficacius. Quinetiam vsus habet ad pilos in palpebris

alendos.

Cœruleus. Cap. LVI.

Cœrulei origo ex ararijs metallis in Cypro : copiosior ex arena litorali : secundum quosdā sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis, lauat ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modice erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. Cap. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum insectorie dant officinae: & est spuma purpurea, innatans certinis, quam detrahant artifices siccant. Optimū existimatur quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, & laue. Inter medicamenta est, quæ leuiter adstringit, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, & reprimat vlcera.

Ochra. Cap. LVIII.

Ochram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hac, & lauatur cadmia modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat, cana cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris. Cap. LIX.

Hallucinantur qui cinnabarim minio ean-

dem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argentea arena permisto, temperari solet, alioquin non digno scitur. Fornacibus autē in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantiem halitum eructat: itaque facies incole vesicis obuelant, vt per illas spectent, nec respirando noxium aerem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta vtuntur. Cinnabaris verò ex Aphrica deferitur, & magno constat: haectenus inuenitur, vt vice versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto praeditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerūt. Vim habet cinnabaris hematitae lapillo eandē: conuenit ad oculorū medicamenta, verū efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet, Ambustis igni, & pampularum eruptionibus, cerato excepta, medetur.

Argentum uiuum. Cap. LX.

Argentum uiuum fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt: siquidem deteresa fuligo, quae calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam

omnem excedit, & defluere facit. Potum uim perniciousalem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cum absynthio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origanum, uel hyssopum cum vino, auri limata scobs, id est, rametū quā tenuissimū epotū mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica. Cap. LXI.

Rubrica Sinopis maximè probatur grauis, densa, ad iocineris imaginem vergēs, calculorum expers, cōcolor, cū diluitur, impendio fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; desertur in Sinopē urbem, in qua venditur, vnde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriā: quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs cōmisceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut clystere infusa: datur iocineris uitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. Cap. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginiensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Lemnia terra. Cap. LXIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata è Lemno insula, palustri loco. desertur, inibi

DIOSCORIDIS

electa, et caprino sanguini permista: quam incolæ
cogunt in pastillos, et imagine capræ signant: unde & sphragida egos, hoc est sigillum capræ, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciosam venena singularem, pota cum vino, & presumpta euomi venena cogit. Cōtra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale virus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur: est & dysenterie vilis.

Atramentum sutorium. Cap. LXIII.

Atramentum sutorium genere quidem vniū & idem est, molle & concretum: sed in specie differentias tres habet. Vnum namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, cōcreuit: quare ab ijs, qui Cypria metalla perficiūt, stillatium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitiū. Alterum simplici ratione sit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concreuit, tum capebit, quod pecton, id est concretitium, propriè nominatur. Tertium dicitur coctiue, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inutilidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, & complureis formulas digestū, tesserarum speciem reddētes, quæ racematim inter se cohaerescunt. Optimum esse creditur, cœruleum, graue, concretum, translucent: cuiusmodi stillatitiū

est, ab alijs lonchoton nominatum. Proximum, cō-
cretitium. Coctile vero ad insectus & denigratio-
nes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad medi-
cinæ vsum inualidius esse, experimenta docent. Va-
let adstringere, calfacere, & crustas inducere: la-
tas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuora-
tum, aut cum melle linctum: vomitus ciet: aduer-
sus hausta fungorum venena, ex aqua potum au-
xiliatur: purgat caput, aqua dilutum, & in velle-
re naribus instillatum. Vritur, vt paulo post in mē-
tione chalcitis ostendemus.

Chalcitis.

Cap. LXV.

Chalcitis præfertur similis ari, friabilis, nec la-
pidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblon-
gis venis, splendētibusq;. Huic absterforia vis inest
excalfaciens, et crustas vlceribus obducēs: purgat
que oculis & eorundem angulis hærent. In genere
leuiter exedentium est. Ad ignem sacrum, & vlce-
ra que serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, et
naribus erumpentem, cum succo porri sistit: gingi-
uarum vitia, depascentia vlcera, toussillasq;, eius
farina compescit. Vsta, & cum melle trita, oculo-
rum medicamentis longè vtilior redditur. Callum
genarum, & scabritiam absumit, abstergetq;. Fi-
stulas tollit, colliryj modo i eas adacta. Fit ex chal-
cite medicamentum quod psoricon vocant, duabus
eius partibus, cum vna Cadmiæ additis, et ex ace-
to tritis. Oportet aut in fictili obruere simo, diebus

DIOSCORIDIS

quadraginta, per Canicula ardores. sic enim sic
acrius. Idem, quod chalcitis, potest. Alij pares
utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prose
quantur. Vritur chalcitis fictili nouo, viniis carbon
ibus superposito. Modus autem vstionis in humi
dioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare de
sperit, & perfecte inaruerit: in reliquis vero, dum
mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineu
& miniatum colorem contraxerit, tum demum
eximenda est. Insidens autem spurcitia flatu ex
pellenda, mox reponenda. Torretur etianum per
flatis carbōibus, vsquedum luteo colore palle
scat: aut fictili subditis cādentibus prunis, subinde vero
sata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

Cap. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, au
ri simile, durum, quod friando auri co
lorē imitatur, & stelle modo splendet.
Vim habet, & vstionem cum chalcitide eandem,
præterquam quod psoricum ex eo non conficitur,
excessus defectusq; ratione tantum differens. Ae
gyptium autem ceteris præstat, utpote quod effi
catus habeatur, sed ad ocularia medicamēta mul
tò supradictò inferius.

Melanteria.

Cap. LXVII.

Melanteria gemine est originis: quedam in
faucibus cuniculorum, quibus es eruitur,
salis modo concrescit. Alia vero in summa facie
supradictorum

facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdã regionibus, fossilis quedam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quàm & misy.

Sory.

Cap. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melanteriam esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, ei non absimile: verum sorci virus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptum, quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum virus olens, ita vt stomachus in uomitione effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uestionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex uino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ uestionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur: præter salem, & uini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com.

busta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges. Cap. LIX.

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quo dda
enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur ex luto cuiusdam
inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis
sarmentis uritur. Diphryges ideo vocatum est, quod & à sole, & à sarmentis uratur, are scat, et
ferme torreatur. Alterum perfecti aeris, quasi subsi-
dens fax est: siquidem post frigida aquae offusio-
nem, ut supra retulimus, cum de flore aeris differere-
mus, sublato aere, fornacum ima parte cohaerens id
genus inuenitur, & adstrictionem & gustum ae-
ris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyritem, ut cal-
cem multos dies cremant in camino. cumque colorem
rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam
tradunt hoc ex sola materia, quae lapidem aeris gignit,
fieri: quando in lectis aeris assata, & in scro-
bes translata peruritur. Tunc enim ambiente scro-
bis locum comprehendit, & exceptis lapidibus nihi-
lo minus inuenitur. Praefertur quod saporem aeris
reddit, aeruginisque, adstringens, & vehementer exic-
cans lingua. quod sibi exusta ochra non vendicat:
quae cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adstrin-
gere, perpurgare, extergere, siccare, ex crescentia con-
sumere, ulcera serpentia, & quae cacoetha vocant,
ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthi-
na aut cera o exceptum discutit.

Auripigmentum. Cap. LXX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimū existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vnū supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidū, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua viris carbonibus subiectis, assiduūq; versatur, donec igne flagret & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem, crustas cum vehementi vredine, & violēto morsu excitat: reprimat quae excreſcūt, et capillos euellit.

Sandaracha. Cap. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinna-
baris colore, sulphuris viris redolens. Dos eadem & uestio, quae auripigmento: explet alopecias, resina excepta, & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad nariū oriūq; vlcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta exulſipientibus. Suffitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, raptō per fistulam nido re vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis

DIOSCORIDIS

cum resina in catapotio optimè datur .

Alumen.

Cap. LXXII.

OMne aluminis genus ferè in Aegypto, et in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygia, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recēs, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulose aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Dænatur in rotundi genere, quod manu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atq; validius adstringens, præterea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidi probatio, ut sit limpidum, lacteum, æquale, & semper succo madēs, sine lapidibus, atq; quondam coloris igniculum expirās. Vim habent excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis

lorum offundunt: genarum carnem, ceterasq; ex
 crescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius
 intelligitur. Vri & torrerichalcitidis modo debet.
 Putrescentia ulcera cōpescunt: sanguinis fluxiones
 inhibēt, gingiuas humore pręgnantes cōprimunt:
 motus dentium cū aceto & melle firmāt. Prosunt
 cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularum,
 & fluxionibus aurium, cum sanguinalis herbe
 succo: lepris cōueniunt cum brassicę folijs aut mel-
 le cocta: item pruritui, & unguium scabritijs, pte-
 rigijs, & pernionibus, aspersa cum aqua. Valēt cū
 aceto face, & galla, pari pondere cremata, ad pha-
 gedænas ulcerum, & cum salis duabus partibus,
 ad vitia quę pascunt: fursures cum eruo & pice il-
 lita abstergunt: ad lendes, pediculos, ambusta, cum
 aqua illita auxilio sunt. Cōtra tumores, & graue
 alarū inguinumq; virus, illinuntur. Ex Melo autē
 aduectum, mulieribus pręstat ne concipiant, ante
 coitum ori uulue inditū: partus quoque extrahit:
 gingiuas, si caro excreuit, uue ac tonsillis accōmo-
 datur: ori, auribus & uerendis cū melle illinūtur.

Sulphur. Cap. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod
 apyrō uocāt, nitedule modo splendidū, perlu-
 cens, minimē lapidosum. Probatur in gene-
 re sulphuris ignē experti, quod uiret, ac prępingue
 spectatur. Plurimū in Melo & Lipara gignitur.
 Supradictum sulphur calfacit, discutit, & cele-

DIOSCORIDIS

riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, puru-
lenta extusis et tibus in ovo sumptum, aut suffitum:
præterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, liches-
nas, scabros ungues, cum resina terebinthina mi-
stum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras ef-
ficax est: vitiliginis tollit: scorpionis ictibus, addita
resina, medetur: cum aceto verò, draconis marini
scorpionis que plagas sanat. Pruritus, toto corpore
erumpentes, cum nitro detersum, sedat: regium mor-
bum emendat, insparsum fronti cochlearis mensu-
ra, aut in sorbili ovo sumptum. Facit ad grauedinē,
& destillationes: sinus lores quoque conspersum inhi-
bet: podagricis, cum aqua & nitro illitum, condu-
cit grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fi-
stulam hausto, sanat: lethargicos suffitu excitat:
erumpentem vndeunque sanguinem sistit: contu-
sis auribus, cum vino & melle illitum medetur.

Pumex.

Cap. LXXIIII.

Pumicis probatio, ut magnopere lenis, spongio-
sus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, &
candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus ob-
rutus, & ubi canduerit, extractus, vino restingui-
tur odorato: iterumque incensus extinguitur: & ter-
tia vstione exemptus, & per se refrigeratus, ad
usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abster-
gere: purgat cum calfactione, quæ caliginem pu-
pillis offendunt: explet vlcera, & ad cicatricem
perducit: excrescentia cohibet. Fit ex farina eius deu-

tificium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisquam in bullientem vrceum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal.

Cap. LXXV.

Sal fossilis efficacior est, cōmuniter, si est candidus, calculus vacans, & perspicuus; densus, & quali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, & equalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, et Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multo validissimus est Phrygius nomine tæpeus, aut triteus, aut gantæus. Salis natura in cōmune perquā utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quòd aliis alio sit præstator. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus. Excrecētia in oculis reprimat, & pterygia cōsumit; ceterasq; carnis extuberationes tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorū tumores auxiliatur, doloresq; in saccis fotu mitigat, & pruritus sedat, ex oleo et aceto infrictus. ad ignē, donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasq;. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus lenat: tonsillis usaq;, cum melle tostus. Vlceribus in ore

DIOSCORIDIS

manantibus, gingiuis, quas humor uexat, & phagedenis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origane, melle, hyssopo: aduersus cerosten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendra morsus, cū melle & aceto: aduersus uestiarum ictus, et teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo uitulino: furunculos cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in linzeolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, et melle: ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cū aceto: ignes sacros, et ulcera quæ serpunt, cū aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter operatus ne exiliat, conditusq; prunis, usquedum efferuescat. Aliqui fossile subactō polline oblinunt, et carbombus subiciunt, usquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, et siccatus in ollā coopertā mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat. Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramē.

tum est in exilibus petris inuentum, cui uis eadem
que sali.

Muria.

Cap. LXXVI.

Muria effectus salis præbet, abstergitq;:
dysentericis infunditur, etiamsi nomē
intestina corripit: & ischiadicis ueteri
bus. Ad fetus, aqua marina usum præstat.

Flos salis.

Cap. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus ta-
men quibusdam innatat. Assumendus qui
crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. In-
terdum longè magis uirus olet, gustuq; mordacior,
& pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut
scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non ni-
si oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte,
etiam aqua, diluente factitium colorem. Adulce-
ra, que cacoethe uocantur, & phagedenas, geni-
talium nomas, & purulentas aureis, efficax est:
oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit.
Emplastris unguentisq; coloris causa, ut rosaceo,
miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in uino aut
aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur
acopis, & smegmatis, que albandi capilli gratia
componitur: & in uniuersum acris est, & feruene-
tis nature, ut sal.

Nitrum.

Cap. LXXVIII.

Pæfertur nitrum leue, roseo colore, aut can-
dido, in foramina dehiscens, perinde quasi

DIOSCORIDIS

spongiosum quiddam, quale ex Bumis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens: qualis ex Philadelphia Lydia defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur. Vim & vitionem salis habet, tam nitrum, quam spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapia, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, uti ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuât, & lepras abstergunt. Cum aqua autē calida aut vino infusum, inflationes, purulentas aurcis, & sonitus earandem sanat: sordes expurgat, cū aceto instillatum. Canum morsibus ex asinino adipe aut suillo medetur: resine terebinthine admistum furculos aperit: aquæ inter cutē cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: is verò, qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio, isq; qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisq; iam remissionibus, & luxatis, cum cerato: in resolutione lingue, panis commode permiscetur. Aliqui supradicta carbombus vrunt, subiecta prius testa nona, donec incandescant.

ELigenda fæx maxime à vino vetere, Italico :
 sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti viribus
 longè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè dili-
 genter siccatur. Sūt qui noua testā igni largo vrāt,
 vsque dum penitus incendatur. Alij viuis carboni-
 bus facis glebam obruunt, & idem opus prosequiū-
 tur. Experimentum est legitimæ vstionis, vt aerio
 nitore inalbescat, linguamq; tactu vrere videatur.
 Eadem vrende facis aceti ratio. Vis ei supra modū
 vrens, & abstergens : vlcera ad cicatricem perdu-
 cit, adstringit, vehementer exest, siccaturq; . Sed rec-
 ti vtendum est, quoniam celeriter exanimatur: pro-
 inde non nisi in reconditorio, & vase aliquo repoa-
 ni debet. Lauatur, vt pompholyx . Quæ vstionem
 experta non est, tumores & per sese, & cum myr-
 to cohibet: ventris stomachiq; fluxiones illita sistit:
 muliebri profluvium; imo ventri aut genitalibus
 imposita, mitigat: panos discuit, nondum exulcera-
 tos, & tubercula: rigentes mammās, suiq; lactis
 impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Crema-
 ta verò, vngues scabros cum resina aufert: addito
 lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elo-
 ta oculorum medicamentis, vt spodos, adijcitur: ci-
 catrices eorum & caligines eadem abstergit.

Calx uiua.

Cap. LXXX.

CAlx viua hoc modo fit: Marinorum bucci-
 norum testas igni condito, aut feruenti cli-

DIOSCORIDIS

banc, nocte dimittito: postera die, si candidissime fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouum conycito, & exacte pannis operiens, noctem unam conquiescere finito: manè eam extrahens, ubi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è uili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, mollit & dissipat: ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. LXXXI.

Gypsum uim habet astringendi, obstruendi: sanguinis eruptiles sudoresq; cohibet: sed potum, strangulationis modo iugulat.

Sarmentitius cinis. Cap. LXXXII.

Sarmentorum cinis urendi uim habet: cum axungia autem uel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimat: serpentium canumq; moribus illitus ex aceto medetur: crustas obducētib; medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuum contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale, & melle.

Alcyoniū quinq̃ue esse genera compertum
 est: vnum enim spissum, acerbi saporis,
 spongiosa facie, item tetri odoris, pondero-
 sum, et piscem olens, quod plurimum in litoribus
 inuenitur. Alterum pinnula oculorum aut spōgie
 simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens.
 Tertium vermiculi forma, & colore magis purpu-
 reum, quod Milesium quidam vocant. Quartum
 succidis velleribus non dissimile, multis inanitati-
 bus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore,
 asperum, parte interna quodāmodo pumicosum, fo-
 ris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta
 insulam Beshicon appellatam gignitur, patrio no-
 mine halos achnen vocant. Duo priora in scemina-
 rum smegmata assumuntur, contra lentigines, li-
 chenas, lepras, vitilignes, nigritias, & maculas in
 facie reliquoq; corpore. Tertiū ūs, qui difficili vrie
 na vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, ido-
 neum est: item renibus affectis, aque inter cutem,
 lieni. Vltimum autem, & ex vino illitum, alopecias
 replet. Postremum dealbandis dentibus aptū est:
 in alia smegmata, psilothraq; assumitur, cum sale
 mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit,
 tum sale in crudum fictile mittat, & oblinens va-
 sis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum si-
 glinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus reco-
 dat. Lauatur vt cadmia.

DIOSCORIDIS

Adarces. Cap. LXXXIII.

Flt in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidis et palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cano proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat, qui in alio concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiae. Cap. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ cōtrarias dotes habent. Vritur ea ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine, vulnerariae sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæue conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetustæ autem inutilis. Arida ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosq; laxant: siccae recentes et vacuae senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, imposito siccant: sanguinis profluvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aride lippitudini auxiliatur: & vbi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum profluentem sanguinem sistit.

Candida cura sunt, & molliſſimis recentes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris coheret: inſolantur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectante, & qua abſciſſæ fuerunt, deorſum. Si uerò æſtina ſerenitate ad lunam ſternantur, perſuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Corallium. Cap. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appellant, marinum eſſe fruticem conſtat, qui alto extractus, duratur ſtatim atque emergit, tanquam offuſo aere protinus conſcreſcat. Plurimum inuenitur ad Syracuſas, in promontorio cui Pachyno nomen eſt. Laudatiſſimum, rubens, colore antherici aut ſandycis ſaturatæ, nec ſecus terenti facile cedens, æquabili uſque quaque concremento, ruſus algæ aut ſuci marini odore, quàm ramiſſiſſimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiâ coit, ſcrupuloſum, inane, & lacunoſum, vitioſum exiſtimatur. Adſtringit, & refrigerat mediocriter: excreſcentia coerceat: oculorum cicatrices abſtergit: vlcerum caua, & cicatrices explet: contra ſanguinis reiectiones magnopere efficax eſt, vrinæ diſſicultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem abſumit. Quod antipathes uocat, coralliū eſſe arbitrat, ſpecie tātū diſtās. Eſt autē colore nigro, arboris figura, ramiſſū magis. Vires ſupradicti habet.

DIOSCORIDIS

Phrygius lapis. Cap. LXXXVII.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia
utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in
Cappadocia. Optimus habetur pallidus,
modicè grauis, non solida corporis compage, intera-
cedentibus albis segmētis, ut in cadmia. Vritur au-
tem vino optimo persusus, viuisq; carbonibus obru-
tus, perflatur assidue follibus, donec mutato colore
rufescat: rursus extractus eodem vino restingui-
tur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: atten-
dendum tamen, ne minutim confringatur, et in fu-
liginē euanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, ex-
purgans: vlcerebus crustas quadātenus inducit,
ambustis cū cerato medetur. Lavatur ut cadmia.

Asius lapis. Cap. LXXXVIII.

Asius lapis assumi debet puniceo colore, le-
uis, fungosus, item friabilis, scissiles ve-
nas lutei coloris ad inum actas habens.
Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insi-
dens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs
punici simili, ad luteum vergente: admotus lingue
aliquantum mordet. Vim habet vterque adstricto-
riam, & modicè erodentem, admistus liquide pici,
aut terebinthine, tubercula discutit. Longè vali-
dior flos existimatur. De cetero siccatus flos, vete-
ra vlcera & cicatrici repugnantia sanat: ex-
crescentia cohibet, tetrāque vlcera & fungis
similia, cum melle expurgat; vlcerebus causa explet,

& expurgat cum melle, depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cat. aplasma ex eo podagrus, misto fabæ lomëto: & lienosis, ex aceto & uina calce. Prodest flos ex melle phthisicis linctus. Podagrici iuuantur, pedibus in solio ex eo lapide excanato inditis. Fiunt quoq; pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt. cum vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmia modo lauatur.

Pyrites. Cap. LXXXIX.

PYrites lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas edens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continue flatur sollibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, et ubi ad fuluum colorem vergere coeperit, extrahunt: efflatq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa solum vritur. Ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet cadmia. Tã crudi quã vstis vsus est, excalfacere, abstergere, offusam oculi caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescëntia in carne cohibet, sed calorem quendã et adstrictionem parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellant.

Hæmatites. Cap. XC.

Hæmatites optimus habetur friabilis, satur

DIOSCORIDIS

rato colore niger, durus & suapte ingenio æqua-
tis, nulla sorde admista, nulloq; xonarū discursu.
Vini habet adstringentem, & excalfactoriam ali-
quantum extenuantemq;: oculorum cicatrices &
scabritiā cum melle purgati cum lacte autem mu-
liebris lippitudini fractis, & oculis cruore suffusis
conuenit: bibitur cōtra difficultatem vrinæ, & flu-
xiones mulierum in vino: & ab ijs qui sanguinē
reiecerunt, cum succo punicī mali. Finit ex eo coti-
cula & collyria oculorum vitis apta. Vritur vt
Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est,
vt modicē leuis fiat, & bullis quibusdam intume-
scat. Sūt qui hæmatiten ita adulterāt: Dēsam gle-
bā rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ
eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui
feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; in-
teriecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad-
cotem hæmatitæ colorem reddat: quod si ita res se
habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & sub-
inde conspicientes, periculum faciunt: si quidem in
cinere diu demissus, colore mutato diffunditur. Co-
arguitur malè cōfectus, primū scissilibus venis:
quippe in rectos venarum discursus refringitur.
At hæmatites lōgē secus se in colore habet: nanq;
hic floridum reddit: hæmatites vero saturatiorem,
atq; cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica
rubrica. Fit et è magnetē lapide, vehemēter ambu-
sto. In Aegypto spōte naturæ cū metallis enascitur.

Schistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probatur max. me qui croci colorem emulatur, friabilis, suapte natura sissilis, concremento & alteruo coherentium venarum discursu, pectinū modo, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatisæ, sed ad oīa infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus: ad prozidentia, rupta, itē genarum crassitiem, & vnas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates.

Cap. XCII.

In gagatarum lapidū genere præferendus, qui celeriter accēditur, et odorem bituminis reddit. niger est plerunq; & squallidus, crustosus, per quē leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprehendit fonticum morbū suffitus, recreatq; vuluæ strangulationes: fugat serpentes ridore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua i fluēs amnis i mare offunditur, proxime oppidū quod Plagiopolis dicitur. Vocatur aut et locus et amnis gagas, i cuius faucibus q lapides iueniuntur.

Alij plures lapides.

Cap. XCIII.

Lapis thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, et oleo restingui: quod in bitumina accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad æreruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

DIOSCORIDIS

Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere,
 ut crassos humores eliciat. Sūt qui magnetem cre-
 matum pro hæmatite vendant. Arabicus lapis ma-
 culofo ebori similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas
 exiccat: eius cinis dentificio optimus. Galaëtis-
 tes appellatur, quod lacteum succum resudet: cine-
 rei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum
 fluxiones & vlcera conuenienter illinitur. Oportet
 autem in aqua tritum, pyxide plumbea recōdere,
 propter vim glutini, quod ei obhæret. Melitites om-
 nia galaëtita similis: hoc tantum interest, quod
 dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galaëtites
 effectus. Morōchthus lapis, quem aliqui galaxiā,
 aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nasci-
 tur: quo, utpote molli, & facile liquecente, linte-
 nes dealbandis vestibus vtuntur. Spiracula corpo-
 ris obstruere videtur, conueniens ijs, qui sanguinē
 expuunt, celiacis, & vesica doloribus, cum aqua
 potus: itidem fluxionibus vulue, impositus velleri.
 Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim
 caua, atq; delacrymationes sistit. Idem cerato exce-
 ptus, vlcera quæ fiunt in teneris partibus corporis
 ad cicatricē perducit. Alabastrites vocatur onyx,
 crematus, resina aut pice assumpta duritias discen-
 tit: Stomachi dolores cum cerato leuat, & gingi-
 uas cōprimit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia
 gignitur, subviridi colore iaspidem imitatus: cum
 diluitur tamen lacteum succum reddit. Vehemen-

ter mordet: tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glaudus effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis equaliter inter se distantibus, quasi industria detornatis: solutus nullam qualitatem manifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cū calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in vesica comminuerè. Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis: quo, vtpote flexili, telas & vela tātum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora exeunt. Sapphirus lapis, percussus à scorpiōe potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Exerescētia in oculis, vnasq; & pustulas inhibet, et ruptas membranas cogit. Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere, qui cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, cādidus, translucens, lenis. Huius ramenta comitialibus impotu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arborea adalligato eodem frugifera redduntur. Iasspidum quedam smarago

DIOSCORIDIS

dum imitatur, alia crystallum, colore similis pituitae: alia non dissimilis aeri, ob id vocatur aerix usque: alia veluti fumo infecta, quae capnias ex argumento vocatur: quaedam lineis albis et resplendentibus praecingitur, Assyrios appellata: alia terebinthinæ similis, quae terebinthixusa dicitur: alia colore cal-
 laida gemmam emulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensa. Aetites lapis est veluti prae-gnans, cum quatitur, alio in vitro sonante. Grauidis continet partus, cum lubricae sunt vulvae & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furem coar-guit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut glaucino, aut alio excalfaciētes, comitiales magnifice iuuat. Ophite genera multa: quidam ponderosus & niger: alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdam candidis intercin-
 ctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapides in spongijs inueniuntur, qui vesicae calculos rupiunt, in vino poti. Lithocolle glutinum, quo lapides coniunguntur: conflatur autem ex marmore, lapide

Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incōmodos oculus pilos replicare. Ostracites testa similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtūtur. Menses drachmæ pōdere potus, ex vino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilici pōdere, sœminis præstat ne cōcipiāt. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est, quo annularij sculptores lapides expurgāt, ad erodendum & vrendum utilis: gingiuis, quas humor vexat, prodest: dentifiticio commendatur. Arena è litoribus sole ferue facta, hydropicorum tumores exugit. si capite tenus, in ea obruantur. Torrens solet ad aridos fatus, pro milio aut sale. Ecote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopicias ad pilū reducit: virginum māmās cohibet: nec increscere patitur: potum ex aceto, lienē absūmit, & comitiatibus prodest. Geodes lapis, adstringit, siccatur, caligines oculorū discutit. Allitus aut ex aqua, testium māmārumq; inflammationes sedat.

Terra.

Cap. XCIIII.

OMnis terra ad medendi vsum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatūque obducendi, occludendique. sed specie distat, cum alia adiūctis quibusdam ad alia sit utilis. Eretriades due sunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum co-

DIOSCORIDIS

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per aramē
ta tractim ducatur, lineam violaceam refert. La
uatur vt cerussa, aut hunc in modum: Teritur seor
sum, & cum aqua, & vbi pessum ierit, humor le
uiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur in
terdiu, adiecta aqua, vt vespere confidat: anteluc
nis colo excernitur, & demum in sole trita si fieri
potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desidera
tur, pastilli magnitudine cicercis in fictile perfora
tum coniunguntur, oreq; vasis diligenter obturato,
supra carbones candentes continenter follibus per
flantur: vbi vero cinis in fauillas se conuertit, aut
aereum colorem contraxit, exempti reconduntur.
Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, le
uiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta
conglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tan
genti lingue glutinis modo adherescēs, mollis, suc
cosa, friabilis: cuiusmodi est, quā aliqui collyrion
vocāt. Dux enim species eius: vnā, antè diximus:
altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo
prædessa. Vritur ac lauatur vt eretria, vimq; consti
milē habet: sanguinis reiectionis sistit, et fœminis
fluxione vulue laborantibus, cum flore syluestri
punice datur. Testium & māmaram inflāmatio
nes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores
arceat: contra serpentium morsus & venena, pota ex
aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra iue
nitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, vt reo

splendeat. Probatur candore & duritia. Vis ei ad-
 strictoria, & refrigerans : prodest stomachicis po-
 tus : sensus hebetat : verum ad fluxiones oculorum
 & ulcera, cum lacte efficax est partus, vt tradūt,
 adligatus accelerat, & conceptus sceminarū custo-
 dit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum,
 Samia similis : est aut crustosa, albaq; , sed fictitij
 formis differens. Vis eadē quæ & Samiæ : extēdit
 faciem, & erugat, atq; splendā reddit : colorē in
 facie & corpore toto commendat. in balneis pro ni-
 tro deterget. Eadē præstat Selinusia : maximè lau-
 datur, quæ uehementer resplendet, candida, friabi-
 lis, et humore dilui celerrima. Cimoliz duo genera,
 candida & ad purpureum inclinans. Optima exis-
 stimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, ta-
 ctuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, paroti-
 das, et alia tubercula discutit : ambusta igni, si stas-
 tim cimolia oblinantur, pustulas non sentient : tes-
 tium duritias, & totius corporis collectiones cohi-
 bet, igni sacro imponitur. In summa, vtraq; multū
 in medicina commendatur, si incorruptæ originis,
 nec spuria assumatur. Quæ pnigitis dicitur, colore
 fere eretrie similis est, grandioribus tantū glebis :
 manum si quis admoneat, refrigerabit : tactu lins-
 guæ, vsque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui
 effectus idem qui cimolia, paulo tamen infirmior.
 Hanc aliqui pro eretrieade vendunt. Fornacea teste
 uehementer tosta, crustas ulceribus obducit : quæ

DIOSCORIDIS

re prurigini & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, strumas discutunt, cerato excepta. Fornacum terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cineream eretriad imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiligines, & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chlore dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra, & omni alia in vniuersum eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attingerit, facile resoluatur. Ex ampelide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra piceæ lógos carbones referens, modicè assulosa, æquali splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Usus eius ad illinendas vites sub germinationis tempus, utpote cum innascentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria. Cap. XC V.

Fuligo qua pictores utuntur, ex vitrarys officinis colligi solet: si quidem ei palma tribuitur, Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax:

fracta cum rosaceo terato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. XCVI.

Atramentum, quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gummi terne fuliginis vncia adijciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria fuligide, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sesquencia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè solvatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem vlceribus, sua sponte decedit. Ceterum habes, amicissime Aree, ferè quæ tradenda duximus pro operis modò, quem destinaueramus, & materie auxiliorumq; medicinalium copia.

QVINTI LIBRI
FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE VENE

nis, quoque modo arcean-
tur, vitenturque,

LIBER VI.



VPERIORIBVS, amicis-
sime Arce, libris tradidimus de
aromatibus, oleis, vnguentis,
arboribus, et earundem fructi-
bus, lacrymis q̃: item animalis-
bus, melle, lacte, seuo, frumen-
tis, oleribus, herbis, radicibus,

liquamētis, vinis, metallis q̃. In hoc uero totius ope-
ris ultimo, facultates medicamentorum recensēbi-
mus, que prolesse nobis, aut officere possunt. Vita-
ta igitur orationis prolixitate, opus institutū prose-
quamur. Huiusmodi autem tractatus, cū bifor-
mam distributus sit: in partem venena præcauē-
tem, ita ut ne fallant sumentes, aut si quando per
imprudētiā dentur, ut tum quoq; innoxia fiāt,
irrita q̃: & in rationem ijs succurrēdi, qui iam no-
xiam sentiunt: primum disseram de præcauēdi mo-
do, quem esse difficillimum plerique maiorum arbi-
trātur, quod dantes clām venena, ita insidias tem-

perant, vt peritissimum quenque decipiant. Si quis-
dem venena sua amaritudine, permistis dulcibus,
spoliant, & graue odoris virus mistura odoramen-
torum eximunt: aut medicamenta immiscunt, que
tuende sanitatis gratia dari putantur: & præser-
tim in ualitudine, ut absinthium, tragoricum,
satureiam, aut hyssopū, quinetiam thymum, irim,
origanū, abrotonum, castorium, aut si quid medica-
mentis purgatorijs cognatam habere qualitatem
videatur. Aut potionibus inserūt: vt uinis asperis,
iuribus, passo, mulse aquæ, musto: succis, vt in cre-
more lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs
que assumuntur, edulij speciem referētibus. Quare
qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare de-
bent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum,
aut acidorum, abstinere: nec sitibūdī affatim bibe-
re, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad sa-
porem horum diligenter attendere, præsertimq; po-
tu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appe-
titu, qualitates agerrimè postea concoquuntur. In
aegris quidem facile cauemus potiones auxiliij præ-
textū dari solitas, quas offerunt improbi ueneficio-
rum artifices: itaq; ob id laborantes morbo nō per-
inde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne
facile incauti seductiq; homines capiātur dolis ve-
nificorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest
expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, que ve-
nenum vires hebetēt, et inefficaces irritasq; red-

DIOSCORIDIS

... sunt cum inglandium nud
 ... decant; id est
 ... vino. Item fo
 ... Lemnia phragis
 ... aut rube folia
 ... caricas duas, et
 ... nullo reuini genere
 ... eundem effectū
 ... Michrida
 ... temperas
 ... peculiares quia
 ... modo consti
 ... qualitate, cum
 ... reuini disa
 ... reuini vires frangunt;
 ... mea
 ... in fia
 ... necess
 ... agentia
 ... dis
 ... Iam pri
 ... conue
 ... struere.
 ... bac
 ... digne
 ... a
 ... decidant,
 ... ma

Eiantur, vt phalangia, stelliones, & alia quadā re
 ptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet:
 namq; reptilia odore vini illiciuntur, quæ intere-
 dum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum
 vero delapsa immersaq; expirarunt, & exitū cau-
 sas haurientibus attulerunt. Sed hæc hæctenus di-
 cta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateāt. Quod
 si qui sua sponte, aut ex quorundā insidijs sumpse-
 runt, auxiliari primo quoq; tempore oportebit: si
 quidem dum comites singulorum venenorum nota
 expectantur, immedicabile sit venenum; & pauli-
 sper neglectū, medicamentis ægre cedit. Quare si
 qui pro comperto se virus sumpsisse intelligāt, &
 fateantur, aut eorum, qui aderant, testimonio con-
 stet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile
 peculiari naturæq; constitutioni restituemus. Neq;
 enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusce-
 modi frustra adhiberi contendunt. Quo enim mo-
 do morbi, quorum causæ cæcæ latētesq; corporibus
 insident, melicinam admittunt, & quæ forinsecus
 incurrunt venena, medēdī rationem aspernantur?
 Nequē uero omnes morbi pro causarum ingruen-
 tium magnitudine, proq; antecedentibus affectio-
 nibus qualitatibusq;, quibus sit opportunum cor-
 pus, uel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medica-
 mentis. Quod si qui forsā obmutescētes, aut te-
 mulenti, aut nolentes alioqui uenenū à se egeri, nullā
 nobis eius cognitionem præbeant, tum pro-

DIOSCORIDIS

sinus accedendum ad ea, quæ cōmuniter epotia quibus-
 cunque venenis opitulari consueuerunt. Atqui
 nullum magis in omnia valens auxilium dari pos-
 test, quàm vt proximo loco virus foras exhauriat-
 tur, priusquam inualescat. Quare sine mora, cali-
 dum oleum ex aqua, aut seorsum, vt vomitare co-
 gantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci ne-
 gat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut li-
 ni semine, aut trago, vrtica, scenograceo, aut halice
 decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo
 vomitionibus exigēt vi illa sua laxatrice, aut nau-
 seam ciente, sed aluum quoque subducēt, & corpo-
 rum inanitione ita aduersabuntur, vt acrimoniae
 venenorum hebetent: Id quod euidenter huiuscemo-
 di argumēto deprehendere licet: Esto, vt quisquam
 vina calce vel fæce, aut cantharidibus, aut alio
 quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum
 oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet.

Atqui neque uehementer adstringi corpus, neq; re-
 frigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiā vo-
 mitus non ob id modo quod vacuet, & noxium hu-
 morem excernat, iuuamētum adfert, sed quod as-
 sumptum virus nunquam odore, coagulatis grui-
 nis aut colore, prodat: quippe cū odore & amaritu-
 dine, meconium: colore, cerussam, gyssimum: grui-
 nis, lac aut sanguinem animalis recens iugulati
 ostendat. Nam grauis odor regestorū, leporis mari-
 ni, aut rubetæ beneficia deprehēdit, ita vt nonnulla

ab ijs

Ab ijs remedia peti possunt, ad idonea singulorū au-
xilīa transeuntibus. Oleo etiam malua decoctum
admiscetur, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut
pinguium carniū iura, aut lixiuium lignorum ci-
nere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus
fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt inte-
stinis reliquias, clystere acri deuocentur. Facit &
nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & vic-
na vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpi-
gues pisces, vetustæ carnes pinguesq; , & quæ adis-
pe aut recenti butyro parantur. Alium namq; sub-
ducunt, vti diximus: & stomachum resoluentia,
promiorem ipsum ad vomitionem reddunt: & ve-
nenorum acrimonias hebetant, atque meatus ob-
struentia, celerem virium penetrationem inhibent.
Quinetiam medicamenta dantur, quæ cōmuni do-
cte prosunt: vt Lemnia terra, agaricum, abrotonū,
irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calamin-
thæ, nardum gallicum, castorium, ferula virentis
medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser
aut laserpitium, sagapenum, peucedani succus, aut
panacis, & radix, quam magudarim appellarūt,
aristolochia longa, sylvestris rutæ semen, & beco-
nica, quam cestron nominant, folia: singula cū vi-
no drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet
polij decoctum, & seseli, et liquida pix linctæ. Ma-
gnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis
scripta reliquimus. Communis ratio præstandi au-

DIOSCORIDIS

xilij ita se habet. Caterum ab ijs qua consueuerunt
 euenire, communia remedia sumptitari possunt. Fe-
 re enim vires venenorum quam plurimorum, in affe-
 ctus cōsimiles corpus tandem redigunt. Quam ob
 causam plerisque communia conducunt auxilia: va-
 ria etenim sunt venenorum genera, communes ta-
 men nec multi ijsdem affectus oriuntur. Neque fieri
 potest, ut omnes concurrentesque casus, quæ sympta-
 mata vocant, unum uenenum sequantur. Alioquin
 superuacanta fuisset venenorum singulorum tradi-
 tio cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque
 vero in uno eodemque promptum est inuenire, ut quis
 stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesi-
 cæ dolore uehementer crucietur, ut singultiat, eroda-
 tur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuel-
 latur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, ve-
 terno prematur, vertigo obuersetur, caligent sen-
 sus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre cō-
 flictetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur,
 crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore
 sugilletur, palleascat, desipiat, stertat, viribus deficia-
 tur, et pleraque alia faciat, patiaturque: singula enim
 in generales affectus deducta, pauca numero, &
 communia ea demonstrant, quæ euenire consueue-
 runt. Quare in singulis, quæ supra diximus, nō fa-
 cile fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam ori-
 & linguae erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renū
 inflammatio, uehemens urinae difficultas, et intera-

dum cruoris cum eo exitus, lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in cætharidibus modo potius reperiuntur, sed in crucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modo eos, qui meconium hauserunt, veterno aut sopore premi, stertere, linore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritum sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mandragoram aut cicutam deuorauerunt. Delirium non hyosciamus tantum infert, uerum etiam quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile unum uni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatumque virus prodere possit: maxime, quod hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possit, si ad ea respexeris, quæ sumus dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim atque præsentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus, communia reliquorum uitiorum remedia, compositionesque flagitent, cum uenefica proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum

DIOSCORIDIS

dum imitatur, alia crystallum, colore similis pituitae. alia non dissimilis aeri, ob id vocatur aerixusa: alia veluti fumo infecta, quae capnias ex argumento vocatur: quaedam lineis albis et resplendentibus praecingitur, Assyrios appellata: alia terebinthinæ similis, quae terebinthixusa dicitur: alia colore tal laida gemmam emulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensa. Aetites lapis est veluti praegrans, cum quatitur, alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vulvae & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut glaucino, aut alio excalfaciens, comitiales magnifice iuuat. Ophite genera multa: quidam ponderosus & niger: alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapides in spongijs inveniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur: conflatur autem ex marmore, lapide

Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incōmodos oculus pilos replicare. Ostracites testa similitudinem habet, crustosus, & in la minas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtūtur. Menses drachmæ pōdere potius ex vino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilici pōdere, fœminis præstat ne cōcipiāt. Cum melle autem impositus, mammarum inflam mationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est, quo annularij sculptores lapides expurgāt, ad erodendum & vrendum vtilis: gingiuus, quas hu mor vexat, prodest: dentifitio commendatur. Are na è litoribus sole ferue facta, hydropicorum tumo res exugit, si capite tenus, in ea obruantur. Torret si solet ad aridos fatus, pro milio aut sale. Ecote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alo pecias ad pilū reducit: virginum māmās cohibet: nec increfcere patitur: potum ex aceto, lienē absu mit, & comitialibus prodest. Geodes lapis, adstrin git, siccatur, caligines oculorū discutit. Illitus aut ex aqua, testium māmārumq; inflāmationes sedat.

Terra.

Cap. XCIIII.

OMnis terra ad medendi vsum recepta, sum mam & primam vim habet refrigerandi, meatūsque obducendi, occludendique. sed specie di stat, cum alia adiūctis quibusdam ad alia sit vti lis. Eretriades due sunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum co-

DIOSCORIDIS

lorem vergens, perquam mollis, quæ si per aramē
 ta tractim ducatur, lineam violaceam refert. La
 uatur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur seor
 sum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor le
 niter excolatur: siccata solibus, iterum teritur in
 terdiu, adiecta aqua, ut vespere consi dat: antelucā
 nis colo excernitur, & demum in sole trita si fieri
 potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desidera
 tur, pastilli magnitudine cicercis in fictile perfora
 tum coniunguntur, oreq; vasis diligenter obturato,
 supra carbones candentes continenter follibus per
 flantur: ubi vero cinis in fauillas se conuertit, aut
 aereum colorem contraxit, exempti reconduntur.
 Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, le
 niter mollientem: cana explet, & sanguinolenta
 conglutinat. Samia præfertur candida, levis, tan
 genti lingue glutinis modo adherescēs, mollis, suc
 cosa, friabilis: cuiusmodi est, quā aliqui collyrion
 vocāt. Dux enim species eius: vnā, antè diximus:
 altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo
 prædēsa. Vritur ac lauatur ut eretria, vimq; consi
 milē habet: sanguinis reiectionis sistit, et fœminis
 fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris
 punice datur. Testium & māmaram inflāmatio
 nes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores
 arcet: contra serpentium morsus & venena, pota ex
 aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra iue
 nitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, ut re

splendeat. Probatur candore & duritia. Vis ei ad-
 strictoria, & refrigerans : prodest stomachicis po-
 tus : sensus hebetat : verum ad fluxiones oculorum
 & ulcera, cum lacte efficax est partus, vt tradūt,
 adligatus accelerat, & conceptus fœminarū custo-
 dit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum,
 Samia similis : est aut crustosa, albaq; , sed fictitijs
 formis differens. Vis eadē quæ & Samia : extēdit
 faciem, & erugat, atq; splendidā reddit : colorē in
 facie & corpore toto commendat. in balneis pro ni-
 tro deterget. Eadē præstat Selinusia : maximè lau-
 datur, quæ uehementer resplendet, candida, friabi-
 lis, et humore dilui celerrima. Cimolie duo genera,
 candida & ad purpureum inclinans. Optima exis-
 stimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, ta-
 ctuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, paroti-
 das, et alia tubercula discutit : ambusta igni, si sta-
 tim cimolia oblinantur, pustulas non sentient : tes-
 tium duritias, & totius corporis collectiones cohi-
 bet, igni sacro imponitur. In summa, vtraq; multis
 in medicina commendatur, si incorruptæ originis,
 nec spuria assumatur. Quæ pnigitis dicitur, colore
 fere eretria similis est, grandioribus tantū glebis :
 manum si quis admoueat, refrigerabit : tactu lins-
 guæ, vsque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui
 effectus idem qui cimolia, paulò tamen infirmior.
 Hanc aliqui pro eretriade vendunt. Fornacea teste
 uehementer tosta, crustas ulceribus obducit : quæ

re prurigini & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, strumas discutunt, cerato excepta. Fornacum terra que retorrda fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cineream eretiam imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiliginis, & lepras abstergit. Pictoribus vsum præbet, ut colores diutius perennent: emplastris viridibus, que chlore dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in vniuersum eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, que cum humorem attrigerit, facile resoluatur. Ex ampelide terra, que pharmacitis nomine, in Seleucia Syria nascitur, laudatur in primis nigra piceæ lógos carbones referens, modicè assulosa, æquali splendore, que detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea que in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas vites sub germinationis tempus, utpote cum innaſcentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria. Cap. XC V.

Fuligo qua pictores vtuntur, ex vitrarys officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur, his ei ad adstringendum & erodendum efficax;

fracta cum rosaceo terato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. XCVI.


Atramentum, quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gummi terne fuliginis vncia adijciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria fuligide, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sesquicia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè soluatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decedit. Ceterum habes, amicissime Aree, ferè quæ tradenda duximus pro operis modò, quem destinaueramus, & materie auxiliorumq; medicinalium copia.

QVINTI LIBRI.
FINIS.

PEDANII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE VENE-
nis, quoque modo arcean-
tur, uidenturque,

LIBER VI.



VPERIORIBVS, amicis-
sime Aree, libris tradidimus de
aromatibus, oleis, vnguentis,
arboribus, et earundem fructi-
bus, lacrymisq: item animalis
bus, melle, lacte, seuo, frumen-
tis, oleribus, herbis, radicibus,
liquamētis, vinis, metallisq:. In hoc uero totius ope-
ris ultimo, facultates medicamentorum recensēbi-
mus, quæ prolesse nobis, aut officere possunt. Vitæ
ta igitur orationis prolixitate, opus institutū prose-
quamur. Huiusmodi autem tractatus, cum bifas-
ciam distributus sit: in partem venena præcauen-
tem, ita ut ne fallant sumentes, aut si quando per
imprudētiā dentur, ut tum quoq; innoxia fiāt,
irritaq;: & in rationem ijs succurrēdi, qui iam no-
xiam sentiunt: primum disseram de præcauēdi mo-
do, quem esse difficillimum plerique maiorum arbi-
tratur, quod dantes clam venena, ita insidiis tem-

perant, vt peritissimum quenque decipiant. Si quis
dem venena sua amaritudine, permistis dulcibus,
spoliant, & graue odoris virus mistura odoramen-
torum eximunt: aut medicamenta immiscet, quæ
tuende sanitatis gratia dari putantur: & præser-
tim in ualeitudine, ut absinthium, tragoricum,
satureiam, aut hyssopū, quinetiam thymum, irim,
origanū, abrotonum, castorium, aut si quid medica-
mentis purgatorijs cognatam habere qualitatem
videatur. Aut potionibus inserūt: vt vinis asperis,
iuribus, passo, mulse aquæ, musto: succis, vt in cre-
more lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs
quæ assumuntur, edulij speciem referētibus. Quare
qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare de-
bent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum,
aut acidorum, abstinere: nec sitibūdī affatim bibe-
re, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad sa-
porem horum diligenter attendere, præsertimq; po-
tu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appe-
titu, qualitates agerrime postea concoquuntur. In
ægris quidem facile cauemus potiones auxiliij præ-
textū dari solitas, quas offerunt improbi ueneficio-
rum artifices: itaq; ob id laborantes morbo nō per-
inde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne
facile incauti seductiq; homines capiātur dolis ve-
nificorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest
expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ ve-
nenum vires hebetēt, et inefficaces irritasq; red-

dant: cuiusmodi caricae sunt cum iuglandium nucibus manducate, & quae cedromela vocant; id est citria, seminisque; napi drachma cum vino. Item folia calaminthae, aut creta quae Lemnia splragis appellatur, pondere pari cum vino: aut rutae folia & nucis iuglandis nucleum: aut caricae duas, & salis callum ieiunii sumant, & nullo veneni genere laedetur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum praebent. inter quae intelligitur magnum Mithridaticum, & quod scirco, & quod sanguine temperatur. Quin & saepe venenis obsistunt peculiares quidam corporum affectus certo quodam modo constitutorum cum quadam cibi potusque qualitate, tum vini copia ita temperatorum, ut cum venenis dissentiant: siquidem ingesti veneni vires frangunt, atque iam priore alimento factis praclusisque meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur. Verum enim vero, quoniam fortunae necessitas interdum similia discrimina peregre agentibus affert, absque ullis insidijs hominum, nonnihil deferendum mihi de hac re necessarium duco. Iam primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibiisque & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commode nequit, secunda erit conditio haec, apparandi apponendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda: frequenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quae non modicam perniciem mo-

stantur, vt phalangia, stelliones, & alia quādā reptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet; namq; reptilia odore vini illicuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt interdum vero delapsa immersaq; expirarunt, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hac hæcenus dista sint, ne cauti & providi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundā insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoq; tempore oportebit: si quidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile sit venenum; & paulisper neglectū, medicamentis ægrè cedit. Quare si qui pro comperto se virus sumpsisse intelligat, & fateantur, aut eorum, qui aderant, testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari naturæq; constitutioni restituemus. Neq; enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusce modi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi, quorum causæ cæcæ latetēsq; corporibus insident, melicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medēdī rationem aspernantur? Aequè uero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proq; antecedentibus affectionibus qualitatibusq; quibus sit opportunum corpus, uel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsan obmutescens, aut temulentus, aut nolentes alioqui uenenū à se egeri, nullam nobis eius cognitionem prabeant, tum pro-

DIOSCORIDIS

sinus accedendum ad ea, quæ cōmuniter epotū quī
 buscunque venenis opitulari consueuerunt. Atquē
 nullum magis in omnia valens auxilium dari pos
 test, quā ut proximo loco virus foras exhaurias
 tur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calis
 dum oleum ex aqua, aut seorsum, ut vomitare con
 gantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci ne
 gat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut li
 ni semine, aut trago, vrtica, scenogreco, aut halicæ
 decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo
 vomitionibus exigēt vi illa sua laxatrice, aut nau
 seam ciente, sed aluum quoque subducēt, & corpo
 rum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimoniæ
 venenorum hebetent: Id quod euidenter huiuscemo
 di argumēto deprehendere licet: Esto, ut quisquam
 pina calce vel fece, aut cantharidibus, aut alio
 quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum
 oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet.
 Atqui neque uehementer adstringi corpus, neq; re
 frigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiā vo
 mitus non ob id modo quod vacuet, & noxium hu
 morem excernat, iuuamētum adfert, sed quod as
 sumptum virus nunquam odore, coagulatis grue
 nis aut colore, prodat: quippe cū odore & amari
 tudine, meconium: colore, cerussam, gyssumue: grue
 nis, lac aut sanguinem animalis recens iugulati
 ostendat. Nam grauis odor regestorū, leporis mari
 ni, aut rubeta veneficia deprehēdit, ita ut nonnulla
ab ijs

ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorū auxilia transeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admiscetur, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & uicina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpignes pisces, vetustæ carnes pinguesq; , & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namq; subducunt, uti diximus: & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad vomitionem reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ cōmuni doctæ profunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotanū, iorio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calamintha, nardum gallicum, castorium, ferula virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix, quam magударим appellarūt, aristolochia longa, sylvestris rutæ semen, & betonica, quam cestron nominant, folia: singula cū vino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & seseli, et liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi au

xilij ita se habet. Caterum ab ijs qua consueuerunt
 euenire, communia remedia sumptuari possunt. Fe-
 re enim vires venenorum quam plurimorum, in affe-
 ctus cōsimiles corpus tandem redigunt. Quam ob
 causam plerisque communia conducunt auxilia; va-
 ria etenim sunt venenorum genera, communes ta-
 men nec multi ijsdem affectus oriuntur. Neque fieri
 potest, ut omnes concurrentesque casus, quæ sympto-
 mata vocant, unum uenenum sequantur. Alioquin
 superuacanta fuisset venenorum singulorum tradi-
 tio cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque
 vero in vno eodemque promptum est inuenire, ut quis
 stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesti-
 cæ dolore uehementer crucietur, ut singultiat, eroda-
 tur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuel-
 latur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, ve-
 terno prematur, vertigo obuersetur, caligent sen-
 sus, stranguletur, sitiat, sanguis erumpat, febre cō-
 flicetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur,
 crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore
 sugilletur, pallescat, desipiat, stertat, viribus deficia-
 tur, et pleraque alia faciat, patiaturque: singula enim
 in generales affectus deducta, pauca numero, &
 communia ea demonstrant, quæ euenire consueue-
 runt. Quare in singulis, quæ supra diximus, nō fa-
 cile fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam oris
 & lingue erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renū
 inflammatio, uehemens urinae difficultas, et inter-

dum cruoris tum eo exitus, lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in cætharidibus modo potius reperiuntur, sed in crucis quoq; pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modo eos, qui meconium hauserunt, veterna aut sopore premi, stertere, limore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritum sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mandragoram aut cicutam deuorant. Delirium non hyascyamus tantum infert, uerum etiam quæ toxica appellantur: iidem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile unum uni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatumq; virus prodere possit: maxime, quod hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possit, si ad ea respexeris, quæ sumus dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim atq; præsentaneam vim illam perdiderint, transmutata in longos affectus, communia reliquorum uitiorum remedia, compositionesq; flagitent, cum uenefica proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum

DIOSCORIDIS

morborū genus recidet, à quibus facile fuerit mes-
 dendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generalis-
 ter auxiliantur, haftenus. Consequenter quæ pri-
 uatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si
 prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis or-
 dinibus exitialem aut maleficam vim sortiuntur,
 vt medicine studiosi ea cautè obseruent, quæ ad ra-
 tionem salutis scripta inueniuntur: quòd nonnulla
 eorum, quibus vtuntur, venenis sint commista. In-
 curia enim magnas adfert noxas, & saepe cōtinuo
 vsu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde ani-
 malia quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: can-
 tharides, buprestis, salamandra, pinorum eruce, le-
 pus marinus, rubeta, & rana palustris muta, de-
 uoratae hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriā-
 drum, cicuta, gith, psyllion. Liguamenta: meconiū,
 opocarpason, thapsia succus, elaterium, mandrago-
 ras. Radices, quas mittit chameleo, aconitum, tha-
 psia, veratrum, iuxia, agaricum nigrum, ephemerū,
 quod aliqui Colchicum vocant, quòd in Colchide
 nascitur. Herbae oleraq;: smilax, quam aliqui tithy-
 malum appellant, Romani taxum, solanum mani-
 cum, quod & dorycnium dicitur. sardinia herba,
 quæ ranunculi genus est, corniculatum papauer,
 pharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab ani-
 malibus: taurinus sanguis recens, coagulatum lac,
 mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla: gypsum,
 terussa, calx, auri pigmentum, duo sandaracha ge-

nera, spuma argenti, adarce, plumbū, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

Cap. I.

Q Vibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsq; cuncta erodi sentiuntur, picem aut similem quidam cedrie resipiunt, dextra praecordia inflammantur: urinam agre reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo relinquuntur, obortaq; vertigine concidunt: postremo mente abalienantur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, halica aut oryzae, tragi aut ptisane cremor, aut decoctum maluae, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscū appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammata autem partes,

DIOSCORIDIS

hordei farina cum mulsâ decocta perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, utpote quæ dolores & permulceant et leniât. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus insigatur, et stabilitatem capeſſat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut suillis catulis, maximè pinguibus & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, uesci debent: si quidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum ruta decocto, recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulsâ, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ.

Cap. II.

Is, qui erucas pinorum hauserit, illico dolor in ore & palato exoritur: uehemens alui, lingua ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur: corpus totum exæſtuet: fastidium urget. Quibus est

succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo et irino, melinum, quod e cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis.

Cap. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nostro virus sapiunt, stomachi uentrisq; uehemens dolor insequitur: tam uenter, quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem difflatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, aride ficus profunt: ite earum decoctum, ex uino. Vbi uero iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuatur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

Cap. II II.

Si salamandram hauserunt, lingue inflammatio consequitur, mens & sermo præpeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis linoribus circumquaque sugillantur: sæpèque, diutius immorante ueneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabimus cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiariora uero remedia, resina pinus, aut galbanum.

DIOSCORIDIS

ex melle linctum, & auge decoctum, in quo nuc-
lei pinei conterantur: urtica quoque folia, cum li-
lij & oleo decocta. Prosunt etiam oua testudinis
marinae aut terrestres, cocta: item ranarum ius, cum
quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

Cap. V.

Sympto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut
sylvestrem bulbum appellant, pruritus in toto
corpore excitatur, non secus atque ijs qui urtica
aut scilla laceffuntur: interna rosionem sentiunt:
stomachus cum ingenti gravitate exaestuat. Ceter-
um inualefcente morbo, cruor strigmentis admi-
stus, per alium exigitur. Quibus, ut ijs qui sala-
mandram hausert, vomitione aut clysteribus au-
xiliari conveniet: sed antea quam venenum inuale-
scat, dandum est decoctum frondium quercus, aut
glandium, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo
serpyllum sit decoctum: item succum sanguinalis
herbae, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medulle re-
centis ferulae, aut myrti cum uino. Bacca aut myr-
ti tuse tritaq; & aqua macerata, ut liquor inde
sumatur, opem ferunt. Media castanearum tunicu-
la, similem effectum praebet, si cruda in aliquo su-
pradictorum succo sumptitetur: origanum quoque
cum lixiuio epotum: eximie iuvantur asinini lactis
aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant:
ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desi-
deretur.

Dorycnium. Cap. VI.

Dorycnion, quod aliqui manicon solanum ap-
pellarunt, epotum, lactis saporem in gustu
refert: continentes singultus ciet, humor linguā ue-
rat: sanguis confertim reijcitur: mucosa quadam
perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque
antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt ante
dicta, uomitus, clyster, & quaecunque potum uene-
niū expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua
mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum,
quod tepidum cum aniso bibatur, amygdala ama-
re, gallinacea pectora decocta. Quinetiam conchy-
lia omnia, tam cruda quā tōta esse, salutare
est. Conueniunt & locustae marinae, & gamma-
ri, & pota eorundem iuscula.

Aconitum. Cap. VII.

Aconitum statim in lingua inter bibendum,
cum adstrictione quadā dulcescit: & subin-
inde, potissimum cum exurgere conatur, uertigines
offundit: lacrymas ciet: grauitatem pectori, et pra-
cordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur.
Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per
alium egeri opus est. Vtimur inter propinandum,
origano, ruta, marrubio, uel absynthij decocto, cū
uino absynthite uel semperuino, uel abrotono, uel
chamelea, aut aiuga. Prodest etiamnum opobalsa-
mi drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pi-
pere, et ruta, equis ponderibus ex uino. Coagulum

DIOSCORIDIS

hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto, ferri quoque stercus, item unum, in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum, lixiuiq; cum gallina & uino decocta, aut carniū bubularum præpinguiū iura, cum uino sumpta. Fertur & aīga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heracliæ. Cap. VIII.

Mel in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntue, non secus affligantur, quā qui aconitū ebiberunt. Is eadē, q̄ poto aconito conueniunt: adiuantur in primis continuo uini mulsi potu, cui ruta folia sint adiecta. Coriandrum. Cap. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest: epotum aut uocem exasperat, insaniam adfert, a temulentis non abhorrentem. Qui sumpserunt, puenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, uenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatam, uti retulimus, merum & per sese, & ex absynthio potū auxiliatur. Itē oleum, nec secus onā in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur & epota muria, et ius salsum ex gallina & anserē: passum quoque cum lixiuia sumptū.

Pyllyum. Cap. X.

Pyllyon epotum, corpori toti frigus & torporē cum exolutione & mærore quodam adfert: ita ut animum despondeant. Cui omnia quæ exhausto coriano auxiliantur.

Cicuta.

Cap. XI.

Cicuta pota uertiginem excitat, oculisq; caligē-
nem offundit, ita ut minimum cernatur: sin-
gultus ciet, mentē turbat, extremi artus gelantur:
deniq; conuulsi, suppresso arteria spiritu, stranguo-
lantur. Quare inter initia, ut in reliquis, cicuta uo-
mitu extutiemus: postmodum deiectionem molie-
mur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernas-
mus: tum demum in meracam potionē, qua maxi-
mo est auxio, deueniemus: repetendū per interval-
la, in quibus proderit lac asinum, aut bubulū po-
tū datum, aut absinthium cum pipere & uino,
castorio, ruta, mentha cum uino, aut amoni, carda-
moni, aut styracis uncia, aut piperis cum semine
artice & uino, aut lauri folia. Itē laser ex oleo et
passo, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus.

Cap. XII.

Smilax, à quibusdam tithymalū, à Latinis ta-
xus appellatur: frigus uniuerso corpori, stran-
gulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem
qua cicuta conueniunt.

Carpaci succus. Cap. XIII.

Epotus carpaci succus soporem, citamq; stran-
gulationem adducit. Adiuuantur autem qui
hauerunt, epota cicuta remedijs.

Sardonia herba. Cap. XIII.

Sardonia ranunculi herba generi assigna-
tur, quæ uescentibus mentem adimit, & quæ

DIOSCORIDIS

dam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in uulgus infansito omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfaciunt: in calidam aquam oleūq; descendant, sed tum multum perfricare & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ consulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoſcyamus.

Cap. XV.

Hyoſcyamum potum aut comesum, similem Hebræis ab alienationem mouet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininū: si id desideratur, caprillū, uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctū. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semē ex passo sumptum, & uinum salsum cū adipe suilla recenti, passoq; itidem urtica semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, capsa, & allium: & hæc singula cum uino sumantur. Postea sinendi quiescere, quem admodum qui uinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora.

Cap. XVI.

Mandragora si bibatur, confectim sopor inſequitur, exolutio, ac uehemens ueterinus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accadat, uomitus & aqua mulsa proderit:

postea nitrum & absynthiū ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatoriū, & piperis, sinapis, castoriū, & ruta tritorum in aceto: & liquida picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quòd si egrè uenocentur, sternutamenta mouere, alijsq; cōmunibus auxilijs uti conueniet.

Meconium. Cap. XVII.

EPoto papaueris succo quem meconion uocant, consequitur ueternus cū perfrictione & pruritu uehemēti, ita ut saepe inualecente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliātur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merū cum absynthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiuia aut passo, & ruta syluestris semen cū pipere, uino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, uel cum saturia aut origani decocto, cum uino. Hi olfactilibus excitandi, et ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foveantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cū uino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. Cap. XVIII.

Quod corniculatum papauer appellant, & potus, & cibo eadem inferre consuevit, quæ pa

DIOSCORIDIS

paueri succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum.

Cap. XI X.

Quod pharicon uocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum absynthitem potui dare, cum cinna momo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinē aliqui uocauerūt: aut spice nardi duas drachmas, & myrrhe totidem obolos, cum passo: aut irim cū croco ex uino: dera sumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum.

Cap. XX.

Toxicum ex eo nominari uidetur, quod barba rorum sa gitta eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & lingue inflammatione torquentur: incoercitus furor uarias ijs imagines obuersat: quare uix medicinae locus est: raroq; qui hanferūt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinū dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rasi semen bibendum cum uino. Privatim ijs cōuenit, quinquesfolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus, malaq; cotonea trita esse, aut cū pulgrio & aqua bibere, conueniet amomum & balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbūt, & ubi surrexere, stupidi reliquum uitae tempus degunt.

IXia, quæ ulophonon appellatur, inter potandū aliquid ocymo simile gustu & odore redolet: uehementē lingue inflāmatiōnē excitat: mentem mouet: oēs excrementorū exitus supprimit: Strepitum cum animi deliquio ciēt, ūs q̄; intestina latrant, nec egeritur quicquā. Post uomitiōnē aluum q̄; resolutam, auxiliū præstat aqua, in qua absynthiū maderit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota: ruta q̄; syluestris semē, aut laseris radix: item trago, rigani decoctū, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorū singuli oboli conueniunt. Quin & nuces iuglandes ex uino, cū resina, castorio, & ruta trite, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem chamaelea aut thapsia aut absynthij succi sicilicus cū aqua mulsa, & acetum calidum potum. Cerussa. Cap. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singulius, tussim, ac lingue ariditatem excitat: ūs extrema frigescunt, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut malue decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmētis factam, amaricinum oleum aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oia cum

thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi
quod ulmus piorauit, aut humor, quem ulmea fo-
lia reldiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque
uomant. Conuenit etiam tapsia succus, aut scam-
monia, cum aqua mulsa potus.

Fungi.

Cap. XXIII.

Fugorum alij genere, alij copia laedunt: omnes
tamen strangulatus suspēdio similes cōcitant.
Quibus confestim succurendum: communiter ex
oleo uomere cogendi: mirificē inuat lixiuia ex sar-
mentis aut pyrastri surculis, epota cum sale, posca
& nitro. Fructus, aut folia pyrastri cum fungis
decocta, strangulantem illam uim auferunt, esita-
taq; eisdem auxiliētur. Aduersus fungos gallina-
cea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochia
drachma: item absynthium cum uino melleq; sum-
ptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro pa-
uacis radix & semen in uino, fax uini cremata
cum aqua, atramentum sutorium ex aceto, radix,
uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

Cap. XXIIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat:
quare eadem proferenda sunt, quae mansit
fungis, auxilia, & ad haec maluae decoctum, quod
etiam olei uicem pensat: utpote cum pingue sit, eno-
uendo lubricas uias & faciles reddit, deradique
corpora non finit. Quod ubi duratur in lapidem,
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua

mul

mulsa, aut sicorum decocto: & lixiua è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cum lixiua, aut aceto, aut passo: liq; decocto malue proluendi.

Sanguis taurinus. Cap. XXV.

Tauri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatumq; concitat: fauces tum tonfillarumq; meatus cum neruorum distentione præcludit, lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quedam concretæ sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimur: sanguinis enim globi attractu illo insublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiant & aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliatur: nec secus coagulum omne cum aceto & laserpitij radice, aut lasere: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiua: conyza folia cum pipere, et rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Iis qui seruatur, stercorosa et fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum aliumq; hordeacea faria ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. Cap. XXVI.

Eos, qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus inuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & calamintha folia arida, item

succum, aut laserpitij radicē, aut lasercum poscat
thymumq; ex vino, & cum luto suo lixiniat. Sed
nulla falsilago obijciatur, quoniam magis lac cois-
ret, et in caseum densaretur. Neq; illos vomere cō-
uenit: siquidem concretum lac sese in gula angus-
tias insinuans, strangulat.

Argenti spuma. Cap. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & inter-
stancis grauitatem cū magnis torminibus ad-
fert, & nonnumquam pondere suo intestina vulne-
rat, urināq; supprimit: corpus intumet, plumbeaq;
deformitatem concipit. Quibus subuenit secundū
vomitionem, potum syluestris hormini semen, myr-
rhæ drachmæ octo, absynthium, hyssopum, apij se-
men, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum pa-
lumbis: simum, cum nardo & vino.

Argentum viuum. Cap. XXVIII.

Argentum viuum potum, eadem quæ spuma
argenti infert, eisdemq; vtendum auxilijs.
Lac copiose potū auxiliari constat: sed postea euo-
mant, qui auferunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

Cap. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum,
pota, aluum & intestina cum vehemēti
erosione exeruciant. Præbenda cūcta quæ
suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac solu-
unt, & facilem lubricamq; aluum reddūt, cuius-

modi ibisci et malua succus est: natura enim vtriq;
perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel se-
men tragi herbae, vel oryzae, lacq; cum aqua mul-
sa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. Cap. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium vi-
rus olent: procedente tempore, alius dolore
afficitur, & vrina sistitur: & si quando eam red-
dere contingat, purpureum colorem referet. Omne
piscis genus auersantur, et odio habent: foetido ac
gravi sudore manant: biliosus vomitus, interdum
sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum
lac asininum, vel passum continue, aut radices mal-
uae foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix
cum vino, aut veratri nigri, aut scammonij succi
drachma, cum aqua mulsa, panicij; mali acinis.
Cedria cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut
tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuunt, asper-
nenturq;, solis fluminalibus canceris vesci possunt,
bibuntq; eos admisto vino, adiutiq; ab his perco-
quunt. Cumq; appetere et comesse pisce coeperint,
sue salutis iudicium habent.

Rubeta & palustris rana. Cap. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumo-
res ciet: pallor corpus vehementer decolorat,
ut plane buxeum spectetur: spirandi difficultas
torquet, & grauis halitus oris, singultusq; et in-
uita interdum genitura profusio consequitur. Ad-

inuuantur secundum vomitionem multo meri potu,
 & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi
 totidem. Breviter, cogendi sunt ut vehementi am-
 bulationi & cursui se credant, ob torporem quo
 corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo.

Cap. XXXII.

DEuorate cum aqua hirudines, si ori ventriculi
 adherent, tractione partium, nonnullam sus-
 elionis imaginem præbent: eo enim argumēto huius-
 modi hirudo deprehenditur. Has maria sorbitione ex-
 cutit, et cyrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut
 betæ, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca.
 Nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum
 sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, inie-
 ctæ lupinorum farina, aqua frigida ore contineas-
 tur, et ad eam hirudines exilient. Providendū etiā
 ijs, quæ etsi ferendi auxiliij gratia tradantur, non
 minora tamen ceteris venenis pericula sæpius ad-
 ferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, ela-
 terium, agaricum nigrum: si quidem ea strangula-
 tus concitant, aut immodicas deiectiones mouent.
 Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione
 & similibus retulimus. Nimios aut deiectionū im-
 petus, medicamentis, quæ excrementa supprimunt, co-
 ercebimus. Neque negligēda quæ parū quidē nocere
 videtur: iterum vero vitā i descrimia agūt. Quo
 numero sūt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pap-
 pī recētes: flores aut sunt eius spinæ, quæ coctos di-

itur. Eos, qui sumpserunt, sola vomitio recreat.
Domestica nobis. Cap. XXXIII.

Aqua frigida abundè pota, aut mēacum vi-
num liberalius et otum, aut passum, preser-
tim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercita-
tione, stragulatus et dolores infert. In quibus san-
guinis missio protinus, & vacuatio, imminētia
soluunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac re-
medijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Sub-
iungeremus etiam antidota necessaria, quæ præcla-
rè auxiliantur, quibus vtimur, quale Mithridatiū
est, præsertim & quod sanguine, et quod scinco tē-
peratur. Verū quoniam alijs in locis diligētissimè
scripta sunt, hic ab eorū descriptiōe supersedemus.

Venenata. Cap. XXXIII.

DE bestijs, quæ virus ei aculantur, & exi-
tialibus venenis, idē scribere aggredi-
mur, ut tota curationis remediōrūq; ra-
tio ad vmbilicum perducatur: si quidem pars hæc
non minus quàm ceteræ aliæ, necessaria est ijs, qui
artem medicā exercent, vtpote cum adminiculo eo-
rum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, &
cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari
conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, si-
cuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui
de feris virus inspūentibus sermo differit, Theria-
cus dici solet: qui uerò de amoliendis veneficijs.
Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ

sequi signa consueverunt, præmonstrabimus: tum
 quæ nonnihil auxiliū ferunt. Omnia autem in pro-
 ptiu, & ad manum habere artificem oportet, pro-
 pter urgentem sæpenumero necessitatem: si quidem
 pauca ē venenis & virulentis animantibus, tarda
 & grassantia sensim pericula cient, ita ut dilatio-
 nem admittant: pleraque verò præsentaneam per-
 niciem afferunt. Hominū autē partim malè alijs
 cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita tēpe-
 rant, ut spatiū curanti liberū non relinquunt: par-
 tim sceleris admissi conscientia, aut tristi aliquo
 euentu oppressi, hausto sponte veneno, mortem sibi
 consciscere conantur. Qui postea deprehensi, aut re-
 sipientes, & vite cupidi, præsentaneam opem po-
 scunt. Non desunt, qui hostiles sagittas illinentes,
 aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes,
 certam & inewitabilem aduersarijs perniciem mo-
 liuntur. In quibus ipsis etsi maleficium non subito,
 sed aliquantō post grassari natura sua compara-
 tū est, tamē nisi primo quoque tempore coerceatur
 & remedijs subinde excipiat, frustra tandem
 succurritur, occupatis iam corporibus exitiali vi ve-
 neni. Proinde non vulgari industria diligentiaq; in
 ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars
 consuevit, in his quoque salutem mortalibus præ-
 beat. Quin & apud priscos genus hoc vnum exi-
 stimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pu-
 gnat: sed recentiores id ipsum discreuerūt, nominā-

res præcautionem, & modum præcauentem, salu-
bris sanantisq; mediū statuentes, parua & leui su-
pra modum persuasione decepti. Siquidem treis in
humanis corporibus constitutiones esse contemlūt:
vnam, qua sani degimus, alterā, qua sinistra vale-
tudine corpora laborant: tertiā, qua medium inter
vtrasque locum sibi vendicat. In qua positi, sanita-
tem specie mentiuntur, facileq; in morbos & peri-
cula concidunt, ob vim corruptricem, quæ corpori-
bus nostris incumbit. quemadmodum in ijs videre
licet, quos excādescens rabie canis momorderit, nec-
dum tamen aquam horrent. In ijs quoque qui can-
tharidas hauserunt, sed nondum vrine tormento
cruciantur. Tripartitō igitur artē digeri, tripliciq;
corporis constitutioni meritō respondere trahunt.
Salubrem partem esse volunt, quæ sanitatem tue-
tur: præcauentem, eandemq; prohibentem, quæ ob-
stat quò minus in morbos incidāt: & sanantem,
qua vitia discutiuntur. Quibus ita responderi po-
tēst, quòd primū ex ista ratiocinatione nō treis
corporis tantū, sed quatuor haberi constitutio-
nes fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui nec-
dum morbo laborant, morbo tamē maxime ob im-
pendentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
priori morbo defuncti, nondum tamen secunde va-
letudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à mor-
bo proximē sese recolligunt, cernere licet, qui vi-
rium recreationem & robur desiderant. Sed quæ-

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus retinur auxilijs, altiore scarificatu, vstionibus, amputatione, derodētibus epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enim vero sunt vsque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem apponent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliarem remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cæli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, et in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quam arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis conflictentur. Neque id silentio prætereundum, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare convenit, affectus, qui à via

virulentis animalibus venenisq; contrahuntur, voca-
 ri cecos, id est, quorum ratio minimè iniri potest.
 Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter
 sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus ob-
 servatorie artis, et eius, quæ ratione fulciatur, an-
 numerari solent. Neque prorsus verum deprehendi
 tur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod sem-
 per se protrahit, & nullum in quibusdam necessa-
 rijs vsum exhibet, haud facili coniectura colligi po-
 test: etsi naturæ proprietate prorsus cecos eos affe-
 ctus concedimus, qui ab exitialibus venenis, et ani-
 mantibus, quæ virulento morso seuiunt, contrahū-
 tur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præbet,
 datq; medendi occasionem, neque imperceptibile,
 neque cecum, nullius causæ obnoxium reputatur:
 se magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem
 se habere, & opinionem abditorum cognitione con-
 firmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm
 ut sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsi:
 inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in
 eo commentario quem Plin. archæo dicauit, satis mo-
 dos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nosse quis
 hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis,
 & scorpionibus, & reliquis id genus, secum ani-
 mo reputans, ut quantum exiguo sint corpore, vixq;
 conspectui subiiciantur, magnorum tamen discrimi-
 num ac dolorum causas inferunt: quorum ni-
 hil præter quandam corporis exiguitatem, vimq;

DIOSCORIDIS

præ ceteris animantibus datam illis, facile fuerit
 spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ
 à scorpjjs ictu, & aliorum id genus venenatorum,
 quæ nos morſu conficiunt, attingitur? quorum ali-
 qua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt,
 & putredines cient, nec desunt quæ præſentaneam
 perniciem moliantur. Aut quantulum eſt quod à
 phalangij morſu ingeritur, & vniuerſum corpus
 excruciat? neque enim quis magnitudinem ipſorū
 apprehendere poſſet, cum prorsus exigua mole con-
 ſtent. Ergo quòd hæc ad affectus referantur, con-
 ſtitit inter omnes. Verum quòd exactè deprehen-
 ſum ſit, vim quandam ipſis ineſſe mortiferā, quæ
 inſinuata corporibus moleſtiarum, quæ exoriuntur,
 nobis cauſa ſit, in confeſſo eſt, & omnium conſen-
 ſu perſuaſum. Nec quiſquā inuenietur uſque adeo
 contentionis ſtudio flagrans, qui aliunde exoriri mo-
 leſtias aſſeueret, quàm à materia mortifera partē
 corporis attingente. Porro id erat, quod inter utilia
 artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam
 res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos le-
 dat, in-
 comprehenſa communis cauſæ, quæ proprijs ineſt
 ratio: quandoquidem tum euidenter indicari poſſit
 cum deprehenſa eſt. Ideo Eraſiſtratus empiricorū
 pertinaciam graui cauillatione inceſſens, cæcis aſſe-
 ctibus cauſas aſſignauit, inſiciatus his cōmunem,
 & ſupremam morborum cauſam incomprehenſi-
 bilem eſſe: & hanc in eo, quem de cauſis ſcripſit

commentario aptissimè prædidit, candido signatâ
 lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicât in
 quibusdam, ut in venenis, serpentium ictibus, &
 cæteris id genus trita medendi ratione contentos es-
 se. Neque satisfacturam sibi observationem eam,
 quæ à causarum comprehensione separata est. Pri-
 mum enim genere comprehendendi faciliè possunt.
 Quod autem sit lethifera vis, corporaq; permutans,
 ita ut perimat, ex ijs, quæ per genus, non per specie
 vagantur, curationem indicat, qua hæc hebetare,
 & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiūgit:
 Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis,
 & ante observationem ad vomitū, ad vulneris di-
 lationem, ad demorsæ partis suctū, cucurbitulas
 adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut
 ea quæ vim eandem adipiscuntur admonuit, postre-
 mō partem amputavit: secū reputauit medicami-
 na, quæ per summam cutim ferre, & applicari so-
 lita, immissæ ad intima perniciæ repugnarent.
 Hæc itaque, quæ disseruit Erasistratus, veritati cō-
 sentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodi-
 cos demirari licet, qui mortiferam nim corporibus
 illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse cau-
 sam diffiteantur, verum rudiusculè nomini at-
 tendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθγο-
 ροιδς, id est mortifera, nominatur: φθορροιδς
 autem nullius officij alius esse potest, quàm cau-
 sa. Aiunt hæc nomina, φθορροιδς & φθγο-

DIOSCORIDIS

καὶ ὅτι τὰς ἐσσε reliquis omnibus similia, in quibus
 partes quaedam dictionum non pro virtute, sed nu-
 da enunciatione comprehenduntur. Enimvero quæ-
 admodum in his uocibus μα' εἰς ὅπως & ἀνακαλῶ-
 πται, partes neque certos, neque principes retinent
 significatus: sic in hoc uerbo φθοροποιῶν partes
 productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt.
 Hinc ad causarum differentias transeunt, affir-
 mantq; causarum aliquas euidentes esse, quæ dum
 aduersam ualitudinem creant, separantur: cuius-
 inmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quas-
 dam continentes, quæ permanent postquam mor-
 bum excitarunt, hoc est, quibus præsentibus, & ef-
 fectus eorum adsunt: incrementibus, effectus au-
 gentur: decrementibus, minuantur: & cum desi-
 nunt, iidem finiuntur: quibus solis ac per se man-
 nentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quis-
 dem receptissima sunt causarum discrimina, quo-
 rum nulli phthoropæon subijci potest. Euidens
 enim causa nō est, quoniam morbus ipse perma-
 nēt, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens
 causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit:
 quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt
 demorfi. Quod si neque euidens causa, neque
 continens fuerit, neque per se, neque alterius con-
 sortio causa erit. Quod si à nulla causarum diffe-
 rentia phthoropæon deducere possumus, con-
 sequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod

autem asserunt, vocabula quedam in se non habere partis rerum significatrices, sed nuda, & simpliciter pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existamandum est: neque enim ποῦν in hoc nomine φθγο τοῖν perinde atque assumptionis profertur, sed longè principè obtinet significationem. Quemadmodum enim φθορᾶς, id est corruptionis nomen mutationem in peius significat, sic hoc verbum ποῦν sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem φθορᾶς secum habeat, declararet. neque prorsus id ignificat, quod omnes palàm audiunt, et huic simile redditur, παῖδες ἔχοντες. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utique vim in huiusmodi verbo τοῖν subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subiunguntur, idque tam in lethalibus venenis, quam in iis, quæ corporibus ingeruntur. Verum non nihil subiacere causarum differentiis produnt. Quinetiam aberrarunt, non ex auctam diuisionem assumentes. Qui vero se dogmaticos profitentur, causam esse partim preparantem, partim continentem asserunt: ut inguinis vlcus, et inguinariam febrim, et quæ affectui tum assistat, tum etiā separetur, ut à fractis præcipitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur,

vitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ
idem genus sortiuntur. Sed quod phiboropæon cau-
sa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ
contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ
arbitratur esse post impressum à serpentibus ictû,
quàm ex animante vim, & illapsum in corpora
virus? Neq; enim frigus, neq; æstus, neq; sectione
corporis, neq; cruditatem, neq; aliud quicquam si-
mile causari possunt. Verùm quoniam causarum
differentijs gaudent, & aliquas continentes alias
evidentes appellant apsis dicendum, utroq; istorum
modorum evidentem quidem causam esse, quod ef-
fectum præcedit, & quod corporis substantiam
preoccupat: continētē vero, quod morbis præsen-
tibus adest, qua separata recedunt, quæ cum ipsa
evenerant. Sed de ijs hætenus. Statuendum itaque
mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse
causam, ipsamq; principem facere. scopum oportet.
Et antequam ad ima decumbant morbi, varijs
modis est certādum, donec vis tota corporibus exa-
cuiatur. Modò enim renocari debet ea parte, qua
pestis intrauerit: modò aliqua alia, præsertim prin-
cipatum non obtinente, antè coerceatur, quàm al-
tius irrepens viscera tãgat: aut eius pernicies elua-
tur, retundaturq;: cum iam membratim pervaga-
tura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vo-
mitionibus: si morsus impressa, scarificatione, affi-
xis cucurbitulis, exunctu, carnis circumscriptione,

nonnunquam amputatione extreme partis, euo-
 cantur. Retinentur vero infusione, et imposito me-
 dicamentorum acrium cohibetur. Hæc simul utiq;
 arcere virus, & eluere possunt. Restinguuntur, &
 euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua
 diluto, vel contrariorum esu, quæ acrimonia sint
 prædita. Postremò deiectio alui, euocatus sudor, et
 alia quædam in commune, quæ membratim demõ-
 strabimus, auxiliantur. Verum enimvero non lethi-
 feram modò materiam, sed & magnitudinem, et
 tempus, prospecto cõsiderare oportet. Etenim ab ijs
 remedia quàm plurimum discrimen capeffunt.
 A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis,
 & virosis animalibus pericula minantur: alia pu-
 tredines altas aut exteriores excitant: alia vehemẽ-
 tissimos dolores aut cecos cient: alia vis medicamẽ-
 tis cedunt, & magis minúsue molestias excitât.
 Oportet autem ea, quæ pericula ferunt, peruicacio-
 ribus auxilijs expugnari. & minus infesta, mitio-
 ribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, se-
 gnioribus medicamẽtis homines in discriminẽ addu-
 cere: in minoribus uero, uehementium auxiliorum
 iniuria corpus laceffere. Finitio à temporibus in-
 promptu est, hoc enim subito in pericula, & præ-
 sentes molestias adducit: illud uero sensim, & dila-
 tas in diem longam aut breuiorẽ producit. Itaque
 in acutis quidem cõfestim multa simul auxilia re-
 præsentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quæ-

dam artis formula breuiter definita sint. Iam mē
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum
ab eo. Cap. XXV.

DE rabiosi canis morsu sermonem alijs prapo-
suimus, quòd id animal domesticū ac frequēs
esse consuevit, & in rabiem sepius agitur, ac pe-
rit, ab eoq; cauere difficile: inde periculum inuita-
bile hominem manet, nisi multis vtatur auxilijs.
Canis plerunq; flagrantissimis aestibus in rabiem
efferatur: interdum quoties frigora inceserunt.
Rabiosus autem potum, & escam auersatur: lara-
gam spumantemq; pituitam naribus, & ore proij-
cit: toruē & solito tristius intuetur: in omnes pas-
sim sine latratu irruit, & aequē feras hominesq;
tam familiares, quàm ignotos mordet: nec protin-
us infestum quicquam infligit, nisi, vt vulnus, do-
lorē: exinde morbus ille, qui ab aquae metu hydro-
phobicus Graia est voce appellatus, contrahitur.
Euei i: autem cum distentione neruorum, totiusq;
corporis rubore, praesertim faciei, cum sudore, &
lāguore quodam. Aliqui aure splendorem fugiūt:
alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt
etiam, qui canum more latratus edant, & obuiā
factos morsu adoriuntur, ac mordendo simili vitio
labefactant. Proinde ex ijs, qui hoc vitium sense-
rint, neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex
historia vnū aut alterū euasisse audiamus: siquis
dem

dem Eudemus superasse quendam affirmat. The-
misonem aliqui demorsum in hunc furorem inci-
disse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico
aquâ expauescenti morē gereret, & officium exhi-
beret, quadā naturarū concordia similē contraxis-
se affectū: sed post multos tandē cruciatus seruatiū
extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo
multos, antequā ipsam experirētur, uindicauimus:
& complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso.

Cap. XXXVI.

Ratio medendi duplex: una cōmunis, qua
utendum in omnes morsus, quos uirulēte
animantes impresserunt: alia peculiaris
priuatāq; eorum duntaxat, quos rabiosi canes mo-
rderint: quæ nonnullis quidem summam opem
ferre consuevit: alijs uerò inutilis, maximè qui ex
multo iam tempore ictū acceperunt. Quæ ad hanc
pertinent, primū exponemus, deinde cursim per-
stringemus, quæ ad communem medendi rationem
pertinent. Cancros itaque fluxuatiiles in sarmentis
albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorū quā
minutissimè tritum habere reconditum: itidem gē-
tiane radicem tusam cribratāq; reponere. Quo-
ties autem canis rabiosus morsum intulerit, in qua-
ternos cyathos meraci uini, bina cineris cancro-
rum cochlearia, unumq; gentiane coniiciantur:
hec in polente dilutioris modum subacta, quatri-

DIOSCORIDIS

duo bibantur . Inter principia medicamentum hoc modo detur . Atqui si ab illato morfu bini ternue dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus . Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque vnum satisfecit, eoq; cum fiducia vti licet . Sed vt alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil ceteris vti prohibet . Satius autem multò fuerit etiamsi in vnum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiâ in discrimen adduci . Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, et vlcusculis cutis similia: quippe maiori vulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus nō accidit . quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet . In vtrisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur . Cucurbitule cum multa flamma agglutinata id inuamenti præstant, vt veneni vis extrahatur . Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, vtpote cū ignis cetera viribus præstet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patiatur: simul quod pars igne experta, postea non vulgare

fundamentum curationi futura præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crustæ decident, ne vlceris oræ coalescât, & cicatrice induantur: sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum tempus, vlcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre allium detritum: item cape, succusq; præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quàm non mansa imponantur: siquidem subactæ pistæue à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est. Cæterum tempestiuus eorū vsus minimè est contemnendus. Si verò, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt. nāque eas diducere, carnemq; scalpello circinare, aut iterū inrere, expedit. Vbi vero propositum tempus præterit, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod e salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multo post sinapismo vtendum.

Ratio uictus in morfu rabiosi canis.

Cap. XXXVII

QUæ ad partem istā pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum victus ratione ex ijs quæ veneno aduersantur, conie-

DIOSCORIDIS

Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni vires hebetet restinguatq;, simul ut arceat, quò minus ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorum utrumque prestare potest vini meracioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod omnem eius acrimoniã obtundat. Simili modo alliorum, porrorum, caparumq; cibis: quòd ea difficulter cõficiantur, vixq; aboleatur. Nã multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec evincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus atq; commodatur, & theriaces, Mithridatij, & eius, quod eupatorio temperatur. Denique omnium, quæ magnam aromatum partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantijs egrè permutantur: quare in corporibus evincunt. Victus ratio hoc modo se habet: Nosse convenit, pauorem aque non statò defuutoq; tempore exoriri: plurimùm tamen ad quadragesimùm usque diem neglectis differri cõsuevit. Post semestre etiã nonnullos inuadit: quendam post annũ aquam horruisse constat. Quæ nobis visu comperta fuere. Narrat & aliquos post septennium aque metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorũ à cane rabiosa curandi ratio talis est. Veruënimvero si ea, quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermisã fuerint, nec scalpro carnẽ

circinare, nec vſtionem experiri operapretium eſt. Non enim quod iam pertransiſſit, ſatis euocare poſſent. Nulla utique iſtius rei occaſio aut vtilitas, ſed incaſſum corpora doloribus ſternentur. Alter uero curationis modus accedat. Deiectione magnum præbet iuuamentum, vtpote cum mouendo, corporis habitum tranſmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera. Item lac ſchiſtum, quod ſimul deiectionem moneat, & venenum domare poſſit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer reſtunditur, quotidie ſumi debent. Cæterum ſudores ante cibos, & poſt etiam ciendi. Dropaciſmi ſinapiſmiq; alternatim per corpus totum adiſcendi: Sed longè omnium efficaciſſimum auxilium helleboriſmus cognoscitur, quo cum fiducia non ſemel atque iterum, ſed frequentius ante quadrageſimū diem, vel poſt hoc tempus vti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, vt quidam, qui iam aquæ metum ſentirent, ſumpto helleboro, ſimul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint ſeruati. Nam & iam vitio tētatos nemo vnquam ſeruare poteſt. Itaque primum curā contra rabioſi canis morſus breui ſermone expoſui-
mus: iam ad alia, quæ venenatis morſibus ſeuire conſueuerunt, tranſeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus cōuenire poſſit, explicabimus. Cuſſim deinceps ſub-
iungemus eo, quæ ſua proprietate nonnullis auxi-

DIOSCORIDIS

lium præstare possunt. Postremò subnectetur etiam
venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à uenenatis demorfi
sunt. Cap. XXXVIII.

DEmorsis à phalāgijs locus quidem ipse, quasi
ab impacto aculeo rubet, nō intumescens, nec
per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit:
ubi verò contrariorum occursu refrixit, cōsequitur
corpore toto tremor, distēt. ones poplitum & ingui-
num, cōuulsionibus non dissimiles. In lumbis colle-
ctio exoritur, et perpetua vrina libido lacescit, mula
taq; reddēdis excrementis colluctatio. Vniuersa cu-
te frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offu-
sisq; nebulis caligāt. Si scolopēdra aut dicta ophio-
etene, morsum intulit, locus per ambitum liuore su-
gillatur, & computrescit: interdumq; , licet rarò,
feculentas atque ruber cernitur. A morsu ipso ex-
ulcerari locus incipit, ulcusq; id negotium exhibet;
fere remedijs inuictum: præterea toto corpore pru-
rigo sentitur. Scorpionis morsu inflammari fla-
tim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet,
uicissimq; dolore premitur. Modo siquidem ex-
aestuat, modo frigore occupatur. Labor repentē fati-
gat, & aliquando meliusculè habet, aliquando ue-
rò recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus,
& tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt,
inguina extolluntur, per sedem flatu exeunt, capil-
li eriguntur, pallor membra decolorat et dolor, tā-

quam ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur. Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. Mens percussus labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupefcit, ut tangentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & malè olēs excernitur. A mure araneo percussus, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas vrinæ, & frigida asperginiis offusio consequuntur. Si vipera momordit, corpus intumet, vehementer arefcit, subalbidumq; colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum suppinguis, mox cruenta: pustula adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit: gingivæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eueniunt ijs, qui à cecilia nomine, aut amphisbæna demorfi sunt, eadēque ferè auxiliantur: quare hoc uenenum priuatam descriptionem sortitum non est,

DIOSCORIDIS

neque visum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsis pustula molestiq; dolores incidunt, præsertim quâ dilute saniei emissariû subest. quinetiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab hæmorrhoidis iclis vehemētes cruciatus accidunt, qui angusta contractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit: et quacunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluensq; sanguis in globos coit. A pu'none sanguinem extusciunt, & in vomitiones effusi sine remedio cōmoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisq; usque eò pertinax, vt satiari non possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: etsi potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuam sitim, & præter, & causon, aut dipsas appellatur, Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & liuidum ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malò olēs, non secus atque ijs, que serpunt vlceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperino icliui similis est, putridum vlcus sequitur. Carnes antea, vt in aqua inter cutem, prætumide, defluunt. Lethargo corripiuntur, & veterino pressi somno captant. Erasistratus eos iocinere, intestino ieiunio, coloq; conflari auctor est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferē

partes corruptæ reperiuntur. A cerasæ percussis locus attollitur, cum duritiæ pustulosus. E plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior: sed toto cōcretu varicosus intumescit genitale intēditur: mēs labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore nervorum distenti commoriuntur. Ab aspidē ictis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acutissima tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubiat: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At vir perit absque labore, virens atque discolor. Mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellit: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro, quē de medicaminibus & venenis condidit, de vocato basilisco scitè ita refert, Cum basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus eiaculantur, comites notæ ita se habent. Transcuntes utique ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes ictus virulentos. Cap. XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis ictum, quod venenum vibrat, oris suctio conuenit. Sugentem verò oportet ieiunum non esse sed & ei

DIOSCORIDIS

bum sumpſiſſe, & vino os abluiffe: poſtea exiguum
 olei in ore continens plagam exugat. Locus ipſe
 ſpongia ſonendus, deinde ſcarificandus: ſed vlcuſ-
 cula altius imprimere expedit, quo viroſa mate-
 ries proſundo euocetur. Circinatio autem carnis,
 & ſectio, ſcarificatione longè potentius opitulan-
 tur: nanque ab ijs duo peculiaria præſidia ſunt.
 Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod
 eius veneni pars, que ad interiora graſſatur, cum
 multo copioſoq; ſanguine excernitur. Quod ſi locus
 ſectionem non admittat, cucurbitule cum largiori
 flamma adſigende ſunt. Sed iam de vſtione ſuprà
 in rabioſorū morſu diſſeruiſimus. Si verò iſta pars,
 vtpote extrema, eam ſectionem commodè non re-
 ſpuat, præſertim in omnibus ſerpentium iſtibus,
 vt aſpidis, ceraſtæ, ſimiliumq; proculdubio ampu-
 tanda eſt. Conuenientiora ſuprà dictis auxilia
 ſunt, que epithemata vocant. Imponatur ſarmen-
 titius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio ſtillatio ſube-
 actus, garo, & acri ſaſamento: porri, cepæ, & al-
 lia modo miniuſſime contrita illinuntur, modo cre-
 mata vulneribus inijciuntur. Quinetiam diſſecti
 gallinarum pulli, cum maximè tepent, percuffo lo-
 co applicentur. Nec deſunt qui hiſce tanquam diſ-
 cordia quadam naturali pugnantibus vtantur: ve-
 rum huius rationem inire facillimū fuerit. Galli-
 ne enim calidi natura præditæ ſunt, argumento,
 quod deuoratum inſigne virus cōficiunt, & aridiſ-

sima quæq; semina consumant, item nōnunquam
 arenas lapillosq; ingluvie sua deuoratos, dissoluūt.
 Itaq; animātis admoti calore adiutus spiritus, ab
 iēta parte impetū capeſſens exiliensq; secum vene-
 nū exigit. Nec me fugit quid in Aegypto fieri so-
 leat. Cū spicas Aegyptij metunt, ollam picis para-
 tam habēt, & appensam fasciam: tunc enim ma-
 ximē serpentij iniurias expauescunt, tum propter
 spicilegij tempus, tū quod opacis simul abdite spe-
 luncis & cauernis, densoq; aruorum caspite delite-
 scunt. Molestissima enim animalia et virus eructā-
 tia, Aegyptus in cāpis ferre cōsuevit. Vbi ergo aut
 in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt,
 qui adsunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, &
 semel aut iterum brachiū aut crus paulū supra
 vulnus obligant, & arctissimē duo ē præsensibus
 dīstringunt, locumq; secantes, qua circumactus est
 laqueus, picem instillant. Cumq; satis vulnus exce-
 pisse videtur, laqueum resoluunt, & capis alijsq;
 supra memoratis illiniunt. Præterea pix liquida cū
 sale trito & feruente illita, præsenteo est auxi-
 lio, si iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & si-
 mum caprarum ex vino decoctum. Locum aceto ca-
 lido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida
 muriā decocta, foueri salutare est. Quinetiam nō
 desunt emplastra vehementissima, & calidissima;
 quæ venenū elicere, expugnare, et discutere possūt.
 Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, &

DIOSCORIDIS

cachrye componuntur: de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incescit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephanti fel, crocodilinae sanguinem, oua; testulini, & consimilia. Nam cum iuuantia quaedam literis tradidisse videntur, planè in hac sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuotanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quo nostra fides ijs obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum praestiterint. Quae autem ad communem omnium usum pertinent, quaeq; facile suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Antibus itaque, & erica, & astra galus, cum aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virentes platani pilulae in vino diluto coctae, & paliuri decoctum: radix aristolochiae, & eryngij: decoctae etiam lauri baccae & deuorate, piperq; largius esitatum, ruta, anethum, et cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane aut allium, aut cepe, salsamentaq; quam acerrima: origani decoctum cum vino potum, foeniculi, pulegij, calaminhae, porrorumq; succus cum melle descriptus. Haec quidem à plantis conquiruntur. Ab animalibus verò quaedam vtiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum vino, itidem castorij sextans: testes maris

na testudinis sumpti multum prodesse traditur: mustela sale inueterata inter auxiliaia medicamenta est. Comendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum uino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent, hætenus. Percussus à serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, urina copiosè reddita. Sunt & compositæ quedam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum uino. Itidè syluestris ruta seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones trita, & cum erucæ succo subacta, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent: dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia uirulentorum
ictuum. Cap. XL.

INter ferientium uenenatorum notas nihil de uestpis et apibus articulatim digestimus, quod conspicuè omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his observaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus utrarumque ictus prodest illita malua, & hørdeacea farina cum aceto, sicul-

DIOSCORIDIS

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fatus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerē, adiecto sale trito, & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissimē tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactā. Ulcera aqua maris proluēda, aut apia stri decocto, foliaq; eiusdem illinēda. Lauacris perpetim vtendum, & propinādum abrotono semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedriles tritas, platani corticem, & trifoliae herbae semē: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina cōuenit. Item myrice fructus & chamepityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admiſto vino. Sunt qui fluuiatilis cācri expressi succum, cum lacte, assumpto apij semine, cōfestim molestijs liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sed quā lenissimē tritus ex aceto vulnere inspargendas, aut ruta sylvestris superponēda. Locus acidus muria fouēdus, & dāda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, praesenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatū. Scorpions ipse, qui ictum vibrauit, tritus, & percusso loco impositus, suae plagae remedium est, ob cecam quandam naturam (vt constat) discordiam, quae antipathia appellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & althea, scorpions conuenit. Sulphur

ignem non expertum, resina terebinthina exceptū,
 & emplāstri modo adiectum auxiliatur. Itidem
 galbanum ad splenij formam ductū, & calamin-
 tha, quæ trita illinatur, & farina hor lei in vino
 parata, in decocto rutæ. Semē trifoliæ herbæ tritū,
 & vulneri iniectum opitulatur. Hæc ad affectum
 locum pertinet. Post hæc quàm efficacissimis po-
 tionibus vtēdum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præ-
 sertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gen-
 tiana, & pulegium decoctū, & bacce lauri pau-
 co numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua
 magnopere discoqui debet: cupressus cum vino &
 ruta, nec secus ficulneum lac, la serpitum, si adsit:
 sin desideretur, peucedani succo vtēdum. Efficax est
 potus trifolij, & ocymij semē. Horum autem om-
 nium vicem p̄sat iugis lauacri vsus, euocatus su-
 dor, & dilute vini potiones. Ei, qui marina pasto-
 naca icitur, omnia quæ de viperarum morso paulo
 post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter
 autem ictus à marino scorpione, & dracone in-
 feruntur, qui molestos cruciatus cient: interdum au-
 tem, sed raro, nomas excitant. Quibus absynthij,
 saluie, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit.
 Pastinaca diuulsa & vulneri imposita, sui ictus
 medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur
 ex galbano splenium, per se vulneri exterius im-
 positū, vt medicamēti modo aceto tritum, & hordea-
 ceæ farina cū aceto mulso illita. Quinetiā mus ipse

DIOSCORIDIS

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
 sui ueneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pu-
 nici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita,
 necnon aque calide fozus: sed hæc ad locum perti-
 nent. Prodest potum abrotoni decoctū, maxime si
 in uino detur. Præterea serpyllum, & galbanum,
 & eruca uino madefacta, recentes cupressi pilule
 cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyre-
 thrum cum uino, & chameleonis herbe radix.
 Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderūt,
 tritum murem araneum contra suos ictus commo-
 de bibi. Quam historiā apud alios inuentam, di-
 gnā duntaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij
 asseuerant demorsum non aliās exulcerari, nisi præ-
 gnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari fe-
 ruit. Si uipera morsum impressit, finum caprinū
 cum uino, studiose impositum opitulatur. Item lau-
 rus, & abrotonum, & galbanum spleny loco su-
 periectum, & origanū uiride inditum. Pulli galli-
 narum discerpti, & confestim admoti: erui farina
 uino subacta: radice cortex usque eò tusus, ut in
 puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum
 chamamelum hordeaceæ farine cataplasma in
 aceto mulso preparatum: sed locus antè eo calido
 foveatur. Hæc loco imponuntur. Contra uiperinos
 ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam te-
 rui folio constantè auxiliari produnt. Leporini co-
 aguli in uino terui oboli bibuntur, et porracei succi
hemina

hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia mādenda, & cape, & porri recentes, salsamenta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sūt. Percussis à vipera præclare auxiliatur medicamētū, quod myrrha, piperis, castorei floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo cōstat: hæc oīa in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus ī eo libro, qui πει δι' ὀφθαλμοῦ, id est de viribus, inscribitur, pleraq; alia tradidit, quæ ictis ab vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudātur, Gallinacea cerebella cum vino pota, semen sativæ brassicæ tritum, & acetabuli mēsurā cum vino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidā pacē intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt, quæ contra vipera ictus auxiliantur. De amphibana mentionem hoc loco fecimus, quoniā ferè remedijs ad viperas scriptis, percussi ab ea adiuvare soleant. A dryino ictis convenit aristolochia cū vino pota, trifolium herba, radix hastulæ regie similiter assumpta, et fructus ex omni quereus genere, & tusa ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur. Hemorrhoidis dipsadisq; morsus velut imedicabiles à plerisq; maiorū deplorati relinquebantur: quare si peculiaribus cōtradipsadē remedijs egeamus, cōmunia experiri operæpretiū erit. Protinus autē scarificatione vti, vstionem facere, et si locus

DIOSCORIDIS

patiaturs, extremorum amputatione opus erit: con-
 sequenter quàm acerrima cataplasmata admoue-
 re, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit,
 acres cibos, maximè à salsamentis, vtilis esse. Me-
 race potiones et lauacra prosunt, quæ subinde in-
 teriecto breui spatio assumenda sunt, priusquam
 morbi genus emerferit: quo semel erumpente, opem
 ferre non potest vlla medici opera. In ictu hamor-
 rhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune opi-
 tulantur, vt scarificationes, vñtiones, acres cibi, me-
 raci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus.
 Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle tri-
 ta. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tri-
 tum & aqua subactum, lixiuia cum oleo indita,
 aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minu-
 tim contrita, & hordei farina cum aqua & mel-
 le colliquata. Bibuntur etiam bina aristolochiæ
 drachmæ in potione poscæ cyathis duobus deinceps
 marrubij succus, vel decoctum alterius cum vino.
 Fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio
 auxiliatur lactuca fructus cum lini semine illitus,
 & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllū
 cum duabus hastule regiæ drachmis, & tribus
 vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item carda-
 momum & gentiana. Si cerastes percusserit, cita
 partis amputatio suffragatur: quare sine mora
 ictam partem amputare, aut scalpro confestim
 circumcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vren-

tia insuper reliquis admouenda, siquidem virus
 hoc veneno basilisci simile est. Is, qui ab aspidē fe-
 riuntur, quæ de cerastē scripta sunt auxilia dari
 debent. Nam venenum hoc, quemadmodum basili-
 sci, aut sanguis bubulus, celerrimē in arte-
 ris sanguinem cogit. Ad basilisci mor-
 sum, vt Erasistratus author est,
 auxiliatur castorii drach-
 ma in vino pota. item pa-
 paueris succus.
 Ictuum reme-
 dia ita se
 habent.

SEXTI ET VLTIMI
 LIBRI FINIS.

Mm ij

NOTHA ET DIOSCORIDI

falso adscripta, quæ ut facile, si quis
ita uelit, suis singula locis appli-
centur, numeris notantur.

5. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thelpide, ab
alijs vrania, à nonnullis catheron aut thaumas-
stos, à Romanis marica radix, à quibusdam gla-
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecratrix, ab
Aegyptijs nar appellatur.

6. Aliqui choron aphrodisias, Romani vene-
ream, aut radicem nauticam, Galli piper apium
vocat.

6. Romani iunci radicem aut iuncum.

9. Magi sanguinem Martis, Latini perpensam,
alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptijs cerea,
alijs nardum rusticum, Galli bacchar, Hetrusci suc-
cinum: odorata herba est, qua in coronamentis
vtuntur.

10. Quibus odor inest cinnamomo proximus:
asperum siccumque solum amat. Eius radix, ru-
ptis, conuulsis, in tussi vetere, & spirandi difficul-
tate, & si vrina egrè redditur, opifera est: menses
ciet, contra serpentium iclus, eam in vino bibere
salutare est. Folia, vt quæ adstringant, illita capie-
tis doloribus, oculorum inflammationibus, incipiē-

tibus agylopijs, mammis tumentibus à partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Cratonas herbarius de eo ita scriptum reliquit: Asarum.

14. Alij sphagnon, alij phasganon, Syri diaxylon vocant.

16. Ab aliquibus caſtor, ab alijs cynomorphos, à Magis Herculis sanguis appellatur.

16. Symphyton aliqui vocant, alij persicam, alij medicam, alij oreſtium, alij neſtario, alij cleoniā: alij ideamboton, aut phlomū idæum, Latini terminalium, aut enulam campanam, Aegyptij lenen.

36. Iuniperum parvam Græci arceuthida, aliqui mneſitheū, alij acatalidem. Aphrixuorinſipa, Aegyptij libyum, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant.

37. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus magna, quā aliqui ſylueſtrē cupreſſum appellāt, alij mneſitheū, alij acaterā, Romani iuniperū, vulgò cognita eſt, cupreſſo aſſimilis: aſperis maritimisq; locis plerūq; naſcitur, eaſdē quas ſupradicta vires habēs.

37. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Romanis herba Sabina appellatur.

40. Rhāmnum alij perſephonion vocāt, alij leucacantham, Romani ſpinam albam, aut cerualem ſpinam, Aphri atadim.

40. Halimum alij damafonium vocant, alij erimon, alij britanicam, alij rhabdon, alij baſilion, Magi Mercurij baſim, aut Oſiridis diadema, alij

DIOSCORIDIS

elystephanon, aut sacrum caule, Pythagoras anthe-
noros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascaluri,
alij asariphen, Latini albucium aut ampeluciam.

45. Agnon aliqui agynon, alij lygon vocant, alij
amictomianon, alij tridactylon, Magi semnon, alij
hemaideos, Aegyptij sum, Romani salicem mari-
nam, alij piper agreste, alij lecristicum.

63. Eorum venter sale conditus, & in umbra
siccatus, contra eximias vacuationes medicamen-
torum, trium drachmarum pondere, praesenti est
auxilio. quandoquidem protinus deiectiones cohibet.
Teri autem debet in farina, et aqua subactus dari.

81. Telin, alij carpon, alij buceron, alij egocero,
alij ceraitiden, Latini scenum graecum appellant,
Aegyptij itasin.

82. Aliqui linocalamini vocant, alij annon, alij li-
non agrion, Romani linum, Pœni zeraphoes.

84. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij bre-
chon vocant.

85. Gongylen satiuam, alij gongylida, alij gol-
gosium, Romani rapum vocant.

85. Alij polyides eryngium, Aphri thorphat.

86. Sylvestris raphanus, quam Romani armo-
raciam vocant, alij montanum raphanum, alij
apium, alij ischada, alij chamae balanum. Romani
etiam radicem sylvestrem: ramulos tenues, iuceos,
duos siue tres spargit, rubentes: folijs ruta sylue-
stris, oblongioribus, & angustioribus: semine para-

no: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyriformi
gura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars
radicis superior vomitione bilem pituitamq; extra-
hit, inferior per aluum, tota susq; deq; purgationes
mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere,
radix tusa in fictili mergitur, & qui supernat
succus pinna eximitur. Is sesqui obolo potus,
utraque parte purgat.

86. Romani napium dicunt.

86. Aegyptij echlotripam appellant, alij ripla,
Romani blitum, Daci bles.

86. Pythagoras anthema vocauit, Zoroastres
diadema, Aegyptij chocortem, Magi lienem caprae,
aut muris urinam.

87. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aegyptij
sehi vocant.

87. Cramben Romani brassicam vocant.

87. Romani rusticam appellant.

88. Portulaca sylvestris. Cap. Sylvestris portu-
laca, quam aliqui aixō sylvestre vocāt, alij telephiō,
Romani illecebrā, aliqui portulacā, Aphrimœmoē,
Daci lax, Aegyptij mochmutim, folijs pusillis, ad
satiā accedētibus, hirsutis, latioribus. nascitur in
petrosis, nonnunquam in hortis, folia olea habet, mi-
nora multo, plura & tenera, rubētes cauliculos, ex
vna radice multos, in terra sessiles, qui māducati
bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantū sale-
si. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discutit

DIOSCORIDIS

Strumas, cum axungia illita.

89. Aliqui petreon, alij myacanthan, alij myon vocant.

89. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probastion, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij polyneuron, Magi eurenemona, Aegyptij asonth, Romani plantaginē, Hispani thesaricā, Pœni atijrcō.

90. Syrius plantaginis, & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

90. Aliqui aquatilem anagallida, alij darenion, alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

90. Alij Veneris coronam, Romani veneream, aut eusteralem.

90. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Pœvis atirsite, Romanis caciatrix, alijs stilago, alijs sanguinaria dicitur.

91. Sonchon asperum aliqui cichorion vocant, Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

91. Alij picrida appellant, Aegyptij agon, Romani intubum.

92. Thridaca hemeron, Romani lactucam sativam, Aegyptij embrosi dicunt.

92. Magi sanguinem Titani, Zoroastres phearumbrum, Romani lactucam sylvestrem appellāt.

93. Romani bisacutum, Aegyptij dorisatru, Sy-

ri adorium, Aphri tiriſta appellant .

93. Romani herbam ſcanariam, aut aculam nominant.

93. Alj caucum, alj myitin, Democricus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem pulli, Aegyptij ſeſelin vocant.

93. Euxomon Romani Erucam vocant, Aegyptij ethrericem, Pœni aſuric.

93. Alj cynomoriõ appellant, à ſimilitudine canini genitalis, alj leonem, Cyprij thyrſinem, communiter lycon .

95. Crommyon aliqui polyidos vocant, Magi calabotim, Romani cepam.

95. Græci ſcorodon, alj geboscon, alj ſlaphoboscon vocant .

96. Romani ſinape vocant .

97. Cardamon alj cynocardamon, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs ſemeth, Romanis naſurtium dicitur .

97. Aliqui thlaſpidion, alj ſinapi Perſicum, alj myiten, alj ſylueſtre ſynapi, alj daſmophon, alj myopteron, alj bitron, Aegyptij ſui tempſum, Romani ſcandulatum, alj capſellam, aut pedengalinaceum vocant .

97. Aliqui chamæplion, Magi Herculis alphita, Aegyptij erethmon.

99. Ab aliquibus cerdon, ab alijs catharſis, ab alijs ſtruthocamelus, à quibuſdã chamærrhytõ, à

DIOSCORIDIS

Magis callirrhytō, ab Aegyptij ceno, à Poeniis syris,
à Latinis lanaria herba. aut radícula appellatur.

99. A quibusdam cissanthemon, ab alijs cisso-
phyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron,
ab alijs silene, à Zoroastre triūphalites, ab Osthane
aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesce, à Ro-
manis rapum terræ, aut terræ umbilicus, ab alijs
arcar vocatur.

100. Dracunculus. Cap. Draguntium magnum
aliqui aron, alijs isaron, alijs iarō, alijs hieracium, alijs
biaron, alijs armigrion, alijs ciperida vocāt: in um-
brosis sepibus gignitur. Caulem habet rectum, le-
uem, duum cubitorum, baculi crassitudine, versico-
loribus draconum maculis, purpureis tamen eui-
centibus: folia rumicis, inflexa. fructum summo
caule facit, racemosum, coloris primum cineracei,
mox per maturitatem in crocum & purpurā ver-
gentis: radicem pregrandem, rotundam, cādidam,
cortice tenui vestitam. Colligitur, & dum matus
rescit, succus exprimitur, siccaturq; in umbra. Ra-
dix quoq; mensibus effoditur, elotaq; particulatim
conciditur, & funicula transfixa siccatur in um-
bra. Cum diluta potione, crudam coctā mēue, cum
melle delingi prodest, contra orthopnoeas, rupta, cō-
uulsa, tussim, & destillationes: pota cum vino ve-
verem stimulat: vlcera quæ cacoethe vocantur at-
que phagedemica, expurgat, præsertim cum vite al-
ba. ex ea & melle collyria ad fistulas & partus.

NOTHA.

enocandos componuntur: ad vitiligines cum melle, efficaciter illinitur: polypos & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albuginesq; effectum præbet: herbe radicesq; odor, teneros conceptus abortus vitiat: item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius succum cum oleo aurium doloribus infundere: quinetiâ folia, utpote quæ adstringant, vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse à vipera feriri inficiantur.

101. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracontia, Cyprij colocasion dicunt.

101. Græci asphodelon, alij narthecion, Romani albucum vocant.

101. Floret messibus albucum. Quare æquinoctio verno, antequam semine adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupiditatem inhibere, quod herbarius Crateuas assuevit: additque sanare podagrae dolores, si drachma potere bibatur.

102. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad suppurationem perducunt, & rumpunt.

103. Aliqui cynosbaton alij capriam, alij corni malum, alij ophioscorodon, alij phyllostaphylon, quidam thalliam, aut petream, alij olophyton, alij ionitem, nonnulli oligochloron, aut acotigon, aut hippomanes, alij trichomanes, Magi po-

D I O S C O R I D I S

zera, alij pentheron, aut cor lupi, alij alofchorodon,
alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi
aut nuturim, Aphri herbia athon.

104. Ranunculum aliqui syluestre apium vo-
cant.

104. Anemonem, alij agriam, aut nigram vo-
cant, alij anemonen phœnicam, alij enemion, non-
nulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinen,
aut harbylam, Osthane berilion, item ornios cera-
nion, Pythagoras attractilida, Magi cnicū agriam,
Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

105. Aliquibus unone vocatur, alijs anthemis,
alijs homonœa, aliquibus flos campestris, Roma-
nis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia, Gallis
corona.

105. Ea, ut herbarius Crateuas author est, con-
misa cum axūgia strumas discutit. Cribrata eius
farina cum nitro, & sulphure ignem non experto
contra vitilignes efficax est: easq; sicco linteo an-
tea cōfrictas in balneis sanat: facit & ad scabiē.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone,
quam artemonem aliqui, alij arselam, aut sarco-
collam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syl-
uestri papaueri similis est. Recens trita interci-
siones impositu sanat. oculorum inflammationes
mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur &
vulnera conglutinat: convulsis, & vellicatibus im-
posita medetur, inflammationibus utilis, contra

NOTHA.

serpentium morsus cum vino bibitur.

105. *Anagallis purpurea*, quibusdā *aeritis* aut *egitis* vocatur, alijs *sauritis*, Magis oculi sanguis, aut *chelidion*: Romanis *macia*, Hetruscis *masysipos*, Gallis *sapana*, Dacis *cerceraphron*. *Anagallis* communis, quibusdam *corchoron*, alijs *halicacabon*, alijs *xeliaurus*, Magis *nycteritis*, Aegyptijs *mecij*, Romanis *aneciaton*, Aphris *asirrisæ*.

105. Aliquibus *citharō*, alijs *cissaron*, alijs *chrysocarpos*, alijs *poetica*, alijs *corymbethra*, alijs *cysfion*, alijs *dionysia*, alijs *ithytheriō*, alijs *persis*, alijs *cemos*, alijs *asplenos*, Romanis *sylva mater*, alijs *hedera*, Gallis *suibites*.

106. *Chelidonium* magnam nonnulli *peoniam* vocant, alijs *crateam*, alijs *aubium*, alijs *glauciam*, alijs *pandios radix*, quidam *philomedion*, alijs *othonion*, Romani *fabium*, Galli *thonan*, Aegyptijs *mothoth*, Daci *crustana*.

107. *Auricula muris*. Cap. *Myosota* alijs *myosoton*, alijs *anthyllion*, alijs *alsinen*, nonnulli *myorthoccon*, alijs *myrthosplenon*, Latini *muris auriculam* vocant, Aphri *labatholabat*. Nomen ideò accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur. Lucos & fabulosa loca amat, ideò *alsine* dicta est. Ea *helicina* similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur: in totum eadem po-

DIOSCORIDIS

test, quæ helxine .

107. Afatis sativa aliquibus augion, alijs egne. Magis arufion, Romani gluta aut glastum dicitur.

107. Sed sciendum est, ne tra lita errorem pariant, sativum glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos lingue speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulemq; supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiore: florem purpureum, aut coeruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito. divisum.

107. Aliqui sylvestre semperivum, alijs portulacam sylvestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurim.

109. Aliqui rhiam vocant.

109 Aliqui centauriam radicem, alijs aloen Gallicam, alijs narcem, alijs chironion, Dardani aloitin, Romani gentianam aut cicendiam, alijs ciminalē vocant.

110. Alijs melocarpus, alijs teuximon, Latine aristolochia.

110. Appellatur à quibusdam ararisa, & mele caprum, ephestios, lestitis, pyxionyx, Dardanion, iontitis, Callis theximion, Aegyptijs sophoeph, Siculis chamamelon, Italis malum terre, Dacis absyn

thium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus: & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si nidore subditis carbonibus sebricitans suffiatur, febris lenabitur. vulnera impofitu sanat: carcinomatis narium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest. rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq. Crates uas herbarius, & Gallus, eadem de hac tradiderunt, & præterea podagricis eam auxiliari.

110. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithra, alij libyestason, alij homœnomœon, alij peenthaomœon, Latini dulcem radicem appellauere.

110. Aliqui narcem vocant, alij lymnesion, alij maronem, alij pleetrontam, alij chironiam, alij limnestim, Magi Herculis sanguinem, Romani phierri, & vneferam, & fel terra.

111. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnerum vrinae stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sola ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

111. Aliqui limnesion, alij helleboriten, alij amarathon, Magi Herculis sanguinem, Latini fe-

DIOSCORIDIS,

brifugam, alij auram, multi radicem, Daci tulbelā appellant.

111. Quibusdam chrysisceptron, alijs ixia, Romanis carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur, alijs ephthofechin.

112. Pancarpon aliqui, alij vophonon, alij ixia alij cynomaxon, alij ocimoides, alij emidion coccon, alij cynoxylon, Latini carduum nigrum aut verni laginem, Aegyptij sobel vocant.

112. Aliqui crocodilion vocāt, alij chameleonē, alij onocardion, alij Veneris lavacrum, Romani labrum Veneris, alij Carduum Veneris, Aegyptij seneor, alij chir, alij meleta, Daci sciaram.

113. Aliqui agriocinnaram, alij donacitim, alij erysisceptrum vocant, Romani spinam albam aut regiam, alij carduum ramparium.

113. Queacanthi aliquibus dicitur.

113. Aliās pherusa, aliās pyracantha nominatur, in Aegypto cibus.

113. Aliqui phrymion, aliqui acidoton.

113. Acantham aut herpacantham, quidam melampyllon, aliqui topiariam, alij mamolariā, quidam crepulam vocant.

114. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij ischiada vocant, Romani spinam albam.

115. Aliqui eryngē, alij erynerē, alij caryon, alij gorginon, alij hermiō, alij organū, chlounion, alij myacanthon, alij moly, Aegyptij crobysion, Magi syferton.

NOTHA.

syferton, Romani capitulum Martu, Daci sicupno ex, Hispani centumcapita, Aphri cherdam, alij oriam chloem, alij chida appellant.

115. Aloe aliquibus amphibion, alij herminion, alijs eryngion, alijs tragoceros, Romanis aloa, Barbaris aloë dicitur.

116. Aegyptij somi, Romani absynthium.

116. Latini Sandonicam vocant.

117. alij abutunon, alij absynthium, alij herasclion, alij cholopæon, alij absynthiomenon, alij thelyphthorion, alij procampylon, Magi æuraphænicos, alij cynanchitē, Romani absynthium ponticū, nonnulli thelythamnium, alij glycin ancona vocāt.

117. aliqui later vocant, alij cassialā, Aegyptij pesalem.

117. aliqui syncliopa, alij alcibiadem, alij pancration, nonnulli styphoniam, Aegyptij suphlo, Magi pythonis oculum, Romani sciolebinam vocitant.

118. vers. vlt. Glichona alij blechron, alij arsencanthon, Latini pulegium vocant, Galli aluolum, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

119. alijs embactron, alijs belonacos, alijs artemedeion, alijs cretica, quibusdam ephemeron, nonnullis eldia, aliquibus belotecos, aut dorcidion, aut helbunion, Romanis vstilago rustica.

119. alij elaphoboscon, aliqui phacon, alij ciosmin, alij phagnon, Aegyptij becion, Romani sal-

DIOSCORIDIS

niam vocant.

120. Hedyosmon sativum alii minthā, alii calamintham, Latini mentham vocant, alii nepetā, Aegypti tū, alii pherthrumerthumonthu, alii peraxo, alii maceto.

120, quidam cephaloton, alii epithymida, alii thyrison, Latini thymum, Aegyptii Stephanen, Dacsi mosulam.

121. aliqui xygin sylvestrem, alii polion vocant, Aegyptii meruopyum, Latini serpyllum.

121. aliqui nominant amaracum, alii triphyl-
lon, alii agathides, alii cnecion, alii acapnon, Pythagoras thramben, Aegyptii sopho, Armenii myrron, Magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini maioranam.

122. aliqui origanida, aut hysobriū vocant.

122. alii sylvestre basilicū, Latini ocimastrū.

122. ruta montana, quam aliqui rhyten montanam vocant: & hortensis, quam Aegyptii epnubum, Syri harmala, alii besafa, Aphri churma.

123. Sylvestris ruta Cap. Rutam sylvestrem aliqui appellant hypericon, alii androsemon, alii coron, alii chamæpitin, Romani hederalem, aut cetonalem, Aphri churma semmaced, odor seminis resinofus est, ideo chamæpitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia ruta figura: flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant, unde androsemon vocitarunt. Ramuli

subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur incultis & asperis. Urinam ciet, menses appositum trahit, pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis illi medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

124. aliqui sylvestre leucoion appellant.

126. aliqui cerascomen vocant, Latini rusticâ fastinacam, aliqui carotam, Aegyptii babibyron, Aphri sicham.

126. nonnulli sphagnon vocant.

126. Aegyptii cyonum phricem vocant.

127. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alii anicetum, Magi cynocephali genituram, aut capillos, alii Mercurii semen, Latini anethum, Aphri sicciriam Aegyptii arachu, Daci pulpum.

127. siue cuminum syluaticum.

128. Ammi, Latini ammiu Alexandrinum, quidam regem cuminum appellant.

128. Aegyptii ochion vocant, Aphri gæd.

128. alii sonchites, Romanis lampuca, Pœnis sthileas.

128. aliqui sonchiten, alii entimon agrion, Romani intybum sylvestrem uocant.

129. a quibusdam pedion, ab aliis hydrofelinon agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

129. aliqui petroselinon sylvestre appellant, Aegyptii anonim.

DIOSCORIDIS

129. aliqui grielon, alijs agrioselinum.

130. aliqui elaphicon, alijs nephriion, alijs ophigonion, nonnulli ophioctonon, aliqui herpycen, alijs lymen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij chemin, Aphri ascaucau.

130. hippomarathron, aliqui marathin, alijs marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, Magi thymarnolion, Latini fœniculum erraticum, aliqui mion, Galli fistrameor.

131. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs paralyfis, alijs camarus, alijs hyacithus, alijs delphinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron, aut cro mion, Romanis bucinus minor vocitatur.

131. aliqui dorycnion, alijs pyrinon, alijs pyrotō, aut pyrothron, alijs arnon pyriten, Magi pyriten, Romani saluarem vocant.

131. aliquibus Zea aut campsanema appellatur.

132. aliqui arangem vocant, alijs phalangion, alijs asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, quidam chorodanon, aut cenanthen, Romani herbam rutinalem, Aegyptij apsapher, Magi osirin.

133. aliqui agrion vocant, alijs agriophyllō, Magi bonum demonem, Romani satariam.

134. aliqui melanthium, alijs mecona agriō melana, Romani papauer nigrum appellant.

137. herba est, ex qua ammoniacum fit suffimen, quod thymiana vocant, aliqui agazyllon,

MEIN

aliū eriotheum, aliū heliustrum, Romani guttam.

138. aliqui ampelocarpon, aliū omphalocarpon, nonnulli philanthropon vocant.

138. aliqui aspidion, aliū haplophyllon, aliū accyseton, aliū adyseton nuncupant.

138. aliqui cission, aliū cissophyllon.

138. aliqui armyrō vocant, aliū enicō syluestre, aliū aspidion, Magi aphedron, Aegyptij chenō, Romani præsepitū, aliqui fusum agrestem, aliū colum rusticam.

139. quidam clinopodion, aliū polygonaton, aliū Iouis colum, aliū echeonymon vocant.

139. Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ violentie vocantur, magno esse presidio.

139. aliqui cleonicon, aliū ocimoides, aliū xopyron vocant.

139. aliquibus leontopodion, aliū leuceoron, alijs leontion, alijs doris, aut doriſteris, alijs lychnis agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rhapeſion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Romanis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

140. aliqui athanathon uocant, aliū acylonion, aliū ballarion, aliū geranopodion, quidam corymbion, aliqui taurion, aliū ſceptron, aut maloion, Aegyptij ſemeon, Magi ſanguinem apocathemenes, Romani genicularem aut ballariam.

140. aliàs tragonaton, aliàs atocion, aliàs hiera

DIOSCORIDIS

copodion, aut lampas vocant, Aegyptiis semura,
Magis apocathemenes taurus, Romanis agreste in
tubum.

140. Crinō basilicon alii crinanthemon vocāt,
alii gallirion, Magi Martis sanguinem, Osthane
aurem crocodili, Aegyptii symphaphon, quidam
tialō, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Syri sasa,
Aphri abiblabon.

140. Alii magnū vocant, aliqui naphthan, alii
notianoscemin, alii nosprasson, alii nothera, alii no
chelin aut nostellin, alii nophryn, alii gnotorim, alii
gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut ulce
ariam, aut marrubium nigrum, alii canthurinū.
Aegyptii asphon, magi lisionis sanguinem.

140. Alii melyteon, alii meliphyllon, alii ery
thran, alii temele, Latini apiastrum aut citraginē,
Galli merisimorion vocant.

141. Praslon, alii eupatorion, alij phyllophares,
alii tripedilon, alii camelopodion, Aegyptii asteros
pen, Magi tauri sanguinem, aliqui aphedron, alij
Horigenituram, Latini marrubium, aliqui labeo
niam, Aphri atierberziam.

141. Aliqui phyllia, alii acaulon, alii sylvestre
lapathum vocitant.

141. Aliis leucacantha dicitur.

141. Alii cuicion vocant, Romani trifolium acu
tum, aut odoratum.

142. Polium montanum, aliqui teuthrion, alii

pheux aspidion, alii achamenin, alii ebenitin, alii melosmon, nonnulli belion, quidam leontocharon vocant.

142. Aliqui scorbion, alii pleuritin, alii disosmō, alii syluestrem calaminthen, quidam chamedryn, alii mithridanion, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij apho, Romani trissaginem palustrē appellant.

143. Pechion quidam rhechion, alii petrinam vocant, alii peganon, alii pithion, alii pagonaton, alii chameleucem, alii procheton, alii arcophyton, alii chamageron, Aegyptij saarthan, Latini tussilaginem, quidam pharphariam aut postulaginē, Bessi asa.

143. Quibusdam polyclonos, alii monoclonos, alii toxitesia, alijs ephesia, alijs anaetorios, alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, Magis hominis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanis valentia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia, alijs rapiū, aut tertana, Gallis pona, Dacis xuose dicitur.

143. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum ductus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sampsiuchi odorem reddunt. Si quis Stomacho laborās, herbam cum amygdalino oleo bene contundat in malagmatis lentorem, & Stomacho imponat, sanitati restituetur: qui nervorum dolore cruciatur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

143. Romani caprum syluaticum vocāt, quidā

DIOSCORIDIS

botryn, alij apium rusticum, Aegyptij merseon.

144. Aliqui Pelonitin, alij tricam, alij geranon geronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen appellant.

144. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij oxyphyllon, alij cardamomon, alij origanum vocant, Magi hierobryncas, Latini gruinam, aut pulmoniam, aut cicotriam.

144. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocon, alij anaxiton, alij anaphalin, Aegyptij semeon, Galligelasen, Latini centumculum vocant, quidam tunculare, alij albinum.

144. Aliqui cerascomion, alij leucanthon vocitant.

144. Conyza magna. Cap. Conyza magna aliis quibus cynoxematitis, aliis danaus, aliis tanachio, aliquibus phycos, aliis ischys, aliis dynosmos, Magis brephoctonos, quibusdam anubias, nonnullis hemidemias, Aegyptijs ceti, Romanis intybum, aut militaris, aut delarium, aut febrifuga, aliis phragmosa, aliis musteros, aliis pissa nuncupatur.

145. Aliqui conyzam parvam, alij panion, alij libanotidem, Magi cronon vocant.

145. Alij hemerocatalacton, alij crinon agrio, alij crinanthemon, alij porphyranes, alij bulbum hemaricon, alij anticantharon, Aegyptij iocri, Romani bulbum, aut lilium sylvestre, aut marimum, Aphri abiblabon vocant.

NOTHA.

145. Aliqui basilicon vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

146. Alij melion aqueum, alij entaticō, alij priapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

146. A Latinis geminalis, à Dacis hormia dicitur.

147. Aliqui osmada, aliqui ononin, alij phlonistin appellant.

147. Hanc nymphona alij vocant.

147. Sunt qui picrada appellent, alij leucen, alij thalassiam.

147. Alij pteryx, alij lonchitim, alij aturion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodoten, Magi mustele sanguinem.

148. Quidam anthyllon, alij anthemida vocāt, alij eranthemin, alij leucathemon, alij soranthin, alij campestrum florem, Romani solastrum.

148. Anthemida aliqui leucanthemon, alij eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamæmelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melanthemon, alij chrysocomam, alij calliam, Romani malium, Aphri aſtertiphen appellant.

149. Alij anthemida, alij leucanthemō, alij chamæmelon, alij chrysocalin, alij melæbathrō, nonnulli campestrum florē, Romani solis seculum aliqui millesolum. Hetrusci cantam, Aphri thamath.

DIOSCORIDIS

149. Alū balsamenam, Magi hemorrhan, alū Mercurij genituram, alū aphthitis semē, aut mne si theum, Romani Cappacoraniā, Aphri narat.

149. Alūs orobelio, quibusdam orobax, alūs he magogon, alūs pæsedon, alūs monogenion, alūs menio, alūs pæoniō, alūs pāthiceratos, alūs idæi dactyli, alūs aglaophotis, alūs theodonion, alūs selenio, Magi selenogonon, alūs phthisis, Romanis casta.

150. Alū egorychon vocant, alū leontion, alū leoninum lapidem, alū gorgonion, alū tantalitin, alū diosporon, Romani columbam, Daci gonoletā, alū heracliam.

150. Aliqui teuthrion, alū dracanon, alū cinnabarim, Latini rubiam, Hetrusci lappam minorem, Aegyptij sophobi vocant.

150. Aliās cestron aut medusa dicitur, Latine venerea aut lanceola.

151. Latini longinam, aut calabrinam dicunt.

151. Alū althiocon vocant.

151. Aliqui cannabion, alū schinoſtrophon, alū asterion appellarunt.

151. Aliqui hydraſtinam, Romani terminalem dicunt.

152. Aliqui acopon, alū anagyron, alū agnacopon, vocant.

152. Alū alceam, alū acyron, alū lyron.

152. Aliqui onobrochilon, alū eschasmenen, alū hypericon, alū corion, alū chamæpytin, Romani

opacem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocinale,
Daci aniaffexe appellant.

153. Alij ascyron, aut dionysiadem.

153. Alijs pitysorysis, alijs orixelon, ijs qui Pontu incolunt olocyro, alijs bryonia sylvestris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, Magis Minervae sanguis, Latinis ainga aut cypripu, Dacis dochela appellatur.

154. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices: animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta: gravibus somnis resistit: ad omnem medendi usum commendata, Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureos. Farina recetis vulneribus capitis indita, dolorem finit: vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi debet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iure decocti persundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

155. Aliqui polygonatum appellant, alij cynochalam, alij heracliam, alij asphalion, alij chiliocephyllon, alij clemata, alij polycarpu, alij carcinethro, alij teuthalida, alij myrtopetalon, alij cnopodion, alij xaritheam, alij pedalion, Aegyptij thephin, aliqui stemphin, Magi genituram herois, aliqui vnguem muris, Latini sanguinariam aut seminale, Aphrichulum.

DIOSCORIDIS

156. Alijs phileterion, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

156. Aliqui epigeton, Aegyptij philacum, Romani ambuxum vocitant.

157. Romani soldaginem vocant.

157. Rutaceis similes.

157. Alij tobion, Romani stipam vocant.

157. Alij calycanthemon, alij periclymenon, alijs heliophyes, nonnulli hepatitim, alijs milacem, alijs anatolicon, alijs diticon, alijs merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptij oxyui, alijs clymenon, alijs clymenion, quod & agonon nuncupant.

158. Aliqui Aeginam, alijs clymenon, alijs carpathon, alijs splenion, alijs epetitum, alijs axinam maiorem, nonnulli clematitim, alijs myrsinen, alijs calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

158. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauruceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

158. Saxiphagon. Cap. Saxiphagon, aliqui saxiphrangon, alijs empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: Strangurie prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit, & urinam ciet.

158. Aliquibus potamogiton appellatur,

N O T H A.

*alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rampion, My-
sij mendruta, Syris neuda, alijs lycosemphyllon :
alijs helleborosemata, alijs scyllion, Magis lupicor,
Romanis viartum nigrum, quibusdam tintinabus
lum terra, Gallis iumbarum, Dacis dacina.*

158. Aliqui leporis cuminum appellant.

159. Aliqui medicam appellant, alijs triphyllo,
alijs clemation, nonnulli osmon, quidam trigonon,
alijs cypellion, alijs polyphyllon, Romani trifolium
odoratum, Aegyptijs epaphon.

159. Ab alijs erineos, ab alijs thrias, à nonnullis
pollyrthizon, à Romanis vindicta nominatur.

159. Aliqui anaclorion, alijs phasganon, alijs ma-
cheronion, alijs arion vocant, Romani gladiolam,
quidam genitalem.

159. Alijs boton vocant.

159. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos, à
Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis as-
prus dicitur.

160. Anchusam aliqui catanchusam vocant,
alijs libycam, alijs archibellion, alijs alcibiadion, alijs
onophyllon, alijs porphyrida, alijs mydusam, alijs sa-
lyca, alijs noneam, Aphri bumesath.

160. Aliqui aridam, alijs alcibiadion, Romani al-
cibiaccum nominant.

160. Aliqui & hanc echion vocant, alijs scorpius-
ron, alijs sparganon, alijs altheam, alijs amarantis-
da, alijs probateam, alijs elaphion, alijs antiminon, alijs

DIOSCORIDIS

porphyrida, alii augion, alii nemesion, alii phileterion, alii hyenopsolon, alii thyrsitim, alii thermustin, alii misopathos.

161. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

161. Agrostin aliqui egicon, alii amaxium, Aegyptii amphivocant, Latini gramen, aliqui asphyllion, alii sanguinalem, alii violam, Hispani apuriam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

161. Magi genituram, aut sanguinem Titani, alii scorpionis urinam, Pythagoras parmiron, Andreas xanthophanea, Osthanes beephthalmion, Aegyptii sendionor, Romani vertemnum, alii soieastron, Aphri udedonin.

162. Aliqui myriomorphon nominant, alii chiliophyllon, alii stratioticon, alii heracleon, Latini supercilium Veneris, alii acron syluaticum, alii militarem, alii millefolium.

162. Batos, ab alijs cynobatos, ab alijs selinortio, ab alijs asyntrophos, à Magis Titani sanguis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus, ab alijs sentes, à quibusdam mora baticana, à Dacis martia, Aegyptij hemoos, alijs ametros appellatur.

163. Alii hepatorium, aut hepatitis, Romani uolucrum maius.

163. Pentaphyllon aliqui pentapetes, alii pentatomon, alii pentadactylon, alii pseudoselinum, alii caliperaton, alii xyoloton, nonnulli xylopetalon, alii asphalton, alii pentacemon, alii thymat. ti,

NOTHA.

Aegyptij orphitebeocen, alii enotron, Magi ibidis vnguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon, Romani quinesfolium, Galli pempedulam, Daci propedulam appellant.

163. *Aliqui rhon, alii anchinopa, alii phœnicopterion, alii rhon stachyos, alii osthalen, Aegyptii athnon nominant.*

164. *Alii rhodida nominant.*

164. *Hippurin, alii trimachion, alii anabasin, alii cheredranon, alii phedran, alii itiandendron, alii gis, alii schœniostrophon vocat, Aegyptii pherphram, Magi Saturni cibum, Romani equinalem, alii equi salicem, aut anabasion, alii ephydron.*

164. *Aliqui equition, & alii chedran, alii gyon, Romani salicem equinam appellant.*

164. *alii scorpion, alii garganon, Romani cornu lacam, alii bituensa, Daci saliam, Aegyptii sober, Aphri achæosim.*

165. *Oxy schœnos aliquibus schœnos levis, aliis oxypternos, aliis Solis supercilium, Romanis iucus marinus, aut manualis, Aphris chudua dicitur.*

165. *Aliis adocetos, aliis neuras, aliis phrynion, Romanis bouinalis.*

165. *Aliis chrystitis, aliis chrysanthemon, nonnullis amaranton, aliis diospogon, Aphris dubath, vel burchumath, Romanis Iouis barba appellatur.*

165. *Aliqui chrysspermon vocant, alii duc*

DIOSCORIDIS

spin, alij *origanon*, alij *arcophthalmon*, Romani *arilariam*.

166. Aliqui *chalchitin* vocant, alij *chalcāthon*, alij *chalcanthemon*, Romani *acantham*, Etrusci *garuleum*, Aphri *chursetan*.

166. Alij *trigonion*, alij *bunion*, alij *hierobotan*, alij *philtrodoten*, Aegyptij *pemsempe*, Magi *Innonis lacrymam*, nonnulli *mustela sanguine*, alij *sanguinem Mercurij*, Romani *cristam gallinacea*, alij *pheriam*, alij *trixalidem*, alij *exupera*, aliqui *herbam sanguinalem*.

166. Alij *erigenion*, alij *chamelycon*, alij *sideritin*, quidam *curitin*, alij *persephonion*, alij *Iouis colum*, alij *dichromon*, alij *callesin*, alij *hipparison*, nonnulli *demetriada*, Aegyptij *pemphibenthā*, Pythagoras *eryscisceptron*, Romani *cinnamalem*.

167. Aliqui *chamæsyce*, alij *gatalen*, alij *onycha* vocant, Romani *pinum trinum*, aut *ficum terre*, aliqui *glandulam*, alij *tium*, alij *nonariam*.

167. Aliqui *heloniam*, alij *porphyranthes*, Romani *vaccinium*, alij *ulcinum* vocant.

167. Nonnulli *oxytonon*, Romani *papaneralem*, Aegyptij *nanti*.

167. *Papaver sativum* aliqui *chamæsyce*, alij *papaver rhoeada*, alij *oxytonon* appellant, Romani *papaver*, Aegyptij *nanti*.

169. Aliqui *paralion*, alij *sylvestre papaver*, alij *thalassion*, Romani *fabulum marimum*, Aphri
fissim

sifimacam uocant.

169. Qui hoc papauer hauserit, nō alia accidēt, quā qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semē estate dum siccū est, colligitur. Deco- Etum radicis bibitur cum uino, sanatq; dysenteria.

169. Alij pythionion, aliqui dioscyamon uocant, alij adamantā, alij adamenon, alij hypnoticon, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dithiambriōn, Magi, Pythagoras & Osthānes, xeleo, Zoroāstres ti- phonion, Magi rhapōticā, Romani inanano enta- riam aut apollinarem, Aegyptij saphitho, Hetrusci fabulum, Galli bilinuntiam, Daci dieliam.

170. Aliqui cataphysin, alij cynocephalion, alij chrystalion, alij cynomyam, alij psyllerin, alij sice- lioticon, Sicuti comidyn, Romani herbam pulicarē aut silbacium, Aphri uargugum appellant.

170. Romani strumum uocant, alij cacubalum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismu- nim uocant.

171. Aliqui dircion appellant, alij strychnon ma- nicon, alij dorycnion, alij calliada, Romani apollina- rem minorem, alij ulticanam herbam, aut opfagie- nem, Daci cycolidem, Pœni catabum.

171. Strychnonmanicon, alij anydron, alij penta- dryon, alij enoron, quidam orthogyion uocant.

172. Alij exeranthēs, aliqui antimnion aut anti- mion, alij bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij apemum, Pythagoras anthropomorphon, alij alca-

D I O S C O R I D I S

ten, alij thridaciam, alij cāmaron, Zoroāstres dia-
monon, aut archinen, Magi hemionos, aliqui gono-
geonas, Romani caninum malum, alij terrestre
malum.

173. Alij cyamon leucon, Rom. colomestrun.

174. Conion, aliquibus aginos, alijs ethusa, alijs
apolegusa, alijs dolia, alijs amaurosis, alijs paralys-
psis, nonnullis aphron, quibusdam creidion, alijs vce-
ten, alijs catechomenion, alijs abioton, alijs apseu-
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody-
nos, alijs dardanis, alijs catapsyxis, Ostani babao-
thy, Aegyptijs apēphi, Romanis cicuta appellatur.

174. Aliqui cynanchon appellant, alij pardalian-
ches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij phaleon,
alij cynāchen, alij oligoron, alij hippomanes, alij on-
stin, alij ophioscorodon, alij cynaricam, alij elapho-
scorodon, Magi paralysin, Romani Brassicam rusti-
cam aut caninam.

174. Alij spongon, alij hamostarin, Romani rho-
dodendron, Lucani icmanen, Aegyptij schimphen,
Bœni rhododaphnen dicunt.

175. Aliqui elitim uocant, alij canocerseam, alij
amelxinen, alij enfinem, alij amorginem, alij sucota-
chos, alij psychuacos, alij melampelon, alij citampe-
lon, alij cissamethon, alij anatetamenon, Romani
nolutum laparon, Aegyptij apap, alij parthenion,
alij si deritim, alij heracleam, nonnulli agriam, qui-
dam clibodion, alij polyonymon.

176. Alj myortochon dicunt, alj myortosplenon, Romani muris auriculam: Poeni labatholabat.

176. Agriam phacon aliqui, alj epipteron, Romani iuperalem, alj iceosmigdonon uocant.

176. Aixoon maius, aliqui aithales, alj ambrosion, alj chrysispermon, alj xoopthalmon, alj bubophthalmon, alj stergethron, alj eonion, alj aichryson, alj holochryson, nonnulli chrysanthemon, alj protogonon, alj boron, alj notion: Magi parosnychiam, alj chrystin, Romani ceriam cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alj leapetes, alj sedum maius, Aegyptij pamphanes.

176. Aixoon paruum, alj petrophyes appellant, alj bration, alj theobrotton, crobysson, alj chimerizen, alj cerauniam, Romani uitalem, alj semperuiuum, Aegyptij etyceltam.

176. Semperuiuum quod tenui constat folio, aliqui aixoon paruum, alj petrophyes, alj aixoon syluestre, Romani semperuiuum minus appellant.

177. Aliquibus cymbalion, alijs scytalion, alijs hortus Veneris, alijs terre umbilicus, alijs stœchis, alijs stergethron, Latinis umbilicus Veneris dicitur.

177. Acalyphen aliqui cnidem, alj adicen, Latini urticam, Aegyptij selesion, Dacidyn appellant, Acalyphen etiam alteram aliqui eniphen, Romani urticam mollem uocant.

DIOSCORIDIS

177. Alj̄s galeobdolon, uel galephos, Aegyptj̄s atopi, Latini urtica labeo dicitur.

177. Alj̄s galation, aut gallerion.

178. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio uocatur, aliàs erechthites.

178. Marinum bryon, aliqui ballarin, alj̄ iranē, Latini gnomeusilon uocant.

178. Aliàs stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

178. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nūcupatur, Aegyptj̄s tibis, Magus eluri sanguis.

179. Phlomon, alj̄ phlonon, Latini uerbascum, alj̄ pheminalem uocant.

180. Arcion alj̄ prosopida, alj̄ prosopion, alj̄ a parinen, Latini personatam, aut lappam appellāt.

180. Alj̄s borion appellatur.

180. Capnon, aliqui corydalion, aut corion uocant, alj̄ syluestre corydalion, alj̄ capnon in hordeis, alj̄ capniten, alj̄ marmariten, alj̄ capno gorgion, alj̄ chelidonion micron, alj̄ peristerion, alj̄ cātharida, alj̄ chalcocri, Romani apium aut fumariam, Aegyptj̄ enyx, alj̄ tucin.

180. Alj̄ tripodion, alj̄ tribolion.

180. Aliqui libyon, alj̄ triphyllon.

180. Aliqui telmen, alj̄ lotum magnum, alj̄ triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

181. Alj̄ melophyllō, alj̄ strationicem, alj̄ achil lion, Latini millefolium uocant, aliqui supercilium

ueneris, Galli beliocandas.

181. Alij myrrham, alij conilen uocant.

181. Aliqui buglossum magnum uocant, Romani spinam mollem.

182. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alij asterion, quibusdam hyophthalmion, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.

182. Stellares huius radij noctu splendent, quae propter qui ignari antea non uiderunt, esse inane, simulacrum arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hac de ea refert: Si uiridis cum axungia uetere tundatur contra rabiosorum morsus, turgentia guttura, proderit, suffitu quoq; serpentes fugat:

182. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij ion syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut mura-riam, aut uiolam purpuream uocant.

182. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

182. Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphoron uocant magi faradacry, Aegyptij erxoen, Romani scopam regiam, Aphri xigar, nonnulli thepso.

183. Alio nomine chamaleuce, alio cissos acarpas, aut terra corona, aut selinitis, Latine hedera pluuiatica dicitur.

183. Magi eluri gonon, Osthanez txaunchi, Aegyptij autuenrimbesor, Romani linguam bubus

DIOSCORIDIS

lam, alij libanium, Pœni asanaph uocant.

183. Alij phyton, alij caballation, alij splineion, alij scolymon, Romani linguam canis, aut caninā appellant.

183. Aliqui zoonychon uocant, alij aetonychon, alij cemos, alij damnamenem, alij idiophyton, nonnulli phytobasilā, aliqui crofion, alij crossophthoon, Magi sanguinē crocodili, alij crocomerion, Aegyptij daphnœnen, Romani minerciū, alij palladium, alij neumatum, alij flammulam.

183. Aliqui & id antirrhinon, alij anarrhinon, nonnulli lychnida agriam uocant.

183. Nonnulli lyncida agriam appellant.

184. Catanance aliquibus damnamete, alijs diorysias, alijs thyrsion, alijs demos, alijs cemos, alijs crotion, magis archaras, alijs arcopus, Romanis herba filicula, alijs datisca, Dacis caropithla dicitur.

184. Aliqui psychen, alij merida, alij potamogitona, alij stachylien, Romani calium mare nomināt.

184. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij ebnotrichon, alij argion, alij corion enygron, Aegyptij epier, Romani cincinnalem, alij terre capillum, alij superciliū terre, Daci phithophthethela uocant.

185. Aliqui pterion, alij opteron, Romani capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli & eam adianton appellant.

185. Aliqui phasganon, alij antithesion, alij chascanon, alij choeradoethron, alij & hanc aparis

nam nominant, Latini lappam.

185. Aliquibus sit ospelos, alijs siphon, alijs bro-
mos, Romanis auena dicitur.

185. Aliqui siphonion, alijs acrospelon uocant.

186. Alijs epapitis, alijs lycanthemon, alijs cynos-
baton, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs anatolis-
con, alijs dycicon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe, Ro-
manis mergina, Hetruscis radia appellatur.

186. Alijs hieromyrton, alijs myacantha, alijs
agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangen-
los, alijs anangelos, alijs aceron, alijs ocneron, alijs
cinen, alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamæ-
myrte, Bæotis gyrenia, Magis Herculis genitura ap-
pellatur.

186. Aliqui idean, alijs danaen, alijs hippoglottō,
alijs xaliā, alijs stephanen, alijs daphnon, alijs samo-
thracicen, alijs methrion, alijs hypoglossion uocant.

186. Daphnoides alypo simile, flos ut nymphæe,
cuius medium nucis cypressi non dissimile, in quo se-
mens: aliqui chamædaphnen, alijs peplion, alijs eupe-
rilon uocant.

187. Aliqui & hanc alexandrinam appellarūt,
alijs daphniten, alijs hydragogon, Romani laureolā,
alijs lactaginem, Galli vsu bim.

187. Aliqui ascida uocant, alijs atomon, alijs piga-
roxarin, Magi sanguinem Herculis, alijs polyidos,
alijs anaphyston, Aegyptij somphia, alijs unre, Galli
beginum, aliqui anepsa.

187. Aliqui melanpodion uocant, alij ecetomon,
alij polyrrhizon, alij protion, alij melanorrhizon,
alij cyranion, Magi xomarition, Aegyptij iseam,
alij elaphine, alij cemeleg. Latini ueratrum nigrū,
alij saraca, Daci prodiorna.

188. Aliqui sesamiten, alij sesamin, alij lycocytā
lion, alij helleborum album appellant.

188. Aliqui coronion, alij sesamon syluestre.

188. Aliqui elaterion uocant, alij grynon, alij ba
lin, alij syncrison, alij bubalion, alij scopion, alij phe
rombron, alij peucedanon, alij notion, Romani ances
tum, alij agrestem, Pœni cufimezar.

190. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris tri
ta radix, & drachma unius pondere pota in hydro
melite, uomitus ciet. Si quis facile secundum cœnæ
nomere uelit, binis obolis sit contentus.

190. Alij triphyllon, alij stesion, alij astaphida,
alij phthiroctonon, alij phthirion, alij apāthron,
alij polyides, alij pseudopathes, alij arsenoten, Aegy
ptij ibesaceden, Romani herbā pediculariam uocat.

190. Aliqui hypopyon uocat, alij pancranon, alij
scammonion, alij thelyterim, Romani ferulagine,
alij ferulam syluestrem, Pœni bæden.

191. Aliqui lygon, alij lobon appellant.

192. Aliqui narcisson anydron, alij autogenes,
alij bulbon emeticon, alij lirion, Romani bulbū mor
bitarium dicunt.

192. Alij hippophyes, alij hippophanes, alij hip

pion, alij echinion, alij pelicinon, Romani lappaginem uocant.

193. Aliqui sesamon syluestre uocant, alij seseli cyprion, alij crotona, Aegyptij systhanna, alij tricin, magi sanguine febris. Latini ricinū, alij lupā.

193. Aliquibus cometes, alijs gobios.

195. Aliqui clemas, alij crambion, alij paralion, alij canopicon uocant.

195. Aliqui sycen, alij mecona aphroden.

196. Alij spumosum papauer uocant.

196. Aliquibus scambonia radix, alijs colophonias, alijs daetylion, Romanis colophonium, Magis apopleumonos, Aegyptijs sanilum dicitur.

196. Alij chamelea nigra, alij pyros achnen, alij heraclion, alij bdelyram, alij coccon gnidion, Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam oleastellum uocant.

197. Alij chameleam, alij pyros achnen, alij cestron, aut eneoron uocant.

197. Aften alij dendron arctus, alij hemeron, Latini sambucū, Galli scobiem, Daci sebā uocant.

197. Alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Euboica, Gallis ducone, Dacis olma.

198. Nonnulli ischiada, alij chamebalanum agriam, alij linoxostin, Latini radicem syluestrem, Pæni thorphathsadæ appellant.

198. Aliquibus colocyntha egos, alijs sicya piera, alijs alexandrina colocyntha, Zoroastri thym

DIOSCORIDIS

bra, Osthani autogenes, Romani cucurbita syluati
ca, Dacis tutrastra dicitur.

199. Alij cedæes, Romani inuolucrum uocant.

199. Alij ophiostaphylon, alij chelidonium, aut
melothron, aut psylthron, aut archezostin, aut
agrostin, aut cedrostin appellant.

200. Alij chironion ampelon, alij bucranion, Ro
mani oblameniam, alij batanutam, alij betisalcæ,
Daci priadelam, alij pegrinam, Aphri lauother.

200 Pterin alij pterion, alij pterineon, alij dasy
clonon, alij anasphoron, alij blechnon, alij polyrri
xon uocant, Magi hermubain, Romani filicem, alij
laculæ, alij filisfanariæ, Aegyptij asini sanguinem.

200. Thelypterin aliqui nymphaam pterin no
minant, Romani linguam ceruinam.

201. Polypodion aliqui scolopendrion, alij pter
in, alij polyrribizon, Latini filiculam uocant.

201. Aliqui pterion, alij nymphaam pterin no
minant.

201. Alij Argyron, alij aritrillin, alij chrystin,
Aegyptij aplhopho, Latini mercarialem masculæ,
alij tessiculatam, Aphri asumes.

202. Aliquibus linoxostis, Aphris armas, alijs
asumes labon dicitur.

202. Aliqui scorpiuron uocant, alij heliotropon,
alij dialion, alij heliopon, alij scorpioctonon, alij se
samon agrion, alij scorpij uram.

202. Aliqui scorpiuron uocant.

205. Idem adstringit: prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Itē ijs qui ilei dolore conflictantur: conuenit in grauidarū malacia: sorptum auxiliari constat, cū populatim grassatur pestifera lues. Huiusmodi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

217. Quam alij Medicinā, alij symphyton, alij ideūm phlomon, alij orestion, alij nectarion uocāt.

226. Alj larbason, alj gynacion, alj Chalcodonion.

231. Alj pecton, hepthon, aracton, lonchoton.

255. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat si lente luna, & secum ferat, cōtra uenena & improbos homines proderit: pecoribus iuuandis appenditur: nauigijs circūponi solet: ualet contra capitis dolores & laruas.

De Artemisia.

Artemissam herbam si quis teneat, diu iter facit, lassitudinem discutiet. & si in pedibus ferat, heftias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, & lo-cum totum oblinto, cum somno indulgendum est: strangulatui uulue mirum in modum auxiliatur: urine stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylum si quis circū corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strygas, callosos tonsillarū

DIOSCORIDIS

tumores, tuam, articulos sub lingua, nervorum dolores & dentes, pſoram pernicali fame contractū iuuat: remoratos à partu menses eūcit: infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam. cūm luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorum auxilium tur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De dictamno.

Dictamnū siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla, corpus tangito: siquidem contra omnes serpentium iniurias auxilium tur: vlcera & putrescentes nomas prępurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, ut pręsentis sit auxilio: ad lienem & in abditis locis uitia inflammatione turgentia, redactū in farinam illinito. Herbam uere, magnis aestibus, autumnōq; eruit o.

De Saluia.

Salvia singultū tuſsimq; discutit: omnibus maris ulceribus cum cera & rosaceo sumpta auxilium tur: lienis dolorem dysenteriamq; pota cum uino albo pari modo sanat: sanguinem excreantibus, potio

NOTHA.

medetur : ad extrahenda uulue onera efficax est : pessime mulieres pessum ex ea subiiciunt, ut partus excutiant.

De Cupresso.

Cupressus herba contra raucedines auriculasq; prodest: induratos tonsillarum tumores, aquam inter cutem, & coxendicum cruciatus per sanat.

De Centaurio.

Centaureum contra inflammata uitia & pulsantes ictus ualet foemina uulue malo laborantibus auxiliatur: Stillicidij urinae, calculorumq; tormenta leuat. Herbam uere oriente sole legito.

De Buphthalgo.

Buphthalmum crescente luna legere oportet. Facit autem contra pauores, laruas, & mala medicamenta, fascinationes, utpote cum eas auertat. Radicem si quis mandat, dentem expuet, fluxionemq; confestim sistens auxiliatur: quin & uentre resoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æstus Caniculæ ante Solis ortum uellitur: appensaq; contra uenena, fascinū, pauores & laruas prodest: item contra febrem cum horrore uenientem, diurnam nocturnamue, & aduersus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, ueneficiorum & fascinationis amuletum est.

D I O S C O R I D I S

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-
to, & faciem illinito cum ad negotia te conferes:
uegetiores reddit pueros, imo uentri appensa & ad
arcendos pauores nocturnos manuteneo. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantur recedunt, arescentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit,

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortum erua-
tur, & collo appedatur, ueneficas mulieres omnesq;
fascinantes amolitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum uino tritum, aduersus uentris do-
lorem bibitur: si quis grana septem domum iniece-
rit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boïon dici-
tur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bi-
bitur contra omne uenenum, & iocineris uitia.

F I N I S.

INDEX OMNIUM

QVAE IN DIOSCORIDE

CONTINENTVR.

A Brotonon	117	Adianton	184
A Absynthium	116	Aegilops	185
Absynthii marinū	116	Aeris squamma	222
Absynthii Sātoniciū	117	Aeris flos	222
Acacalis	40	Aerugo rasa	223
Acacia	43	Aerugo scolecia	224
Acacia altera	43	Aes ustum	222
Acanthus	114	Aethiopis	179
Acanthum	113	Aetites lapis	241
Acāthus syluestris	114	Agallochon	15
Acetum	209	Agaricum	108
Acetū e betonica	215	Ageraton	166
Acetum mulsum	209	Agnus	45
Acetū scillinum	210	Aluaga	152
Acetū e stoechade	215	Alabastrites	242
Achillea	162	Alcea	151
Achras	52	Alcibiadion	160
Acida muria	210	Alcyonium	239
Acinos	122	Alisma	132
Acorum	6	Allium	95
Aconitum	173	Aloe	115
Adarces	239	Alfine	176
Adeps omnis	70	Althea	151

I N D E X.

Alumen	234	Anisum	127
Alumen scissile	ibide	Anonis	114
Alus	157	Anthemis	148
Alysson	138	Anthericum	101
Alypon	199	Antyllis	148
Amaracum	121	Antipathes	240
Amaranton	186	Antirrhinon	184
Ambrosia	143	Antispoda	222
Amiantus lapis	241	Aparine	138
Ammi	128	Aphaca	94
Ammoniacon	137	Apiastrum	140
Amomis	12	Apios	198
Amomum	12	Apium	129
Ampelitis terra	245	Apocynon	174
Ampeloprason	54	Apollinaris	169
Amphisbena ictus nota		Apri iecur	63
267. eius curatio	268	Apum ictus curatio	271
Amurca	46	Aqua	208
Amygdale amare	53	Aqua frigida	259
Amylum	81	Aqua marina	208
Anagallis	105	Aqua mulsa	208
Anagyris	152	Arabicus lapis	242
Anchusa	160	Araneus	65
Androsaces	147	Arbutus	53
Androsamon	153	Arcion	180
Anemone	104	Arction	179
Anethum	127	Arcturon	ibidem
Anguinium senectus	60	Arena	244

Argemone

I N D E X.

Argemone	105	Astragalus	167
Argēti recrementū	227	Athamanticum	6
Argenti scoria	ibidem	Athera	80
Argenti spuma	ibid. &	Atractylis	138
257		Atramentum librarium	
Argentum uiuum	230.	246	
& 257		Atramentū sutoriū	231
Arisarum	101	Atriplex	87
Aristolochia	110	Auellana nux	54
Armeniaca mala	51	Auena	80
Armenius lapis	229	Auricula muris	107
Armoracia	86	Auri pigmentum, siue ar	
Aron	101	senicon	234
Arrhenogonon	145	B acca lauri	38
Arthemisia	143	Baccharis	122
Arundo: vide Harundo		Balaustium	49
Asarum	9	Ballote	140
Asclepias	138	Balsamum	13
Ascyron	153	Barbula hirci	94
Asininum iecur	63	Basilisci ictus nota	269
Asini ungula	62	eius curatio	273
Asius lapis	240	Bdellium	30
Aspalathus	14	Beta	88
Asparagus	89	Betonica	154
Asplenon	142	Bitumen	35. & 36
Aspidis ictus nota	269	Blata pistrinaria	62
eius curatio	273	Blitan	86
Aster Atticus	182	Botrys	143

INDEX

Brassica	87	Cancamum	15
Brassica marina	88	Cancer	59
Brassica sylvestris	87	Canis rubus	41
Britanica	155	Canis rabidi iecur	63
Bromus	185	Canis rabiosi signa	264
Bryon	15	curatio morsus eius	
Bryonia	199	255. ab eo morforum	
Buccina	57	uictus ratio.	256
Buglossum	183	Cannabis	151
Bulbus esculentus	102	Cantharides	65
Bulbus uomitorius	102	Capnos	180
Bunion	182	Capparis	103
Buprestis 65. &	252	Capra ungula	62
Buphthalmos	149	Caprinum iecur	ibidem
Butyrum	68	Cardamomum	7
Butyri fuligo	ibide	Cardamina	90
C Acalia	182	Carduus	113
Canchrys	132	Carpasi succus	154
Cadmia	219	Cariote	48
Cecilie ictus note	167	Carum	127
curatio eadem que ui-		Caseus	67
pere morsus.		Cassia	10
Calamus odoratus	13	Castanea	47
Calamintha	120	Castorium	60
Calcifraga	199	Catanance	184
Caltha	257	Caucalis	93
Calx	230	Cedria	37
Calx uina	238	Cedrides	38

INDEX

Cedromela	51	Chamaesyce	183
Cedrus	37	Chamelea	197
Celticum nardum	8	Characias tirhymalus	193
Cenchri ictus nota	268	Chelidonium	106
eius remedia	273	Chelidonium minus	106
Centaurium magnum		Chia terra	245
110		Chondrylla	92
Centaurium minus	111	Chrysanthemon	166.
Cepa	95	& 229	
Cepaea	152	Chrysocolla	229
Cera	78	Chrysocome	165
Cerasia	50	Chrysogonon	ibidem
Cerasta ictus nota	260	Cicade	64
eius curatio	273	Cicer sativum	82
Cervi genitale	62	Cicer arietinum	ibidem
Cervinum cornu	64	Cicer sylvestre	82
Cerussa	228. & 256	Cichorion	91
Cestron	154	Cici	193
Chalcitis	232	Cicuta	174. & 154
Chama	58	Cimices	62
Chamaecta	197	Cimolia	245
Chamaecissos	183	Cinis sarmentitius	238
Chamaelaphne	187	Cinnabaris	230
Chamaedrys	139	Cinnamomum	11
Chamaeleo albus	111	Cionia	57
Chamaeleo niger	112	Circea	144
Chamaeleuce	183	Cirsium	181
Chamaepitys	152		

I N D E X.

<i>Cistus</i>	41	<i>Cornus</i>	52
<i>Citria mala</i>	51	<i>Corruda</i>	89
<i>Clematis</i>	156	<i>Cos Naxia</i>	244
<i>Clinopodium</i>	139	<i>Costus</i>	112
<i>Clymenon</i>	157	<i>Cotonea mala</i>	51
<i>Cnicus</i>	201	<i>Cotyledon</i>	177
<i>Coagulum</i>	69	<i>Cratægonon</i>	145
<i>Coccum gnidion</i>	197	<i>Crimnon</i>	80
<i>Coccum infectoriū</i>	164	<i>Crithmum seu critha</i>	
<i>Cochleæ</i>	58	<i>mon</i>	90
<i>Cæruleus</i>	230	<i>Crocodilion</i>	112
<i>Colchicon</i>	175	<i>Crocomagna</i>	16
<i>Colligendorū ratio</i>	4	<i>Crocum</i>	ibidem
<i>Colocasia</i>	83	<i>Croton</i>	193
<i>Colocynthis</i>	198	<i>Cueurbita</i>	92
<i>Colymbades</i>	45	<i>Cucumis sativus</i>	92
<i>Communis curatio in o-</i>		<i>Cucumis sylvestris</i>	188
<i>mnes ictus virulentos</i>		<i>Cuminum sativū</i>	127
269.		<i>Cuminum sylvestre ibi-</i>	
<i>Conyza</i>	144	<i>dem</i>	
<i>Corallium</i>	240	<i>Cumila</i>	118
<i>Coriandrū</i> 128. & 253		<i>Cupressus</i>	36
<i>Coria veteramentaria</i>		<i>Curmi</i>	79
63		<i>Cyclaminus</i>	99
<i>Coriarius frutex</i>	48	<i>Cyclaminus altera</i>	100
<i>Coris</i>	152	<i>Cydonomeli</i>	212
<i>Coronopus</i>	90	<i>Cynia</i>	202
<i>Cornu cerui</i>	64	<i>Cynocrambe</i>	ibidem

I N D E X:

Cynoglosson	183	Dracunculus	108
Cynosorchis	146	Dryini ictus nota	268
Cyparissias tithymalus		eius curatio	273
194		Dryopteris	201
Cyphi	15	Dulcis radix	110
Cypirus	7	E Benus	42
Cytinus	49	E Ebulum	197
Cytisus	180	Ebur	64
D Amascena pruna		Echinus	57
55		Echion	160
Damasonion	132	Elaphoboscum	130
Daphnoides	186	Elaterion	183
Daucus	131	Elatine	162
Delphinium	ibidem	Electrum	39
Dendroides tithymalus		Eleliphacos	119
194		Eleomeli	18
Deuteria	206	Eleoselinum	129
Dictamnium	119	Elichryson	166
Dictamnium Cretense	119	Empetron	199
Diphryges	233	Ephemerum 175. et	252
Dipsacum	112	Epimedium	159
Dipsadis morsus nota		Epimelis	52
268. eius curatio	273	Epipactis	180
Dorycnion	171. & 253	Epirotica mala	51
Draba	97	Epithymum	199
Draco marinus	59	Equisetum	164
Draconis marini ictus		Equorum lichenes	63
remedia	271	Eretria terra	244

INDEX

Erica	40	Flos aris	211
Erinaceus	57	Flos salis	237
Erinei	56	Flos punicea	49
Erinus	161	Flos sylvestris punici ibi	
Eruca	93	dem	
Eruce olerum	65	Fœniculum	130
Eruce pinorū 65. et	251	Fœniculum erraticum	
Eruum	84	ibidem	
Eryngium	115	Fœnum græcum	81
Erysimon	97	Fraxinus	38
Erythrodanon	150	Fuligo è myrrha, resina,	
Eupatorium	163	styrace	32
Euphorbium	135	Fuligo liquida picis	35
F Aba	82	Fuligo pictoria	245
Faba Aegyptia	83	Fuligo thuris	32
Fax	238	Fumaria	180
Fagus	47	Fungi	175. & 256
Farina crassior	80	G Agates lais	242
Fel	74	Galactites lapis	
Ferri rubigo	225	242	
Ferula	133	Galaxias	ibidem
Festuca	185	Galbanum	136
Fibrini testes	60	Galerita	64
Ficus	55	Galion	177
Filicula	201	Galiopsis	ibidem
Filix	200	Galla	47
Filix femina	ibidem	Gallina	63
Fimum	75	Gallinae cerebellum ibid.	

I N D E X

Garum	62	Gummi amygdale	53
Genitale cerui	62	Gummi cerasi	50
Gentiana	109	Gypsum	238 & 256
Geranion	144	H Aematites	241
Geodes lapis	244	H Hemorrhoi ictus	
Gingiberis	98	nota	268. eius curatio
Gingidion	93		273
Gith	134	Halica	80
Gladiolus	159	Haliacacabō solanū	171
Glans	47	Halimus	49
Glans Iouis	47	Harundo	39
Glans Sardiniana	ibidem	Harundo Cypria	ibidem
Glans unguentaria	192	Harūdo uallatoria	ibid.
Glaſtum fatium	107	Hastula regia	101
Glaſtum ſylueſtre	107	Hedera	105
Glaucium	137	Hedysaron	147
Glaux	185	Helcysma	227
Gluten piſcium	137	Helcnium	16
Glutinum	ibidem	Helenium alterum	16
Glycyſide	149	Heliſcopius	194
Gnaphalion	144	Heliotropium magnum	
Gnidium granum	107		202
Gobius	61	Heliotropium paruum	
Gramen	161	ibidem	
Gramen arundinaceum		Helleborum album	187
ibidem		Helleborum nigrum	187
Gramē Parnafi	ibidem	Helxine	162. & 175
Groſſi	56	Hemerocallis	145

I N D E X.

Hemionitis	148	Hypocistis	41
Herba sabina	37	Hyssopum	117
Hieracium magnū	128	I Aspis	243
Hieracium paruum ibi-		I Iberis	56
dem		Ibiscum	151
Hippace	68	Ichthyocolla	137
Hippocampus	57	Idea radix	164
Hippoglosson	183	Iecur apri	63
Hippolapathon	86	Iecur asininum	ibidem
Hippomarathon	130	Iecur canis rabidi	ibid.
Hippophaes	192	Iecur caprinum	ibidem
Hippophaeston	193	Iecur mergi	ibidem
Hippopotami testes	60	Illecebra	176
Hipposelinon	129	Ilex	47
Hirci barbula	94	Indicum	230
Hirculus	8	Inguinalis	182
Hirundines	64	Intybus	91
Hirudo	255	Iouis glans	47
Holostium	157	Irio	97
Hordeum	79	Iris	5
Horminum	146	Isopyron	182
Hyacinthus	167	Iudaicus lapis	243
Hydromeli	212	Iuglandes nuces	53
Hydromelon	212	Iuncus	165
Hydropiper	99	Iuncus odoratus	13
Hyoscyamus 169. et	254	Iuniperus	36
Hypecoon.	169	Ius piscium	62
Hypericon	152	Ixia	256

I N D E X

L Abriū Veneris	112	Lens palustris	176
Labrusca	203	Lentiscus	33
Lac	66	Lentiscina resina	34
Lac coagulatum	257	Leontopetalon	139
Lac humanum	67	Leontopodion	183
Lac schiston	67	Lepidium	104
Lactis serum	ibid.	Leptocarya	54
Lacerta	66	Lepus marinus	60. et 58
Lactuca sativa	92	Lepus terrestris	60
Lactuca sylvestris	ibid.	Leucacantha	114
Ladanum	42	Leucanthemon	148
Lagopus	158	Leucas	139
Lampsana	86	Leucoion	145
Lana	68	Lichenes equorum	63
Lana cremata	ibidem	Lichen	165
Lanaria herba	99	Lignorum marcor	39
Lappa	185	Ligusticum	125
Lapathum	86	Ligustrum	41
Laser	134	Lilium	140
Laserpitium	ibidem	Lilium sylvestre	145
Lathyris	195	Limonion	158
Lauer	90	Lingua bubula	183
Laurus	38	Linoxostis	201
Laurus Alexandri =		Linum	82
na	186	Lithocolla	243
Lauri bacca	38	Lithospermon	150
Lemnia terra	231	Locuste	64
Lens	82	Lolium	81

I N D E X

Donchitis	150	Malum præcox	ibid.
Lora	409	Malum punicum	49
Lotus arbor	52	Malum sylvestre	ibid.
Lotus Aegyptia	181	Mādragoras	171 et 254
Lotus sylvestris	180	Manna thuris	31
Lotus urbana	ibidem	Marcor lignorum	39
Lupinus	84	Maron	122
Lychnis coronaria	140	Marrubium	141
Lychnis sylvestris	ibid.	Marrubium nigrū	140
Lycium	43	Mastiche	33
Lycopsis	160	Meconium	255
Lygos	45	Medica	94
Lysimachia	155	Medica mala	51
M Acer	39	Medion	159
Mene	61	Medulla	73
Magnes	242	Mel	77
Magudaris	185	Mel heraclion	253
Malabathrum	10	Melampsythium	232
Malicorium	49	Melanteria	232
Malua	86	Melanthium	134
Malum	51	Melia terra	245
Malū Armeniacum	51	Melilotos	122
Malum cotoneum	51	Melimela	81
Malum dulce	51	Melissophyllon	140
Malum Epiroticū	ibid.	Melitites lapis	242
Malum Medicū	ibid.	Melomeli	212
Malū orbiculatū	ibid.	Memphites	243
Malum Persicum	ibid.	Mentha	120

INDEX

Menthastrum	ibidem	Myagron	181
Meon	6	Myosotis	207
Mercurialis	201	Myrica	40
Mergi iecur	63	Myrrha	28
Mespilus	52	Myrrha Bæotica	29
Metopion unguentū	27	Myrrhis	181
Milium	80	Myrtidanum	50
Millefolium	181	Myrtussatina	50
Millepede	62	Myrtus sylvestris	186
Misy	232	N	Aphtha 36
Mituli	58		Napus 65
Moly	124	Narcaphthon	15
Molybdæna	226	Narcissus	192
Molybdoides lapis	227	Nardi genera	7
Morochthus	242	Nardum Celticum	8
Morus	54	Nardum montanum	9
Mullus	60	Nardinū unguentū	28
Mulsum	208	Nasturtium	97
Muralis herba	175	Natricis ictus nota	268
Muria	237	eius curatio	273
Mures	66	Nepeta	120
Muris auricula	207	Nerion	174
Mus araneus	66	Nitrum	237
Muris aranei ictus nota	268	Nitri spuma	237
eius curatio	264	Nux auellana	54
Muscus	15	Nux iuglans	53
Muscus marinus	178	Nux pinea	32
Mustela	61	Nymphaea	147

INDEX

O Chra	230	Oleum sinapium	19
Ocymastrum	160	Oleum styracinum	30
Ocymum	93	Oleum terebinthinũ	20
Oenanthe	144. & 204	Olinæ colymbades	45
Oesypum	69	Oloschænos	165
Olea sylvestris	45	Olusatrum	129
Oleaster	ibidem	Omphacium	204
Oleæ æthiopice lacry-		Omphacomelites	212
ma	46	Onagra	181
Olei uires	17	Onitis	118
Oleum amygdalinũ	19	Onobrychis	152
Oleum balaninum	19	Ononis	114
Oleum cicinum	18	Onosma	147
Oleum enicinum	19	Onyx	58. et 242
Oleũ è gnidio grano ibi.		Ophioscorodon	96
Oleum hyoscyaminũ	19	Ophites lapis	243
Oleum laurinum	20	Opium	168
Oleum lentiscinum	20	Opobalsamum	13
Oleum mastichinũ ibid.		Opopanax	24
Oleum melanthinũ	19	Orbiculata mala	51
Oleum melinum	52	Oreoselinon	129
Oleum myrteum	20	Origanum	118
Oleum oliuæ sylvestris		Origanũ sylvestre ibid.	
17. & 45		Ornithogalum	94
Oleum omphacinũ	17	Orobanche	93
Oleum picinum	35	Oryza	80
Oleum raphanium	19	Ossifragus	64
Oleum Sicyoninum	18	Ostracites	244

N D E X

Osfyris	185	Parthenium	149
Othonna	106	Passum	205
Onorum natura	63	Pastinaca herba	126
Oui candidum	ibidem	Pastinaca marina	60
Oxalme	210	Pastinacæ marina ictus	
Oxylapathum	86	notæ 268 eius cura =	
Oxymyrsine	168	tio 272	
P Aederota	114	Pedicularia	190
Pœnia	149	Pelecinon	147
Paliurus	40	Peplis	195
Palma	48	Peplos	ibidem
Palma elate	49	Pepo	92
Palma Thebaica	48	Periclymenon	158
Panaces Asclepū	125	Peristereon	166
Panaces Chironiū	ibid.	Persea	56
Panaces Heracium	125	Persica mala	51
Pancration	103	Personata	180
Panicum	80	Petastites	ibidem
Papauer corniculatum		Petroselinum	129
169. & 255		Peucedanon	133
Papauer erraticum	167	Phalangium	141
Papauer satinum	ibid.	Phalangū morsus no =	
Papauer spumeum	169	tæ 267 eius cura =	
Pappi	255	tio	271
Papyrus	39	Phalaris	150
Paralios	194	Pharicon	255
Pardalianches	173	Phasiolus	84
Paronychia	165	Phœnicobalanus	48

I N D E X

Phcenix	163	Polion	142
Phrygius lapis	240	Polycnemon	139
Phu	9	Polygala	185
Phycus marinus	178	Polygonaton	156
Phyllitis	141	Polygonon	155
Phyllon	145	Polypodion	201
Phyteuma	183	Pompholyx	220
Picea	32	Populus alba	38
Picis liquide fuligo	35	Populus nigra	ibidem
Pineæ nuces	32	Porrum capitatum	94
Pinorū eruce 65. et	251	Portulaca	88
Pinus	32	Potamogeton	178
Piper	98	Poterion	113
Piscium ius	62	Propolis	78
Pissasphaltos	36	Prunus, pruna	82
Pisselaon	35	Pseudobunion	182
Pistacia	53	Pseudocasia	10
Pityusa	195	Pseudocinnamomū	12
Pix liquida	35	Pseudodictamnium	119
Pix sicca	35	Psoricon	232
Plantago	89	Psychotrophon	154
Platanus	38	Psyllion 170. &	253
Plumbago	226	Ptarmica	99
Plumbum elotum	225	Palegium	118
Plumbum ustum	ibid.	Pulegiū sylvestre	119
Plumbi recrementū	226	Pulicaria	170
Puigitis terra	245	Pulticula	80
Polemonia	156	Pulmones animalū	62

I N D E X

Pamex	235	Rheon	ibidem
Purpura	57	Rhodia radix	164
Pygnoconon	198	Rhododendron	174
Pyrafter	52	Rhus	48
Pyrethrum	131	Ricinus	193
Pyrites	241	Rofa	43
Pyrorum genera	52	Rofei pastilli	ibidem
Q Vercus	47	Rofmarinus	131
Quiquesoliū	163	Rofmarinum corena =	
R Adicula	99	rium	132
Radix	85	Rubeta	258
Radix dulcis	110	Rubia	150
Radix fylueftris	86	Rubigo ferri	225
Rana	61	Rubrica fabrilis	231
Rana paluftris	258	Rubrica Sinopica	ibid.
Ranunculum	104	Rubus	162
Rapum	85	Rubus canis	41
Recondendorū ratio	5	Rubus Ideus	162
Recrementū argēti	227	Rumex	86
Refine uarie	34	Rufcum	186
Refina lentifcina	34	Ruta	122
Refina liquida ē pinu et		Ruta fylueftris	123
picea	34	S Abina herba	37
Rha	109	Saccharum	77
Rhamnus	40	Sacra herba	166
Rhaphanus	85	Sagapenum	135
Rhaphan ^o fylueftris	86	Sal	236
Rhaponticum	109	Salis flos	437

I N D E X

Salis spuma	437	Scammonia	196
Salamadra 65 &	252	Scandix	93
Salinaris	131	Schistum lac	67
Salunca	8	Schistos lapis	242
Salix	48	Scilla	192
Salvia	119	Scincus	66
Sambucus	197	Scolopendra	59
Samia terra	244	Scolopendre ictus note	
Saminus lapis	ibidem	267. eius curatio	271
Sampsuchum	121	Scolymos	113
Sandaracha 234 &		Scordion	142
257		Scorodoprasum	96
Sandyx	234	Scoria plumbi	226
Sanguinaria	155	Scorpioides	202
Sanguinaria foemi-		Scorpius marinus	59
na	156	Scorpius terrestris	ibid.
Sanguis	74	Scorpij ictus note	267
Sanguis tauri	257	eius curatio	271
Sapa	265	Securidaca	147
Saphirus	243	Sedum magnum	176
Sarcocolla	137	Selenites lapis	243
Sardiana glandes	47	Selinusia terra	245
Sardonio	254	Semen	80
Sarmentitius cinis	238	Semperuium	176
Satureia	121	Semperuium minus	176
Satyrion	146	Senecta anguium	60
Satyrion erythronion		Senecio	178
ibidem		Sepia	60

I N D E X

Seps	66	154	
Seris	91	Smilax aspera	185
Serpyllum	121	Smilax levis	186
Sertula campana	122	Smyris lapis	244
Serum lactis	67	Smyrnion	129
Sesama	81	Solanum hortense	170
Sesamoides	188	Solanum manicum	171
Seseli	126	Solanum somniferum	ibid.
Seseli Aethiopicum	126	Sonchus	91
Seseli Greticum	ibid.	Sorba	52
Seseli Peloponnese	ibid.	Sory	233
Setanium	32	Sparganium	159
Sicyonium oleum	18	Spartion	191
Sideritis	161	Spatha	48
Sidion	49	Sphondylion	132
Siligo	80	Sphragis egos	231
Siliqua	51	Spina acuta	41
Silphium	134	Spina alba	113
Silurus	61	Spina Arabica	ibid.
Silybum	192	Spongie	239
Sinapi	96	Spongiarum lapides	243
Sion	90	Spuma nitri	237
Sifer	86	Spuma salis	236
Sison	126	Spuma argenti	227
Sisymbrium utrumque	90	& 257.	
Sitania	79	Squamma eris	213
Smarides pisces	61	Squamma exacie de-	
Smilax	94. & 185. &	cussa	213

I N D E X

Stachys	141	Terebinthus	33
Stacte	27	Terebinthina	ibidem
Staphis agria	190	Terra	244
Stercus ferri	225	Terra fornacum	245
Stibium	227	Teste	245
Stimmi	ibidem	Testiculus canis	140
Stoebe	157	Teucrion, Teucris	139
Stoechas	117	Thalassomeli	209
Stomoma	223	Thalictron	178
Stratiotes	178	Thapsia	190
Stratiotes millefolium		Thelygonon	146
ibidem		Thlasspi	97
Strigmēta balnearū	18	Thracias lapis	242
Struthia cotonea	51	Thunnus	62
Struthion	99	Thus	30
Styrax	29	Thuris cortex	31
Succinum	39	Thuris fuligo	32
Suillus pulmo	62	Thuris manna	31
Suillus talus	64	Thyites lapis	242
Sulphur	235	Thymelea	197
Sycomorus	54	Thymoxalme	210
Symphyton	157	Thymus	120
T Alus suis	64	Tilia	41
Tamarix	40	Tichymali	193
Taxus	174. & 254	Tordylion	126
Tauri sanguis	257	Torpedo piscis	59
Telephon	107	Toxicon	255
Tellina	58	Tragacantha	114

I N D E X

Tragium	164	Vimen	45
Tragoriganum	118	Vina marina	211
Tragos 80. &	164	Vina picata	214
Tribulus	158	Vina resinata	214
Trichomanes	185	Vini natura	205
Trifolium	141	Vinum abiegnum	214
Trimestria	228	Vinum abrotonites	216
Triphyllon	141	Vinū absynthites	215
Tripolion	184	Vinum acorites	217
Trissago	139	Vinum adynamon	207
Triticum	75	Vinum anethinum	218
Tuber	94	Vinum apiites	212
Tussilago	143	Vinum aromatites	216
Typha	144	Vinum asarites	217
V Enenata	259	Vinum bunites	216
Veneris umbili-		Vinū calaminthites	216
cus	177	Vinū catorchites	213
Veratrum album	187	Vinum cedrinum	214
Veratrum nigrum	187	Vinum cedrites	214
Verbascum	179	Vinum cestrites	214
Verbenaca	166	Vinū chamædryites	215
Vermes terreni	66	Vinū è chamelea	218
Vesparum ictus cura =		Vinū chamapityinū ibi-	
tio	271	Vinum è coniza	216
Vesicaria	171	Vinum cupressinū	214
Vetonica	154	Vinū cydonites	211
Victus ratio in morfu		Vinum daucites	217
rabiosi canis	266	Vinū dictamnites	216

I N D E X

Vinum è flore salis	218	Vinum pineum	214
Vinum helleborites	218	Vinum è pipere	217
Vinum hyssopites	215	Vinum è pulegio	216
Vinum ex iride	217	Vinum resinaturn	214
Vinum iuniperinũ	214	Vinum rhodites	212
Vinum laurinum	ibid.	Vinum rhoetes	ibid.
Vinum lentiscinũ	213	Vinum saluiatum	217
Vinum mandragorites		Vinum è satureia	216
218		Vinũ scammonites	219
Vinũ marathrites	218	Vinum scillinum	211
Vinum è marrubio	216	Vinum selinites	218
Vinum melites	211	Vinũ Stœchadites	215
Vinum melities	207	Vinum Strobilites	214
Vinum melomeli	217	Vinum è sycomorìs	213
Vinum è myrrha	217	Vinũ è Syriaca nardo,	
Vinum myrsinites	213	celtica, malabathro	
Vinum myrtites	212	217	
Vinum à nardo sylue-		Vinũ terebinthinũ	213
stri	217	Vinum thymites	216
Vinum nectarites	217	Vinũ è thymelea	217
Vinum œnanthinũ	212	Vinum tragoriganites	
Vinum omphacites	207	216	
Vinum palmeum	213	Viola alba	145
Vinum organites	216	Viola purpurea	182
Vinum panacites	217	Viperæ ictus notæ	267
Vinum phthorion	218	eius curatio.	272
Vinum è petroselino ibi.		Viperinæ carnes	59
Vinum picatum	214	Viscum	137

I N D E X

Vitis alba	199	Vng.nardinum	28
Vitis nigra	200	Vng.ocyminum	23
Vitis sylueſtris	199	Vng.cenanthinum	22
Vitis uiniſera	203	Vng.onychinum	25
Vitex	45	Vng.roſaceum	21
Vlmus	39	Vng.sampſuchinũ	22
Vmbilicus Veneris	177	Vng.Styracinum	25
Vnedo	53	Vng.suſinum	23
Vnguentorũ ratio	20	Vng.telinum	22
Vng.abrotoninum	23	Vngula aſini	62
Vng.amaracinum	26	Vngula capræ	ibid.
Vng.anethinum	23	Vnguis odoratus	58
Vng.butyrinum	25	Vrina	76
Vng.cinnamominũ	27	Vrtica	177
Vng.crocinum	24	Vſtio contra uenena =	
Vnguentũ cyprinũ	25	tos iclus	265
Vng.elatinum	21	Vua	203
Vng.gleucinum	26	Vua paſſa	204
Vng.hedychroon	27	Vulpinus pulmo	62
Vng.iſſaminum	28	X Anthion	185
Vng.irinum	25	X Xyphion	159
Vng.lilinum	23	Xylobaſſamon	13
Vng.malabathrinũ	28	Xylocinnamomum	11
Vng.megalinum	27	Xyris	159
Vng.melinum	22	Z Ea ſeu ſemen	80
Vng.mendeſium	27	Z Zopiſſa	35
Vng.metopion	27	Zythum.	79
Vng.narciſſinum	24	FINIS.	

INDEX NOMEN- CLATIONVM, QVIBVS OF- ficinae Seplastiariorum, & Herbarij nostri temporis utuntur.

A Cacia	43	Buglossa	181
Agnus castus	45	C Alamentum	120
Agrimonia	163	Camomilla	148
Alcanna	41	Capillus Veneris	184
Alkekengi	170	Caprifolium	158
Aloe	15	Cartamus	201
Apium	129	Cataputia maior	193
Apium risus	144	Cataputia minor	195
Aphrodilos	101	Cauda equina	104
Arabis	97	Centinodia	155
Artichault	113	Cerefolium	93
Aspergula	138	Ceterach	147
B Alsamita	90	Cheiri	145
Bardana	180	Coloquintida	198
Basilicon	93	Consolida maior	157
Berberis	41	Cornu cerui	90
Berula	90	Crassula maior	107
Bismalua	151	Cucumer asininus	188
Borago	183	D Ragagan =	
Branca ursina	114	tum	114
Bruscus	186	E Nula campana	16
Bryonia	199	Eupatorium vulga	

I N D E X

tum	151	M Aluaniscus	151
F Aba inuersa	107	M Malūgranatū	49
F Filipendula	144	M Mastix	33
F Flammula	156	M Matricaria	149
F Fumus terre	180	M Matrisylua	158
G Allitrichum	146	M Melissa	140
G Genista	191	M Mexereon	197
H Edera terre	183	M Miliū solis	150
H stris	183	M Millefolium	178
H epatica	165	M Morsus gallinae	176
H erba Iudaica	161	N Asturtium a =	
H erba Simeonis	151	N quaticum	90
H erba tetrahil	161	N enuphar	147
H ermodactylus	175	O Robus	
I Arus	101	O 84	
I lringus	115	P Apauer cornu =	
I ua arthritica	152	P tum	255
I usquiamus	169	P apauer rubrum	167
L Acca	15	P arietaria	162
L Lapatium	86	P erforata	152
L appa maior	180	P ersicaria	145
L appa minor	185	P es columbinus	144
L aureola	186	P etroselinum	129
L enticula aqua	176	P iberitis	104
L ilium conuallium	175	P lantago aquatica	152
L inaria	185	P olytrichon	185
L ingua hircina	160	P rasinum foetidum	140
L iquiritia	110	P ulicaria	144

I N D E X

R <i>Esta bonis</i>	114	<i>Squinantum</i>	13
<i>Reuponticum</i>	110	<i>Stichas Arabica</i>	117
<i>Rostrum porcinum</i>	91	<i>Stæchas citrina</i>	166
<i>Rubia tinctorum</i>	150	<i>Sumach</i>	48
S <i>Aponaria</i>	102	T <i>Amariscus</i>	40
<i>Satyrion</i>	146	<i>Tapsus barba =</i>	1
<i>Scariola</i>	91	<i>tus</i>	179
<i>Scrofularia minor</i>	106	<i>Terpentina</i>	33
<i>Sicla</i>	88	V <i>Ermicularis</i>	176
<i>Sigillum Salomonis</i>	156	<i>Vicia sylvestris</i>	94
<i>Siler montanum</i>	126	<i>Vincamperuinca</i>	156
<i>Solatrum</i>	170	<i>Virga pastoris</i>	112
<i>Sparagus</i>	89	<i>Vngula caballina</i>	143
<i>Spelta</i>	80		
<i>Squilla</i>	102		

F I N I S.

CURATIONVM MORBORVM IN

DIOSCORIDE

contentarum Index.

ABSCENSVM

remedia.

M^{El}
^{Cucurbita}

Thlaspi Mentha

Viscum

Bechion siue Thussilago

Pentaphyllon

Buglosson

ABORTVM

facientia.

Asparagus Arisaron

Ampeloleuce

Hedysaron

Populus alba

Oxyacanthos

Coagulum

Brassica sativa

Cyclaminos

Dracunculus duplex

Onosma Elaterium

Scammonium

Thelypteris

Vinum phthorion, siue

abortivum

Vinum helleborites

Conixa.

ABORTVS

remedia.

Sabina Galbanum

ACONITO

contraria.

Balsamum

Morus

Lac schiston

Coagulum

Chamaepitys

Vinum in communi

Scoria, siue recrementum

ferri.

Diosco. lib. 6. cap. 7.

ACVLEOS ex

INDEX

trahentia.	Malua	Plantago
Vide, spicula corpori in-	Myosota, uel myosotis	
fixa extrahentia.	altera	
ACVLEATORVM	Baccharis	Anthemis
ictus remedia.	Strychnon satinum siue	
Laurus	Solanum hortense	
Malua	Aegilops	
Sisymbrium	Vua ænanthe	Alica.
Anisum	ALARVM	virus
Althea	extinguentia.	
Oxalme	Myrrha	Myrtus
Vinum thymite	Scolymos, siue Car-	
Adipum medele	dus	Alumen.
Diosc. lib. 2. cap. 63.	ALGORIS	re-
ADVRENTES	media.	
medicinae.	Laurinum oleum	
Buprestis	Ocimum unguentum	
Cantharides	Cinnamomum	
Pityocampe	Aristolochia terra	
Salamandra.	Abrotonum	
ADVSTIONVM	Vinum scilliticum	
remedia.	Eleomel, uel Eleomeli.	
Vide, Ambustorum	ALLII	acrimoniam
remedia.	extinguentia.	
AEGYLOPIAE	Ruta	
remedia.	ALOPECIAE	mor
Asarum	bi remedia.	
Iuglans	Myrtus	
	Oryza	
	Harundo	Iuglans

C V R A T I V V S.

Auellana		atque purgantia.	
Erinaceus	terrestris	Asarum	Crocus
Hippocampus		Crocomagma	
Rana	Locusta	Oleum amygdalinum	
Adeps	Fimum	Oleum cicinum	
Rhaphanus	Beta	Oleum balaninum	
Cape	Milium	Oleum cnidium	
Sinapi	Cyclaminus	Olea Aethiopica	
Asphodelus		Fagus	Galla
Batrachion		Faba Thebaica	
Myosotis		Siliqua	
Nymphaea		Mespilus	Cornus
Cynoglosson		Ficus Aegyptia	
Adianton	Thapsia	Caprificus	
Aerugo ferri		Cerasia	Melimela
Sandaracha		Citrea mala	Pruna
Halcyonium	Cotes	Amygdale amare	
Cinis ungularum capri-		Morus	Ficus
narum.		Tellina	Chama
A L V V M cons-		Iuncus odoratus	
turbantia.		Cochleæ terrestres	
Ernum	Orobus	Sepia	Silurus
Brassica satina		Pisces saxatiles	
Allium	Capparis	Lac	Lac schistum
Peplus	Vux recentes	Butyrum	Medulla
Vinum dulce		Fel	Fimum
Aqua maris	Flos salis.	Tragus	Linum
A L V V M soluentia		Lens	Phaselus

I N D E X

Rhaphanus		Hippophaes	
Lapathum		Characias	Linosthis
Nasturtium		Lathyrus	Quercus
Eruum	Eruca	Chamaesyce	Cici
Scandix	Lactuca	Scammonium	
Cucumis		Ampeloleuce	
Cucurbita	Atriplex	Thelypteris	Passum
Brassica sativa		Melicratum	
Brassica marina		Vinum Albanum	
Malva Blitum		Vinum Lesbium	
Asparagos		Coccimela	
Porrum	Cape	Vinum melitite	
Struthion	Zinziber	Thalassomeli	
Cyclaminos	Scilla	Vinum absynthite	
Bulbus esculentus		Vinum helleborite	
Agaricum	Aloe	Vinum scammonite	
Absynthium scriphium		Rubrica sinopis.	
Hyssopum		ALVVM sistentia.	
Ammoniacum		Aspalathus	
Phyllitis	Cestron	Mastichinum	
Scordion		Laurinum	
Chamaepitys		Populus nigra	
Androsomon		Populus picea	
Papaver ceratitis		Paliurus	
Vrtica	Cynoglosson	Oxyacantha	
Spartum		Cynosbato	
Balanus myrepfica, siue		Cistos	Rosa
glans unguentaria		Acacia	Palma

glans.

Zinziber

CVRA TIVVS.

Palma elate		Polygonon mas
Malum punicum		Lagogus
Malus	Siliquæ	Clematis daphnoides
Cotoneæ		Xyris Anchusa
Mala epirotica		Gramen Parnasium
Pyræ	Mespilus	Rubus Pentaphyllon
Lotus	Cornus	Phœnix herba
Sorbus Pruna syriaca		Idea radix
Lepus terrestris		Oxyschœnus
Lac	Caseus	Rubrica sinopis
Fulygo butyri		Aizoon
Sanguis	Fimum	Papauer satium
Yncurion	Triticum	Adianton
Brassica sativa		Phlomidès Vue
Hordeum	Plantago	Vinum phalernum
Crimnon	Seris	Vinum œnanthe
Bromos	Chondryllæ	Vinum passum
Oryza	Alica	Vinum rhoite
Ailium	Faba	Vinum myrtite
ens	Anethum	Vinum cedri
apium	Aphace	Vinum lauri
myrnion		ALVINIS utilia.
Hippomarathrum		Coagulum
cantha		Nymphaea
loe	Hæma	Clymenon
kuta	Anisum	Papauer satium
Orchis serapias		Omphacomeli
æonia	Althæa	AMATORIIIS ne=

INDEX

nesciꝝ attributa.

Cyclaminos

Catanance

Dorycnion

Cotyledon

Mandragoræ

Leontopodion

Phyteuma.

A M B V S T O R V M

remedia.

Acacia

Asphodelos

Aristolochia

Althæa

Aixoon mains

Archion

Atramentum scriptoriũ

Buccinum

Cyros

Corium ustum siue uetez

rum calceamentorum

Cynoglossum

Cinnabaris

Ebulus

Phlomis, siue uerbascũ

Galion

Hypericon

Lactuca sylvestris

Ascyron

Alumen

Beta

Cistos

Fimum

Hedera

Helxine

Lilium

Morus

Narcissus

Olinæ colymbades

Ouum

Platanus

Sesamum

Sal

Vnguentum felinum.

A M P H I S B A E N A E

morsus curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 64.

A N G I N A E res

media.

Acetum

Cyprinum unguentum

Cedria

Crocodilium

Elaterium

Fel animalium

Fimum

Hyssopus

Laserpitium

Mel

Spartum siue genista

Sal

Piper

Rhaphanus

Myrtus

Malus

Picea

Plantago

Stimmi

Thus

Absynthium

Cape

Hirundo

Irinum

Oxymel

Viole

Pix

C V R A T I V V S.

A N H E L I T V S dif Bdelium

ficultat is re-
media.

Panaces heracleon

Terra lemnia

Asarum

Balsamum

Diosco lib. 6. cap. 55.

Naphtha

A N I M I defectus

Centaurium maius

remedia.

Baccharis Peucedanum

Cucumis

Pulegium

Galbanum

Coris

Parthenion

A N I M I uoluptas

Adianton

tes auget.

Ampelolence

Buglosson.

Et infra in uerbo Ortho

A N I M I deliquia

pnoicis.

generantia.

A N I M A L I V M fe-

Diosc. lib. 6. in prefat.

ritas mitigatur.

A N O D Y N A.

Oenagra

Hyoſcyamus

A N I remedia.

Aconitum pardalian-

Vide, Sedis remedia.

ches.

A N I M A L I A uen-

A N T I D O T V M

tris expellentia.

ingredientia.

Vide, Tineas latas pellen-

Acorus

Pho

tia.

Amomum

Costum

A N I M A L I A que

luncus odoratus

perimunt.

Cyphi

Diosco. lib. 6. in prefat-

Scincus ſiue ſcingus

tionis ſine.

Sanguis Rape ſatina.

A N I M A L I V M

Napum, ſiue bumas

ictus remedia.

Brassica ſatina

INDEX

Piper	Abrotonum	ARANEIS con-
Stichas	Ruta	traria.
Caros	Anethum	Morus
Petroselinon		Grossi
Hedysaron		Melanthion.
Mandragoras		ARANEI ictus
Rubrica, siue terra le-		remedia.
mnia.		Mullus piscis
APVM ictus		Allium
remedia.		Melissophyllon
Laurus	Malua	Coris
Sisymbrium		Oxyschænus
Althæa		Hyacinthus
Diosc. lib. 6. cap. 57.		Aizoon maius.
APOSTEMA		ARGENTI uiu-
tum remedia.		curatio.
Vide, Suppurationum		Diosc. lib. 6. cap. 28.
remedia.		ARGEMATVM
APPETITVM ge-		morbi remedia.
nerantia.		Fel animalium
Cerasia.		Vrina
APPETITVM		Lactuca sylvestris
incitantia.		Cera
Vinum in communi		Argemone
Vinum Selenite.		Anagallis
AQVAE inter cus-		Ocimum
tem remedia.		Papauer ceratitis
Vide, Hydropicorum.		Lotus satina.
		ARQVATORVM
		remedia.
		Onos siue millepeda
		Asparagus

C V R A T I V V S.

Asparagus	Ruta	Thapsia
Cyclaminos	Thymoxalme	
Sphondylion	Vua passa	
Oenanthe	Vinum melitite.	
Buththalmos	A R T E R I A E	
Chrysanthemon	remedia.	
Vinum absynthite.	Irinum	
A R S E N I C I, siue an	Myrrha	Thus
ripigmenti cu	Caryota, siue caryotis	
ratio.	des	
Diosc.lib.6.cap.29.	Ficus	
A R T I C V L O R V M	Sinapi	
morbis utilia.	Prason, id est porrum	
Amurca Anethinum	Glycyrrhiza	
Agaricum	Triticum	
Arction	Rhaphanus	
Bulbus esculentus	Laserpitium	
Centaurium minus	Pentaphyllon	
Cinis uitium	Vuapassa	
Helleborus niger	Rhodomeli	
Scammonium	Tragacantha.	
Mandragoras	A S P I D V M mora	
Meon Naphtha	sus remedia.	
Nardus Narcissus	Cimices lecti	
Ouum Oxymel	Butyrum	Clematis
Palma elate	Daphnoides	
Pentaphyllon	Aqua maris	
Psyllium	Diosc.lib.6.cap.70.	

I N D E X

ASTRICTO =		Pyra	Pyra sylvestria
ria medicina.		Mespilus	
Aspalathus		Mespilus alia	
Bryon	Crocus	Cornus	Morus
Oleum omphacinum		Lixivia ex ficu	
Oleum ex oleastro		Ionia siue Cionia	
Myrrha		Adeps	
Vnguentum melinum		Adipum medicinae	
Vnguentum ananthinum		Faba Aegyptia	
Cortex thuris		Lens	Portulaca
Picea ac pinus		Seris	Porrus
Pityides	Lentiscus	Hedera	Myosotis
Terebinthus		Agaricum	
Fuligo picis		Rhaponticum	
Cypressus	Iuniperus	Gentiana	
Vlmus	Paliurus	Absynthium	
Cyprus	Lilia	Absynthium seriphium	
Cistos	Hypocistis	Mentha	Melilotus
Cydonia	Rosa	Maron	Ruta
Acacia	Salix	Cuminum satium	
Vitex		Hieracium maius	
Olea sylvestris		Conixa tertium genus	
Quercus	Castanea	Lysimachium	
Galla	Thus	Clymenos	Anchusa
Palma	Palma elate	Idea radix	
Malicorium	Myrtus	Granum tinctorum	
Myrtidanum	Malus	Chrysocome	
Cotonea	Persica	Aizoon maius	

C V R A T I V V S.

Phlomidēs	Arsenicum	Sal
Lotus syluestris	Fex uini	Spongiæ
Ebulus	Lapis Phrygius	
Vitis syluestris	Lapis Asiꝯ	
Nuclei acinorum	Lapis sciſſilis	
Vua ænanthe.	Terra eretria	
Omphacium	Lapis Samius	
Passum	Foligo pictoria.	
Vinum omphacite	A S S V L A S fixas cor	
Vinum nigrum è labru	poribus extra	
sca	hentes.	
Vinum cydonite	Cochleæ terrestres.	
Omphacomeli	A T T O N I T I S utilia	
Vinum apÿte	Ampeloleuce.	
Vinum myrtite	A V R V G I N E M	
Vinum palmeum	tollentia.	
Vinum è cedro	Lycium	Agaricum
Vinum piſſite	Libanotis coronaria.	
Vinum absynthite	A V R I C V L A R V M	
Vinum tragoriganite	remedia.	
Vinum prasite	Bulbus esculentus.	
Vinum calaminthite	A V R I V M medi	
Vinum aromatite	cine.	
Spuma argenti	Cannabis satiuā	
Chrysocolia	Araneus	
Cinnabaris	Adipum medicine	
Chalcanthos	Asphodelus	
Diphryges	Absynthium	Anisum
	R r	ij

INDEX

Aparine	Aqua maris	Omphacium	Pice
Acetum		Populus alba	
Acetum scillicicum		Plantago	
Alumen	Aphronitrum	Porrum	Peucedanus
Blatte	Beta	Praslon	
Crocus	Cistos	Polygonon mas	
Cornix	Cucurbita	Papauer satium	
Cape	Capparis	Psyllium	
Cucumis anguinus		Rhus obsoniorum	
Daphnides		Rosa	Salix
Dracunculus maior		Senecta serpentis	
Ficus		Sesamum	Sinap
Fel animalium		Spondylium	Stoebe
Faba Aegyptia		Strychnum satium	
Flos aris	Flos salis	Sulphur	
Hedera	Helxine	Thus cum pice	
Irinum unguentum		Terebinthina	
Hyssopus	Laurinum	Vermes	Vrina
Lycium	Lapation	Vinum myrteum, siue	
Malum punicum		myrsinite	
Myrtus	Mel	Vinum cedrites.	
Myosotis	Mentha	B DELLARVM,	
Melilotus	Myrrha		siue hirudinum cu
Oleum amygdalinum		ratio	
Oleum balaninum		Diosc.lib.6.cap.32.	
Oleum hyoscyaminum		BESTIAS su	
Olea syluestris		gantia.	
Onos	Origanum	Acantha lence, siue spi	

C V R A T I V V S.

na alba.	Helenium Hippophaes
BESTIARVM uen-	Heliotropium
enatarum remedia.	Iris Illyrica
Balsamum.	Lychnis sylvestris
BESTIARVM mor-	Lathyrus Linxostis
sus remedia.	Malus Melanthion
Helenium Aegyptium	Mentha
Sanguis Porrum	Mandragoras
Allium Argemone	Ocimum Parthenion
Eryngium Pulegium	Peplos Scammonia
Apium Vinum cedrite	Thlaspi Thapsia
Sal Terra samia.	Thymelea
BILEM adgene-	Vitis sativa
rantia.	Vnguentum susinum
Iuglans.	id est, lilij.
BILEM pur-	BLATTAS in se
gantia.	contrahentia.
Agriorhaphanus	Phlomis.
Androsamos	BOVM scabiem
Anchusa Apios	emendantia.
Brassica canina	Cedria.
Calamintha	BRONCHOCE-
Clematis Cici	las discutientia.
Cucumis anguinus	Vide, gutturis remedia.
Characias Chamalea	BVPRESTIS ue-
Helleborum nigrum	neni remedia.
Elaterium Ebulus	Lac schiston
Epithymum Empetron	Diosc. lib. 6. cap. 3.
	Rr ij

I N D E X

CACHEXIAE, id
est maciei remedia.
Aqua maris.

CACOETHE
remedia.

Vnguentum rosaceum

Crocinum Thus

Glandes Ficus

Cicer Plantago

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Hedera Viscum

Asclepias Psyllium

Vrtica Petasites

Cadmia Diphryges

Flos salis.

CALCIS curatio.

Diosco.lib.6.cap.29.

CALCVLI remedia.

Cyperus

Cardamomum

Oleum amygdalinum

Cerasia

Amygdalus amara

Ossifragus

Vrina Sium

Struthion

Centaurium maius

Bdellium

Paliurus

Fimum

Sisymbrium

Cuminum sylvestre

Artemisia

Hippomarathon

Asplenon

Parthenion

Lithosperma

Althæa

Saxifragum

Gramen

Acanthus

Cotyledon prima

Vitis sativa

Myrtus sylvestris

Oxalme

Lapis iudaicus Ochra

Lapides spongiarum.

CALEFACTO

ria medicina.

Adipum medicina

Medulla animalium

Fel

Propolis

Rhaphanus

Rhaphanus agria

Daphnides

Pruna

Lapathon

Ononis

Anthemis

Peonia

Tribulum

Tragion

Cera

Triticum

CV R A T I V V S.

Sisymbrium	Elæomeli	Laurinum
Sisymbrium aquaticum	Sampsuchinum	
Sinapi	Nasturtium	Ocyminum
Thlaspi	Erysimon	Anethinum
Piper	Zingiber	Susinum
Dracunculus maior	Cyprinum, siue ligustri-	num
Dracunculus minor	Irinum	Gleucinum
Asphodelus	Amaracinum	
Bulbus esculentus	Metopium	
Agaricum	Stacte	Nardinum
Gentiana	Malabathrinum	
Anonis siue Ononis	Myrrha	
Eryngion	Myrrha Bæotica	
Absynthium	Styrax	Bdellium
Absynthium seriphium	Thus	Terebinthus
Hyssopum	Origanum	Resina
Tragoriganum		Palimpissa
Pulegium	Iuniperus	
Mentha	Sabina	Cedria
Serpyllum	Cedrides	Laurus
Sampsuchum	Daphnides	Cyprus
Maron	Cistos alia	Vitex
Aspalathus	Amygdala amara	
Crocomagma	Ficus	
Helenium	Lixivia ex ficu	
Oleum vulgare	Cisseris	
Oleum sicyonium	Cochleæ terrestres	
Strigmenta gymnasto-	Fiber	
rum & palæstrarum.	Buprestis pityocampa	

I N D E X

<i>Salamandra</i>		<i>Aerugo aurificum</i>	
<i>Oesypus</i>		<i>Chrysocolla</i>	
<i>Panaces heraclion, siue</i>		<i>Chalcanthon</i>	
<i>herculeum</i>		<i>Alumen</i>	<i>Sulphur</i>
<i>Ligusticum</i>		<i>Flos salis</i>	<i>Pyrites</i>
<i>Seseli Massiliense</i>		<i>Lapis hematites</i>	
<i>Sison</i>	<i>Anisum</i>	CALEFACTO-	
<i>Caros</i>	<i>Anethum</i>	<i>rum remedia.</i>	
<i>Cuminum sativum</i>		<i>Lana succida.</i>	
<i>Ammi</i>	<i>Oreoselinon</i>	CALIGINIS	
<i>Smyrniön</i>		<i>oculorum re-</i>	
<i>Hippomarathrum</i>		<i>media.</i>	
<i>Daucus</i>	<i>Libanotis</i>	<i>Fel animalium</i>	
<i>Laserpitium</i>		<i>Lactuca sylvestris</i>	
<i>Galbanum</i>		<i>Ocymum</i>	<i>Cepe</i>
<i>Ammoniacum Stachys</i>		<i>Dracunculus maior</i>	
<i>Scordion</i>	<i>Artemisia</i>	<i>Sinapi</i>	<i>Nasturtium</i>
<i>Anthemis Chrysocome</i>		<i>Erysimum</i>	<i>Piper</i>
<i>Portulaca agrestis</i>		<i>Zinziber</i>	
<i>Lotus sylvestris</i>		<i>Dracunculus minor</i>	
<i>Vinum picatum</i>		<i>Anagallis</i>	
<i>Vinum in communi</i>		<i>Chelidonium maius</i>	
<i>Aqua maris</i>		<i>Sagapenon</i>	
<i>Vinum è cedro, arboris</i>		<i>Chamaedrys</i>	
<i>busq; alijs</i>		<i>Chamaesyce</i>	
<i>Vinum è cypresso</i>		<i>Flos æris</i>	
<i>Vinum cedrite</i>		<i>Pumex</i>	<i>Fex uini</i>
<i>Vinum chamaedryite</i>		<i>Lapis thyites</i>	

CURATIVVS.

CALLORVM

remedia.

Triticum

Laserpitium

Chalcitis lapis

CANCRESCENT

tibus ulceribus

medetur.

Vrtica.

CANES occidentia.

Asparagus

Apocynon.

CANIS rabie sanat.

Alyssum.

CANIS rabiosi mor-

sus remedia.

Lycium

Cancro

Cinis vitium

Garum

Omotarichos

Smaris

Iecur ardens canis

Triticum

Sanguis

Mel

Grossi

Panaces heracleon

Cape

Laserpitium

Vrina

Aster atticus

Melissophyllon

Vrtica

Cynoglosson

Foeniculum

Ballote.

Oxalme

Aphronitrum, siue spu-

ma nitri.

Diosc. lib. 6. cap. 37.

Herm. Coroll. cap. 212.

CANIS non rabidi

morsus remedia.

Amygdale amare

Iuglans

Ficus

Mituli

Gobius

Cucumis

Bulbus esculentus

Mentha

Ebulus.

CANIS impetum

cohibentia.

Iecur & dens canis.

CANES necantia.

Chamaleon albus:

CANVM scabiem

emendantia.

Oleum lentiscinum

Cedria.

CANTHARIDES

fugantia.

Vnguentum melinum.

CANTHARIDVM

INDEX

noneni remedia.		Aqua maris.	
Lac schiston		CAPILLVM	pur-
Adipum medicina			gantia.
Diosc. lib. 6. cap. 1.		Fœnogrecum	
CAPILLORVM		Linum.	
defluuium reprim-		CAPILLOS	
mentia.		tingentia.	
Oleum ex oleastro		Acacia	
Myrrha		Myrtus	Morus
Cistos alia, siue ladanū		Stratiotes terrestres	
Myrtus		Ebulus	
Brassica sativa		Terra ampelites.	
Nasturtium		CAPILLOS	
Aloe	Adiantum.	nutrientia.	
CAPILLVM		Iuglans	
denigrantia.		CAPITIS ulcerum	
Cupressus		remedia.	
Fagus	Ilex	Balsamum	
Palma elate		Oleum ex oleastro	
Myrtus	Hedera	Oleum amygdalinum	
Elelisphacos	Rubus	Vnguentum rosaceum	
Vinum myrtite.		Telinum	
CAPILLVM		Narcissinum	
rufantia.		Myrrha	Thuo
Cyprus	Lycium	Vrina	Fœnogrecum
Lotus	Fœx vini.	Cicer	Linum
CAPILLVM flauū		Malua	Allium
reddentia.		Cyclaminos	

C V R A T I V V S.

Bulbus esculentus		Melanthion	
Melilotus	Lilium	Coniza maior	
Bettonica, siue Britan-	Anagyris	Bettonica	
nic.	Radix hederae		
Xyris	Rubus	Oxyſchænos	
Rubus Idæus	Oxalme	Psyllium	
Vinum myrsinite Sal.	Papauer rhœas, siue erra-		
CAPITIS doloris	ticum		
remedia.	Strychnon, siue solanum		
Iris Illyrica	Aſarum	ſatium	
Meon siue meu	Aixoon maius		
Oleum oleastri	Hippogloſſon		
Oleum amygdalinum	Chamedaphne		
Ynguentum roſaceum	Myrtus ſylueſtris		
Narciſſinum	Cyprus	Elaterium	
Rose	Vitex	Scammonium	
Amygdale amara	Vitis ſatiua		
Torpedo	Vinum		
Lac humanum	Vua œnanthe		
Lana ſuccida	Aqua maris		
Curmi	Sifymbrium	Acetum ſcillite	
Sesamum	Hedera	Lapis ophites.	
Portulaca	Aloe	CAPITIS dolorem	
Mentha	Serpyllum	facientia.	
Baccharis	Ruta	Styrax	Oliua
Aniſum		Glandes	Palma
Sphondylion		Arbutus	
Pencedanum		Iuglans	

I N D E X

<i>Eruum</i>	<i>Laserpitium</i>
<i>Absynthium</i>	<i>Nasturtium</i>
<i>Ferula</i>	<i>Olea sylvestris</i>
<i>Men, siue meon</i>	<i>Pix</i> <i>Plantago</i>
<i>Peucedanus</i>	<i>Panaces heracleon</i>
<i>Mandragora</i>	<i>Sabina</i> <i>Vua passa.</i>
<i>Vinum gypsatum</i>	C A R D I A C O s
<i>Vinum phoenicite</i>	<i>rum reme-</i>
<i>Vinum rhetinlte</i>	<i>dia.</i>
<i>Vinum mesagite.</i>	<i>Buprestis</i>
C A P V T purgantia.	<i>Seris</i> <i>Rubus.</i>
<i>Anemone</i>	C A R N E M tenerio-
<i>Brassica sativa</i>	<i>rem reddentia.</i>
<i>Beta</i> <i>Cape</i>	<i>Vrtica siue acalyphe.</i>
<i>Chelidonium minus</i>	C A R N E M coalescere
<i>Chalcanthum</i>	<i>facientia.</i>
<i>Cyclaminos</i>	<i>Lixivia ficus</i>
<i>Origanum.</i>	<i>Symphyton.</i>
C A R B V N C V L O s	C A R N E S superua-
<i>rum medicina.</i>	<i>cuas compefcentia.</i>
<i>Brassica sativa</i>	<i>Characias</i> <i>Cadmia</i>
<i>Cupressus</i>	<i>Aes ustum</i>
<i>Cinnamomum</i>	<i>Flos aris</i>
<i>Cyprus</i>	<i>Laserpitium</i>
<i>Coriandrum</i> <i>Characias</i>	<i>Lana usta</i>
<i>Eruum</i> <i>Fimum</i>	<i>Lapis Afius</i>
<i>Iuglans</i>	<i>Spuma argenti</i>
<i>Lupinum satium</i>	<i>Smaris</i>

CURATIVVS.

[CARCINOMA=	Rosa	Sal
tum remedia.	Dioscor. lib. 6. cap. 55.	
Fuligo thuris	& 69.	
Buprestis	Cicer	CERVSSAE
Erysimon		curatio.
Dracunculus maior	Diosc. lib. 6 cap. 22.	
Dracunculus minor	CERIONVM	ulce=
Aristolochia tertia		rum remedia.
Vrtica	Galiopsis.	Grossi
CASEVS	ne cariem	Pepo
sentiāt.	Quere, Fauos rum=	
Dracunculus minor.	pentia.	
CAVA implemtia.	CERVICIS	rigoris
Cadmia	Pompholyx	medicina.
Cerussa	Vide, Opisthotonicorum	
Lapis schistos	remedia.	
Lapis morochthus	CHIRONIORVM	
Terra samia	ulcerum remedia.	
Fuligo thuris	Plantago	
Aristolochia tertia.	Ampeloleuce.	
CAEPAE acrimo=	CHOLERICIS	
niam retundit.	utilia.	
Ruta.	Cotonea mala.	
CAERASTAE	Calamintha	
ictus remedia.	Ferrum	Mentha
Cedria, siue celrinus li=	Polygonon mas.	
quor	CICATRICVM	
Harundo	remedia.	
	Anemone	

INDEX

Aloe	Adeps	Herm. Cor. cap. 366.
Bulbus esculentus		& 806.
Balanus myrepfica		CLAVORVM
Cistos	Centaurium	remedia.
Chamaesyce	Smaris	Finum
Calx uina	Laserpitium.	
Corallium		COELIACORVM
Aes ustum		remedia.
Aeris flos	Myrrha	Hypocistis
Aerugo aurificum	Lycium	
Fuligo butyri	Olea syluestris	
Faba	Fex uini	Quercus aut robur
Oleum myrtinum	Galla	Thus
Oleum Balaninum	Myrtus	Cotonea
Oleum cicinum	Morus	
Olea Aethiopica	Lixivia ex ficu	
Peucedanum	Ceruinum cornu	
Plumbum elotum	Faba Aegyptia	
Pumex	Lapathon	
Scoria argenti.	Plantago	Coronopus
CICVTAE con-	Rhaponticum	
traria.	Acantha leuce, sine spi-	
Passum & uinum	na alba	
Vinum in communi	Ferula	
Acorum	Laserpitium	
Herm. Cor. cap. 17.	Tragos herba	
CIMICES fugan-	Papaner satium	
tia & negantia.	Vinacei	

C V R A T I V V S.

Nuclei uinaceorum	Myrica	Paliurus
Eleomeli	Cyprus	
Vinum phœnicite	Olea syluestris	
Vinum rhenite	Glandes	Morus
Ferrum	Grossi	Ouum
Lapis morochthus.	Triticum	Hordeum
COLI remedia	Fœnogræcum	
Colocynthis	Linum	Cicer
Fimum	Galerita	Agriorhaphanus
Mel	Petroselinum	Plantago
Ruta	Sesamum	Sonchos
Talus suis.	Nasturtium	
COLOREM com-	Bulbus esculentus	
mendantia.	Argemone altera	
Acetum scillite	Rhaponticum	
Buphtalmos	Acantha leuce	
Cerussa	Thymus	
Cuminum satium	Coriandrum	
Laserpitium	Smyrnum	
Mastichinum	Libanotis	Viscum
Vnguentum rosaceum	Parthenion	
Vinum	Cannabis syluatica	
Vinum aromatite.	Anagyris syluatica	
COLLECTIO-	Helxine	
num remedia.	Pentaphyllon	
Amomum	Peristerion supinus	
Vnguentum telinum	Papauer satium	
Zopissa	Stratiotes aquaticus	
Naphtha	Cytisus	

INDEX

Ampelos leuce
Vinum in communi
Vinum adynamon
Vinum cydonite.

COMITIALIS morbi remedia.

Cardamomum
Balsamum Naphtha
Populus nigra Ficus
Iuncus odoratus
Lepus terrestris
Mustela
Vnguis asini
Lichen equi
Iecur hirci Hirundines
Serum Lac humanum
Coagulum Fel
Sanguis Fimum
Plantago
Eryngion Ruta
Seseli Massiliense
Libanotis
Spondylion
Peucedanum
Laserpitium
Galbanum
Sagapenum
Ammoniacum

Trifolium
Coniza Anthyllis
Symphyton Cestron
Pentaphyllon.
Papauer aphrodeles
Viola purpurea.
Helleborum nigrum
Hippophaeston
Ampelos leuce
Ampelos melana
Oxymel
Acetum scillite
Lapis selenites
Lapis aetites
Cotes.

CONCEPTIONI

contraria.
Epimedium
Heliotropium maius
Aerugo ferri
Alumen
Lapis ostracites
Herm. Coroll. cap. 267.

CONCEPTIO nem facilitantia.

Coagulum
Lolium
Staphylinos agrios
Lapis

C V R A T I V V S .

Lapis samius.	alsamum	Helenium
CONCOCTIO =	Calamus odoratus	
ni utilia .	Sampfuchinum	
Anethum	Althæa	Metopium
Acetum scillite	Bdellum	Iuniperus
Balsamum	Crocus	Cedrides
		Halimos
Crocomagma		Lixivia à ficu Fimum
Caros	Cestron	Dracunculus maior
Calx niua	Eryca	Dracunculus minor
Ligusticum	Pulegium	Asphodelus
Papauer satium		Capparis
		Argemone
Resina	Styrax	Rhaponticum
Seseli Massiliense		Gentiana
Sulphur	Vinum	Aristolochia tertia
Vinum resinatum		Centaurium maius
Vinum absynthite		Acantha leuce
Vinum tragoriganite.		Abrotonum
CONSTRICTO =	Origanum	Pulegium
rie medicina.	Calamintha	
Vide , Adstrictorie me-	Serpyllum	
dicine.	Baccharis	
CONVULSIO =	Panaces heracleon	
nis remedia.	Libanotis	
Iris Illyrica	Peucedanum	
Acorus	Laserpitium	
Cardamomum	Sagapenon	
Asarum	Costus	Galbanum
Iuncus odoratus		Clinopodium

I N D E X

Chamedrys	Vinum in communi
Alisma	Cestron Dioscor. lib. 6. cap. 9.
Xyris	Symphytum CORPORA DE
Psyllium	Phlomidis functa à corruptione
Ampelo leuce	du tuetur.
Vinum scilliticum	Cedria.
Vinum chamedryte	CORPVS MA
Vinum tragoriganite	crescentia.
Vinum daucite	Canchamum.
Vinum panacite.	COXAEDOLO
CONDYLOMA	ris remedia.
tum remedia.	Strigmēta à palestis.
Strigmenta à balneis	COXENDICVM
Myrteum	Myrtus doloris remedia.
Cotonea	Ouum Asparagus
Aloe	Anethum Agaricus Althea
Libanotis	Abrotonum
Ballote	Stachys Aster Atticus
Phalangion	Acetum scilliticum
Pentaphyllum	Centaureum minus
Vitis sativa	Ferrum Calamintha
Plumbum elotum	Coris Cestron
Sandaracha.	Cucumis sylvestris
CORDIS TRE	Erysimon
moris medicina.	Euphorbium
Nardi spica.	Fimum Garus
CORIANDRO	Helenium
contraria.	Ammoniacum

C V R A T I V V S .

Hypericon	Hiberis	gantia.
Heliochrysos	Cupressus	
Iris Illyrica	Lolium	Coniza Ebulus
Lupinum satium	Absynthium	
Laserpitium	Hiberis	
Naphtha	Onos	Plumbum ustum.
Populus alba	C V T E M	albicantia.
Panaces heracleon	Rapum syluestre .	
Peucedanum	C V T E M	erugantia.
Pentaphyllon	Ruta	Oleum amygdalinum
Scammonium	Styrax.	
Vinum a sarite Xyris.	C V T E M	lenientia.
CRASSITVDI =	Amygdala amara	
nem extenuantia.	Oleum sicyonium	
Porrum	Vnguentum telinum	
Staphis agria .	Succus peponis	
CROCEVM CO =	Terra Chia.	
lorem facit.	C V T I S	VITIA
Rhaponticum.	tollentia.	
CRVDITATIS	Adarce Ampelos leuce	
remedia.	Amygdale amare	
Balsamum	Cochlee terrestres	
Strigmenta à balneis	Costus	
Gentiana	Chamaleon niger	
Vinum scilliticum.	Iris Illyrica	Lac
CRVSTAS generat	Ficus	Linum
Lana usta.	Lupinus	
CVLICES EV =	Lotus sylvestris	

I N D E X

Mel Ponticum	Characias
Oleum raphaninum	Colocynthis
Picea	Ephemeron
Sanguis leporis	Helleborus niger
Spuma argenti.	Ficus Galba
CVTIS PRURI=	Galbanum Hedera
tus remedia .	Hyoscyamus
Lac	Hyssopus
D ENTIVM	Lasertitium
doloris remedia.	Leucacantha
Amurca	Myrica Morus
Halicacabus	Melanthion
Asparagus	Melissophyllon
Allium Anagallis	Naphtha
Aristolochia	Olea Aethiopica
Acantha leuce	Picea Plantago
Absynthium	Panaces heracleon
Arction Acetum	Pyrethrum
Acetum scillite	Peucedanum
Alumen Batrachion	Pentaphyllon
Cedria Cytinus	Rhus Rana
Cochleæ terrestres	Sepia
Capparis	Senecta serpentis
Chelidonium maius	Strychnon hypnoticon,
Chamaeleon niger	sive somniferum
Clematis daphnoides	Unguentum rosaceum
Cucumis anguinus, si=	Vermes terreni.
ue silvestris	DENTIVM STV

C V R A T I V V S .

poris remedia.

DEPILES faciētia.

Portulaca

Scolopendria

DENTITIONI

Characias.

infantium utilia.

DESQVAMATIS

Leporis cerebrum

utilia.

Butyrum cum melle.

Strigmenta gymnasto-

DENTIFRICIA.

rum

Purpura Buccinum

Lana succida.

Ceruinum cornu

DESTILLATIO

Halcyonium

nes coercentia.

Corallium.

Irinum

Styrax

DENTIBVS STV

Naphtha

porem adferentia.

Et in uerbo, Pituitæ de-

Cadmia.

stillationis remedia.

DENTES firmātia.

DILACRYMA=

Lentiscus

tiones emendantia.

Oliuæ colymbades

Picea

Pinus.

Myrrha

DISCVSSORIAE

Oleum omphacinum.

medicinæ.

DENTES ALBI=

Androsæmon

care facit.

Alihea

Viscum

Halcyonium.

Galbanum

DENTES VITIA

Ammoniacum

tos extrahentia.

Lapis Gagates.

Amurca

DOLORVM inue=

Oleum oleastri.

teratorum remedia.

DENTES mouētia.

Sinapi

Oleum oleastri.

Lana succida

I N D E X

Ligusticum.	Capparis	
DOLORES lateris.	Erysimon	Aegilops
Vide, laterum dolores.	Ficus	Fimum
DOLOREM ne sentiant qui urendi se =	Glans	Galiopsis
candide sunt.	Hydropiper	
Mandragoras	Ammoniacum	
Lapis memphites.	Lens	Linum
DORYCNI curatio	Lapis alabastrites	
Diosc. lib. 6. cap. 6.	Megaliun	
DRACONIS MARINI morsus.	Melanthion	
	Mandragoras	
Mullus piscis	Porrum	
Vrina Ocymum	Panaces heracleon	
Absynthium	Pentaphyllon	
Plumbum elotum & crematum	Paronychia	
	Pyrites	Styrax
Sulphur	Sanguis	Smyrniou
Diosc. lib. 6. cap. 61.	Terra cimolia	
DRYINI MORBUS curatio.	Vinacei	
Diosc. lib. 6. cap. 65.	DYSENTERIA	
DVRITIEM EMOLLIENTIA.	corum remedia.	
Amaracinu vnguentu	Adipum medicina	
Bdellium	Asparagus Argemone	
Buphthalmos	Agaricum	
Cyprinum	Althea	Alcea
	Allisma	
	Aizoon maius	
	Butyrum	Cupressus

C V R A T I V V S .

Cotonea	Cornu	Pentaphyllon
Ceruinum cornu		Papaner ceratite , siue
Coagulum	Cera	corniculare
Glematis daphnoides		Quercus
Elatine		Rubrica, siue terra lenia
Eupatorium		Silurus Sanguis
Fœnograecum		Sium Scordium
Faba Aegyptia		Symphyton
Ferrum	Galla	Stœbe
Omphacium		Sideritis achillea
Hypocistis		Salsugo Tragion
Hedera	Hippuris	Vitis satina, siue uinifera
Lentiscus	Lycium	Vinacei
Lotus		Vinum cydonite
Lixiua ex ficu		Et in uerbo , Intestino-
Lac schiston		rum remedia.
Linum	Lapathum	E BRIETATI
Lysimachia		utilia .
Myrrha	Macer	Amygdalus amara
Malum punicum		Brassica satina
Melissophyllum		Absynthium.
Naphtha		E LEPHANTIAE
Nymphaea		remedia .
Nuclei acinorum		Cedria
Oryza	Omphacium	Erinaceus terrestris
Oxalme	Portulaca	Serum
Plantago	Phyllitis	Fel animalium
Polemonium		Zythum Plantago

INDEX

<i>Calamintha.</i>	<i>Resina</i>	
ELEPHANTIAS	<i>Styrax</i>	<i>Viscum.</i>
<i>gignentia.</i>	ENTEROCELAE	
<i>Vinum sicyte.</i>	<i>remedia.</i>	
EMOLLIENTES	<i>Hippuris, siue equisetū.</i>	
<i>medicine.</i>	EPHELIDIS	
<i>Adipum medicinae</i>	<i>utilia.</i>	
<i>Bdellium</i>	<i>Balanus myrepfica</i>	
<i>Cinnamomum</i>	<i>Cici.</i>	
<i>Cypros</i>	EPINYCTIDIS	
<i>Cistos</i>	<i>morbi remedia.</i>	
<i>Cera</i>		
<i>Cerussa</i>	<i>Chalcantum</i>	
<i>Calx uina</i>	<i>Oesypus</i>	
<i>Fœnogræcum</i>	<i>Myrtus</i>	
<i>Cleucinum</i>	<i>Amygdale amare</i>	
<i>Ammoniacum</i>	<i>Grossi</i>	<i>Fimum</i>
<i>Irinum</i>	<i>Brassica sativa</i>	
<i>Laurus</i>	<i>Plantago</i>	<i>Cucumis</i>
<i>Lana succida</i>	<i>Porrum</i>	<i>Absynthium</i>
<i>Linum</i>	<i>Coriandrum cum melle</i>	
<i>Lapis Gagates</i>	<i>passaque uia</i>	
<i>Metopium</i>	<i>Viscum</i>	
<i>Myrrha Bœotica</i>	<i>Heliotropium mains</i>	
<i>Medulle animalium</i>	<i>Vua passa</i>	
<i>Naphtha</i>	EPIPHORAE	
<i>Palimpissa</i>	<i>remedia.</i>	
<i>Panaces heracleon</i>	<i>Afarum</i>	<i>Malobathrum</i>
<i>Psyllion</i>	<i>Cotonea</i>	<i>Crimnoi</i>
<i>Plumbum elotum</i>	<i>Coriandrum</i>	<i>Lilium</i>

C V R A T I V V S.

Ambrosia	Vua passa	Ochra	Pumex
Terra samia		Pyrites	Scordione

ERVICIS pinorum Spuma argenti Sal.
conuenit EXTENDATO =

Unguentum melium *rie medicinae.*

Dios. lib. 6. cap. 2. Artemisia

ERUPTIONVM Anthemis

remedia. Iris Illyrica

Serum **Hysopus**

Lupinum sativum Lapis hematites

Beta Portulaca Pulegium

Penthaphyllon *Panaces heracleon.*

Balanus myrepsica E X T R A C T O .

Vinum myrsinite *riae medicinae.*

Alumen. Galbanum

EXCRETIO = *Viscum* *Thasia*

nis crassæ pectoris Scoria argenti.

remedia ad... **F**ACIES ne à sole
Pix liquida aduratur.

Dracunculus minor Omm

Tordylon. FACIEI nitia au-

EXCRESCEN= *ferentia.*

tia deprimentiu. *Ampelos agria*

Alumen Cerussa Halcyonium

Cinis vitis Adarces

Diphryges *Brassica sativa*

Erinaceus marinus *Bulbus esculentus*

Lapis Asius Balanus myrepfica

I N D E X

Cinnamomum		Peponis radix
Cochleae terrestres		Grossi.
Cyclaminos		FAVCIVM morbi
Eruum	Ficus	remedia.
Hedera	Iris Illyrica	Acetum
Lepus	Lilium	Acetum scillite
Lotus sylvestris		Cacalia
Mastichinum		Aethiopsis
Mel sardoum		Ficus
Oleum amygdalinum		Lac
Oleum raphaninum		Laserpitium
Pepo	Polygonaton	Mel
Spuma argenti		Papauer satium
Sisymbrium aquaticum		Styrax.
Thapsia.		FAVCES asperas
FACIEI rugas aufe-		facientia.
rentia.		Characias
Cacalia.		Cimolia terra.
FASTIDIVM ge-		FEBRIBVS con-
nerantia.		traria.
Vinum catorchite		Mala punica.
Diosc.lib.6.in p̄s̄fat.		FEBRIE V G I A.
FATIGATIO		Centaurium minus
num remedia.		Conixa.
Adeps.		FEBRIVM remedia.
FAVOS rumpentia.		Agaricum
Eruum		Aristolochia tertia
Vna passa		Anthemis
		Anchusa
		Aphronitrum
		Balsamum
		Buglossum
		Costus
		Cucurbita

C V R A T I V V S.

Clymenon		Verbenaca supina	
Fœniculus	Hypericon	Trifolium	Ruta.
Hyoscyamus		FELLE	suffusis
Heliotropium maius			utilia.
Lac humanum		Adiantum	
Lagopus		Vinum a sarite.	
Myrrha Ouum		FELLEI	humoris
Oleum sicyonium			remedia.
Portulaca	Piper	Absynthium	
Panaces heracleon		Centaurium minus.	
Polygonon mas		FERITATEM	ani
Pentaphyllon			malium mitigantia.
Peristerion supinus		Oenagra.	
Rhaponticum		FERRVMINA	N=
Ruta	Smyruiion		di uim habentia.
Sapapemon		Spuma argenti	
Saxifraga		Rubrica sinopis	
Trifolium	Vna	Spongia	
Vinum melitite		Lapis morochthus.	
Vinum rhoite		FILIVM	masculum
Vinum hyssopite.			generantia.
FEBRIS	quartana	Phyllon	Orchis
	remedia.	Crataegonos.	
Arancus	Buglosson	FISTVLARVM	
Cimices lecti	Dipsacū		remedia.
Hypericon		Adeps	Arifaron
Heliotropion maius		Cinnamomum	
Pentaphyllon		Characiæ	

I N D E X

Calcites lapis
 Dracunculus minor
 Dipsacus
 Helleborum nigrum
 Orchis Serapias
 Omphacinum
 Papyrus Plantago
 Pentaphyllon
 Stratiotes terrestris.

F L A T V S discus-
 tientia.

Cinnamomum
 Ocymum
 Vinum stichadite.

F L A T V M adges-
 nerantia.

Malus Zythum
 Phaseolus.

F L V X I O N V M
 remedia.

Fuligo butyri
 Erysimon
 Lichen in petris
 Ocymum Portulaca
 Pepo Squama aris
 Papauer satium
 Acantha Arabica
 Chium uinum

Acetum Ebenus
 Licium Lixiua ex ficu
 Vinum rhoite

Vinum terebinthinum
 Vinum pissite
 Vinum melampsythiū.

FOETVS necantia.

Vide, Partus necantia.

FOEMINAS ste-
 rilescentia.

Lepus terrestris
 Hedera

FORMICAE mor-
 bi remedia.

Cicer Characias
 Chamaesyce

Batrachion Dipsacum
 Heliotropium maius

Lacerta Ruta
 Thus Vitis sativa.

FRACTURAE
 remedia.

Fuligo pictoria.

FVNGORVM ve-
 nenatorum re-
 media.

Verbenaca

Fimum Mel

C V R A T I V V S.

Rhaphanus		Malua
Absynthium		Oleum oleastri
Melissophyllon		Oleum amygdalinum
Fungi		Oleum myrtinum
Vinum in comuni		Oxalme
Acetum		Olea
Chalcanthum	Sal	Salix
Pyrorum ligni cinis		Vnguentum melinum
Aphronitrum		Vnguentum telinum
Cinis uitium		Vrina
Lapis Asius		Vinum myrsinite
Diosc. lib. 6. cap. 23.		Allium
FVRVNCVLO=		Beta.
rum remedia.		G A N C R A E N A E
		morbi remedia.

Ficus		Ampelos leuce
Grossi	Triticum	Brassicasaiua
Rhaphanus		Bulbus esculentus
Asphodelus		Cinnamomum
Galbanum		Characias
Pygnochomum	Sal	Galiopsis
Aphronitrum.		Iuglans
FVRFVRES tollen		Lixivia è fico
tia.	Allium	Lilium
Adiantum	Alumen	Lens
Fœnogrecum		Lupinum satium
Fel animalium		La serpitium
Grossi	Linum	Rhus
Lilium	Myrtus	Rhaphanus
		Vrtica
		Vua passa.
		G E N I T A L I V M
		morbi remedia.
		Asparagus
		Amurca

I N D E X

Aloe	After atticus	nem deprimentia.
Cyprinum	Cotyledon	Clymenon
Fuenegracum		Heliotropium maius
Flos salis Linum.		Mentha Thelypteris
Malum punicum		Xyphion Asplenon.
Polygonon		GENITVRAM ex-
Sampsuchinum		tinguentia.
Vinum terrebinthinum.		Cannabis sativae semen
GENITALIVM		Anethum.
nirus extin-		GENITVRAM
guentia.		Augentia.
Alumen.		Semen coriandri
GENARVM morbi		Coriandrum.
remedia.		GENITALIVM
Aloe		torporem in-
Aerugo aurificum		ducentia.
Aerugo ferri		Cicuta.
Ammoriacum		GINGIVARVM
Lapis schistos		morbi remedia.
Mituli	Naphtha	Aristolochia tertia
Olea sylvestris.		Aloe Acetum.
GENITVRAE		Acetum scillite.
proflauū in som-		Alumen Butyrum
nō remedia.		Canchamum Cytinus
Lactuca sylvestris		Chalcitis lapis
Nymphaea		Aerugo aurificum
Hermol. Cor. cap. 937.		Aerugo ferri
GENERATIO	Galla	Lycium

CURATIVVS.

GUTTURIS

remedia.

Lepus terrestris

Lac schiston

Lapis alabastrites

Myrrha Mastiche

Oleum omphacinum

Pruna Plantago

Pumex Rosa

Rubus Staphis agria

Sal Tribulus

Vua cenanthe

Vinum rhetinũte.

GLABROS aut de-
piles facientia.

Scolopendra

Characias.

GLADIORVM
aciem perstrin-
gentia.

Malum sylvestre.

GLANDIS mem-
bri remedia.

Mel.

GRAVEDINIS
remedia.

Styrax.

GVRGVLIONI
utilia.

Silurus.

Bdellium

Ficus Aster Atticus

Vinum halosanthinum

G Y P S I curatio.

Lixivia ex ficu

Dios.lib.6.cap.24.

HAEMOR-
rhoidarũ remedia.

Amaracinum

Allium Anonis

Aloe Cepe

Irinum Libanotis

Lapis Arabicus

Ouum Palma

Plumbum elotum

Rhus Rubus.

HAEMORRHOI-
darum curatio.

Diosc.lib.6.cap.69.

HALITVS oris
remedia.

Agallochum

Anisum Bromos

Citrum Malobathrum

Myrrha Mastiche

Vinum selenite.

INDEX

HASTVLAS in Diofc. lib. 6. cap. 37.
fixas corpori ex=
trahentia. HOMINEM
necantia.

Oxyacantha. Iuniperi ramenta
HEPATICORVM Smilax feu taxus.

remedia. HOMINIS mor=
sus remedia.

Vide, Iecinoris morbo=
rum remedia.

HERBAE quæ pe=
rimunt.

Iuglans.

HORRORES excu=
tientia.

Diofc. lib. 6. in præfat.

Vide, Rigorem excu=
tientia.

HERNIAE medicinae

Cinnamomum

HVLCERANTES
medicinae.

Cupressus Cytinus

Pentaphyllum

Buprestis Salamandra

Psyllium Xyphion.

Batrachion Ruta

HERPETIS con=
traria.

Lonchitis Hedyfaron

Clematis

Strychnon fatium

Portulaca agrestis

Acetum.

Ampeloleuce.

HIRVNDINVM

HVLCERVVM

visus restaurantia.

remedia.

Chelidonium maius.

Amygdala amara

HIRVDINES

Anemone Amylum

pellentia.

Anagallis Aristolochia

Acetum.

Aloe Anthemis

HIRVDINIS

Althea Anchusa

curatio.

Astragalus Aconiton

Arction

C V R A T I V V S.

Arction	Acetum	Lentiscus	Lycium
Arsenicum	Alumen	Lana combusta	
Brassica sativa	Beta	Lolium	Lens
Bulbus esculentus		Lupinus Libanotis	
Ballote		Laserpitium	
Caries lignorum		Lilium	Myrtus
Cistos	Chelidonium	Mel	Mandragoras
Centaurium		Nasturtium	
Chamaeleon niger		Narcissus	
Coriandrum		Olea sylvestris	
Chamaedrys		Oleum amygdalinum	
Chamaepitys		Orobis	Orchis
Chamaelca		Oenagra	Omphacium
Cadmia	Cinis vitis	Plantago	Pix
Corallium		Palma	
Dracunculus		Purpura combusta	
Eleliphacon		Pepo	Panaces
Eupatorium		Pencedanum	Prasion
Ebulus	Aes ustum	Pentaphyllon	
Ficus	Fimum	Peristercon supinus	
Aerugo aurificum		Papauer ceratitis, id est,	
Fel	Glans	corniculare.	
Grossi	Hedera	Psyllium	
Goed, id est, coriandrum		Plumbum elotum	
Gentiana		Pumex	
Iris Illyrica	Isatis	Rhamnus	Ruta
Indicus lapis		Stratiotes terrestris	
Lixivia cum cinere ficus		Scordion	

INDEX

Sandaracha	Sal	Cestron	Cotyledon
Spongia	Thus	Cucumis anguinus	
Viscum	Thelypteris	Cici	
Testæ fornacum		Helleborum nigrum	
Vrtica.		Ebulus	Ficus
HVMORVM malos		Erinaceus terrestris	
rum medicine.		Hippophaes	
Metopium unguentum		Hippophaeston	
Nardinum		Hyssopus	Laserpitum
Amygdalæ dulces		Lathyrus	Origanum
Mel		Plantago	Pancratiū
HYDROPICORUM		Polium	Rhaphanus
remedia.		Ruta	Silla
Afarum	Amurca	Sampsuchus	
Halicacabus	Allium	Staphylinus	
Absynthium	Anisum	Smyrnion	
Androsaces	Alisma	Strychnon hypnoticon,	
Ampelos agria		sive solanum somnificum	Sal
Aqua maris			
Acetum	Aphronitrum	Trifolium	Tithymalus
Halcyonium		Vitex	Vrina
Buprestis	Cyperus	Vinum scillite	
Cinnamomum		Vinum rhetinite	
Calantus odoratus		Vinum cedrite	
Cochleæ terrestres		Vinum asarite	
Cicer		Vinum panacite.	
Chamæleon albus		HYOSCYAMI	
Chamædrys		cursatio.	

C V R A T I V V S.

Diosc. lib. 6. cap. 15.

IECINORIS res
media. Acorus

Nardi spica

Nardum Gallicum

Amomum

Iuncus odoratus

Agallochum

Picea

Pinus

Daphnoides

Palma elate

Amygdale amara

Lac humanum

Scandyx Struthium

Anagallis Agaricum

Rhaponticum

Gentiana

Glycyrrhiza

Eryngium

Abfynthium

Serpyllum Sphondylium

Ammoniacum

Anthemis

Chamepitys

Vettonica Eupatorium

Hyoscyamus

Pentaphyllum

Papauer ceratitis, sine
cornutum

Epipactis Isopyrono

Vinum cydonite

Vinum pissite

Vinum absynthite

Vinum nardite

Vinum asarite

Vinum ex syluestri asaro

Vinum chamaelites

Rubrica synopsis.

IG N I S sacri res
media.

Asarum Acacia

Acinos herba

Anchusa Iycopsis

Aizoon maius

Brassica sativa

Acetum Beta

Baccharis Bechion

Crocus Cupressus

Coriandrum Cicuta

Cotyledon Cici

Chalcitis lapis

Aerugo ferri

Harundo Helxine

I N D E X

Lilium	Lens palustris	Myrrha	Nasturtium
Lapis Smyris		Sinapi	Propolis.
Myrtus	Malua	INCVSSIS vtilia.	
Mandragoras		Phlomidēs.	
Portulaca	Plantago	INFANTES mor-	
Parthenion		tuos utero ejicientia.	
Polygonon mas		Dictamnus.	
Pentaphyllon		INFANTIBVS	
Peristereon rectus		vtilia.	
Papauer satium		Athara	Aster Atticus
Psyllium Rhamnus		Strychnum satium	
Rosa	Ruta	Smilax aspera.	
Rubus	Idea	INFANTIVM pue-	
Salix	sanguis	pille ut glauce,	
Seris		non nigra red-	
Strychnon, siue solanum		dantur.	
satium		Auellana.	
Stratiotes aquaticus		INFLATIONES	
Vrina		facientia.	
ILEI morbi remedia.		Allium	
Oleum vulgare		Capparis	Glans
Strychnos halicacabus.		Laserpitium	Porrum
IMPETIGINIS		Bulbus esculentus.	
morbi remedia.		INFLATIONVM	
Amygdale amare		remedia.	
Lapathon		Aspalathus	
Lichen in petris		Amygdale amare	
Lolium	Thus	Absynthium	

C V R A T I V V S.

Anisum	Anethum	Argemone
Anthemis	Althea	Anagallis
Costus	Cicer	Artemisia
Cuminum	Eryngion	Aizoon maius
Epithymum		Acetum Butyrum
Helenium	Hyssopum	Brassica sylvestris
Hieracium	maius	Bechion
Iuncus odoratus		Brion thalassion
Iuniperus	Lac	Cassia
Ligusticum	Hordeum	Cotyledon prima
Ocimum		Elatine Ebulus
Peucedanum		Faba Ficus
Rapa sylvestris		Harundo
Rhaponticum		Hyoscyamus
Triticum		Irinum Laurus
Thymoxalme		Linum
Vrtica	Vinacei	Lupinum sativum
Vinum		Lonchitis
Vinum pissite		Lichen in petris
Vinum absynthite		Lens palustris Lapis
Vinum scilliticum		Melilotus Mandragoras
Vinum chamedryite		Naphtha Ocimum
Vinum tragoriganite		Ochra Picea
Vinum sylvestris nardi.		Platanus Portulaca
INFLAMMATIO		Pulegium Parthenion
num remedia.		Polygonon mas
Coriandrum		Papauer erraticum
Adeps	Asphodelus	Rosa Rhus

I N D E X

Susinum	Sabina	Agallochum	Anthemis
Sesamum		Coclea	terrestres
Sonchos	Scordion	Hippuris	
Symphytum		Irinum	Iac
Stratiotes aquaticus		Linum	Mastichinum
Triticum	Tribulus	Malua	hordeum
Vinacei	Xyris.	Palma	Portulaca
INGVINVM mor-		Rosaceum	Rosa
bi remedia.		Ruta	Salix
Vide Genitalium.		Spartum	
INGENIVM prom-		Vinum Surrentium	
ptum facientia,		Triticum	
Ouum.		Et in uerbo, Dysenterico	
INSANIAM in-		rum remedia.	
ducentia.		INTERTRIGO	
Hyoscyamus		ut tollatur.	
Strychnon hypnoticon		Vitex	Corium.
Mandragoras.		ISCHIADICO-	
INSANIENT-		rum remedia.	
tium remedia.		Asarum	Balsamum
Betonica		Cardamomum	
Helleborum nigrum.		Silurus	Fimum
INSOMNIA in-		Nasturtium	Thlaspi
ducentia.		Rhaponticum	
Vide, Somnifera medi-		Thymus	
cina.		Ammoniacum	
INTESTINO-		Icontopetalon	
rum remedia.		Erythrodanum	

CURATIVVS.

Ascyron
 Androsæmum
 Chamæpitys
 Polemonia
 Ocyroides
 Aethiopsis
 Arction
 Chamæcissos
 Spartum
 Colocynthis
 Oxymeli
 Vinum panacite
 Salsugo Adarces.
 IUMENTIS con-
 traria.
 Gramen cilicum
 Nerion.
 IUMENTORVM
 scabiem emen-
 dantia.
 Amurca Alysson
 Lupinum satinum
 Oleum piscinum
 Oleum lentiscinum.
 IUMENTORVM
 ulcera emen-
 dantia.
 Oleum picinum.

Alysson
 Thelypteris.
 LABIORVM scis-
 sura remedia.
 Adeps Lycium.
 LAC coagulantia.
 Balsamum Ficus.
 LAC extinguentia.
 Cicut.a.
 LACRYMAS
 trahentia.
 Aerugo aurificum.
 LACERTAE mor-
 sue remedia.
 Portulaca
 Seps, siue lacerta calchi-
 dica in uino epota.
 LACRYMAE que
 perimunt.
 Dioscorides lib. 6. in præ-
 fat.
 LACRYMA-
 tiones emen-
 dantia.
 Vide, dilacrymationes
 emendantia.
 LACTIS uberta-
 tem facientia.
 T t iij

I N D E X

Argemone	Anethum	Bdellium	
Ampeloleuce		Cyprinum	Fimum
Cicer	Circea	Centaurium maius	
Echion Fœniculus		Gentiana	Galbanum
Halimos	Hordeum	Hordeum	
Lactuca	Malua	Leucacantha Myrrha	
Melanthion		Naphttha	Pho
Ocymum		Panaces heraclion	
Sonchos	Vitex.	Petroselinon	
LACTIS coagula		Prasium, siue marrubiū	
ti curatio.		Pseudobunion	
Diosc. lib. 6. cap. 26.		Ruta	Sagapenum
LASSITVDINVM		Terebinthina	
remedia.		Thapsia	Vrtica
Anethinum		Vinum cedrite	
Adeps	Clymenon	Vinum hyssopite	
Laurinum		Vinum stichadite	
Ammoniacum	Sal	Vinum tragoriganite	
Lapis gagates		Vinum aromatite	
Vinum chameletes.		Vinum acorite	
LATERVM morbi		Vinum glycyrrhite.	
remedia.		LENDES necantia.	
Acorus	Agallochum	Cedria	Mel
Asphodelus		Myrica	Beta
Aristolochia tertia		Allium	
Ampeloleuce		Alumen	
Balsamum		LENTIGINIS ma	
Brassica satina		cule remedia.	

C V R A T I V V S.

Alysson	Halcyonium	Ficus	Fel
Aqua maris		Hordeum	Iuniperus
Ampelolence		Lolium	Lapathum
Brassica sativa		Lepidium	Myosotis
Bulbus esculentus		Oleum oleastri	
Balanus myrepfica		Oleum cicinum	
Cinnamomum		Olea Aethiopica	
Eruum	Galbanum	Oryza	Salamandra
Melanthion	Rhaphanus	Serum	Sinapi
Sanguis leporinus		Struthion	
Sisymbrium sylvestre		Scammonia	
Spuma argenti		Sulphur	Sal
Triticum cum aceto,		Terebinthina	
LEPRAE remedia.		Thapsia	
Allium	Anemone	Terra melia	
Aristolochia		Ulmus	Urinu
Acantha	Anchusa	Vitis sativa.	
Acetum		LEPORIS marini	
Ampelos leuce		remedia.	
Halcyonium		Fiber	Cornus
Alumen	Adarce	Lapis ophites	
Buprestis		Halcyonium	
Brassica sativa		Chamaeleon niger	
Cochleae terrestres		Cicer	
Clematis	Fraxinus	Cucumis anguinus	
Cucumis anguinus		Characias	
Helleborum nigrum		Helleborum nigrum	
Acrugo amrisicum		Ficus	Glutinum

I N D E X

Lascepitium	Olea	Rhaponticum	
Pruna		Aristolochia tertia	
Rhaponticum		Crocodilion	
Ruta		Absynthium	
Vitis sativa		Hyssopum	
Vinum tethalassome-		Tragoriganum	
num.		Pulegium	
LIENIS morbi		Dictamnus	
remedia.		Sison	Anison
Iris Illyrica		Smyrnion	
Nardum Gallicum		Peucedanum	
Myrice	Acorus	Sagapenum	
Ca. chamum		Ammoniacum	
Oleum amygdalinum		Viscum	Polium
Lycium	Vitex	Chamaedrys	Leuconion
Cotonea	Linum	Nymphaea	Asplenon
Ficus Aegyptia		Hemionitis	
Lac humanum		Erythrodanum	
Lupinum sativum		Vettonica	
Rhabanus		Lonchitis altera	
Lapathum	Sinapi	Polemonia	
Brassica sativa		Clymenon	Xyris
Nasturtium		Anchusa	Vrtica
Piper	Struchion	Adiantum	Pteris
Helebra Cyclaminos		Ampelos leuce &	agria
Pancration		Aqua maris	
Capparis	Lepidium	Vitis sativa	
Agarcum		Acetum scilliticum	

CV R A T I V V S.

Vinum panacite	Trifolium.
Ferrum Corallium	LUMBRICOS
Lapis Asius Coris	necantia.
Hermol. Cor. cap. 124	Coriandri semen
LINGVAE utilia.	Absynthium seriphium
Olea Aethiopica.	Brassica sativa
LIPPITVDINIS	Chamaeleon albus
remedia.	Calamintha
Ebenus	Myrrha Portulaca
Lapis hematites	Oleum cicinum
Plantago Spongia.	Thelypteris
LIQVORES qui	Lupinum sativum.
perimunt.	LUMBORVM affe
Diosc. lib. 6. in praefat.	Etuum remedia.
LIVORVM emen-	Asparagus Capparis
dantia.	Chamaepence
Allium Aqua maris	Echion Harundo
Iuglans	Iencacantha
Lana succida	Papaver cornutum
Rhaponticum	Sampsuchinum
Sinapi	Smyrnion.
Lupinum sativum	LVPOS necantia.
Thasia.	Aconitum pardalian-
LOCORVM mulie-	ches.
brium remedia.	Aconitum alterum
Anethum Althaa	Apocynum.
Fænogracum	LVSCIOSORVM

INDEX

Fel animalium

Sanguis.

LUXATIS milia.

Asparagus Acantha

Aphronitrum

Bulbus esculentus

Fimum

Harundo

Heliotropion

Iuglans

Narcissus

Polypodium

Vitex

Vrtica

Vitis sativa

Vinum pissite

Sampsuchus

Sal.

MACIEI corporis remedia.

Erinaceus.

MACVLAS tolerantia.

Oleum balaninum.

MACVLAS rubescere facientia.

Crocodilea, id est, Crocodili terrestres finium.

MALIS medicamentis contraria:

Adeps

Ruta

Pentaphyllon

Antirrhinon.

MALORVM que serpunt remedia.

Acacia

Plantago

Polygonon mas

Helxine

Cicuta

Strychnum fatinum

Aizoon maius

Colymbades olivae

Sabina.

MAMMARVM morbi remedia.

Asarum

Cotonea

Iuglans

Thus

Erysimon

Ochra

Lens

Ernum

Asphodelus

Mentha

Scammonia

Sandaracha

Triticum

Baccaris

Apium

Asclepias

Hemerocallis

Althea		Passum & protropon vi num
Chamaepitys		
Epimedium	Cici	Acetum Oxymel.
Hyoscyamus		MELICERIDVM
Vinacei		morbi remedia.
Aqua maris		Serum
Fex uini		Parthenion
Terra samia.		Helleborum nigrum
MAMMAE uirginū		Epithymum
ne crescant.		Acetum scilliticum
Cicuta	Cotis.	Amomum
MASCVLVM si-		Melilotus.
lium generantia.		MENSTRA
Crataegonos		promocantia.
Phyllon	Orchis.	Iris Illyrica
MATRICIS morbi		Men
remedia.		Cyperus
Malua		Asarum
Oleum balaninum		Casia
Paeonia.		Ginnamomum
MAXILLARVM		Costum
doloribus remedia.		Iuncus odoratus
Ceruinum cornu.		Balsamum
MEATVS aperien-		Canchamon
tia.		Helenium
Allium	Cyperus.	Myrrha
MECONIO		Sampsuchinum
contraria.		Amaracinum
		Abrotonum
		Styrax
		Naphtna
		Cedrides Myric

I N D E X

Tilia	Hypocistos	Agaricum	
Lycium	Acacia	Aristolochia tertia	
Vitex		Centaurium maius	⊕
Olea sylvestris		minus	
Lotus		Eryngion	
Amygdala amara		Absynthium	
Ficus		Origanum	
Cochlea terrestres		Tragoriganum	
Fiber	Bubrestis	Pulegium	
Osyryus	Fimum	Eleliphacos	
Cicer	Rhaphanus	Calamintha	
Lapathum		Thymus	
Brassica sativa		Serpyllum	
Chondrylla		Sampsuchus	
Lactuca sylvestris		Baccharis	Ruta
Caucalis	Eruca	Panaces heracleon	
Ocymum Cape		Ligusticum	
Orobanche	Allium	Seseli Massiliense	
Porrum		Tordylors	
Ampeloprasos		Sison	
Nasturtium		Foeniculus	
Thlaspi		Oreoselinum	
Struthion		Petroselinum	
Cyclaminos		Hippomarathran	
Asphodelus		Hyposelinum	
Capparis		Smyrnion	
Anemone		Dancus	Libanotis
Hedera		Melanthion	

Hem.

Laserpitium		Ampelos melana	
Sagapenon		Heliotropion maius	
Euphorbion		Vinum scilliticum	
Clynopodium		Vinum absynthice	
Chamædrys	Lilium	Vinum hyssopite	
Melissophyllum		Vinum aromatite	
Prasium	Stachys	Vinum daucite	
Trifolium		Vinum panacite	
Polium	Scordion	Vinum helleborite	
Arthemisia		Vinum dictamnite	
Leucoion		Staphylurus.	
Anthemis	Pæonia	MENSTRVA	si-
Erythrodanum		stentia.	
Anagyris		Lentisci succus	
Alisma	Coris	Myrica	
Hypericon		Oxyacanthos	
Cestron	Medion	Thus	Palma
Xyphion	Tragion	Malum punicum	
Heliochrysos		Myrtus	
Mandragoras		Lepus terrestris	
Vrtica	Myrtus	Fuligo butyri	
Adiantum		Coagulum	
Myrtus sylvestris		Sanguis	Acinos
Laurus Alexandrina		Acantha Arabica	
Daphnoides		Hieracium maius	
Chamedaphne		Nymphaea	
Helleborus niger & al-	Pæonia	Iimomion	
bus.	Medion		

I N D E X

Sideritis achilleos

Rubus

Idea radix

Tragos *Lyfimachia*

Oxyſchœnos

Heliochryſos

Papauer ſatium

Mandragora

Aixon maius

Aerugo ferri

Vinum rhetinite

Fex uini

Lapis Aſius

Morochthus

Hæmatites

Oſtracites

Terra ſamia.

MENTEM commo-
uentia.

Coriandrum

Oreofelinum

METALLA quæ
perimunt.

Dioſc. lib. 6. in præfat.

MOLLIENTES
medicinæ.

Vide, Demollientes.

MORBI regij me-

dicinæ.

Vide, Regij morbi.

MORBORVM quæ
ſerpunt remedia.

Vide, Malorum quæ ſer-
punt.

MVLIERVM deſi-
derio quo ſatiſfiat.

Acorum

Picea

Pinus

Adeps bubulus.

MVLIERVM infir-
mitatum remedia.

Amomum

Balsamum

Suſinum

Sefeli Maſſilienſe.

MVRES necantia.

Chamæleon albus

Aconitum pardalianches

Helleborus candidus

Hermol. Cor cap. 28.

MVRIS aranei mor-
ſus remedia.

Mus araneus

Absynthium

Chryſogonon

Dioſc lib. 6. cap. 62.

MVRIS

CURATIVVS.

MVRIS MOR=	Metopium	Bdellium
sus remedia.	Lixiua ex fico	
Grossi Allium.	Erinaceus terrestris	
MVSCAS necantia:	Cochleæ terrestres	
Lyfimachia.	Vipera	
MYRMECIAS	Vermes terreni	
tollentia.	Lac humanum	
Ficus.	Triticum	Poterium
NARIVM mor=	Peucedanum	
bi remedia.	Laserpitium	
Malum punicum.	Lilium	Satyrum
NAVSEAM DI=	Melissophyllon	
scutientia.	Althea	Coccus
Tragoriganum	Erigeron	Cacalia
Pulegium	Narcissus	
Fœniculus.	Hippophæston	
NAVSEAM MO=	Vini qualitas	
mentia.	Aqua maris	
Laurinum	Acetum scilliticum	
Susinum.	Vinum stichadite	
NERVORVM mor	Vinum thymite	
bi remedia.	Fœx vini	Fiber.
Oleum sicyonium	NERVOS ledentia.	
Oleum eleomeli	Malus	Hedera
Laurinum	Vinum	
Cyprinum	Vinum gypsatum	
Glossinum	M...	

INDEX

Melſardoum.

NIGREDINES
abſtergit.

Sabina.

NODIS utilia.

Bdellium.

NOMARVM mor
bos curantia.

Asparagus

Sabina Papyrus

Ciſtos

Olea ſylueſtris Olea

Oliue colymbades

Malum punicum

Smarides

Fel' animalium

Vrina Liliū

Plantago Ariſaron

Aſphodelus

Maron Praſium

Orchis ſerapias

Britannica

Periſtereon ſupinus

Galiopſis

Vua ænanthe

Omphacinum

Acetum Oxalme

Squama eris

Aerugo aurificum

Chalcites lapis

Flos ſalis

Lapis oſtracites.

NVBECVLAS

oculorum emen-
dantia.

Vide, Oculorum reme-
dia.

NYCTILOPARVM
morbi remedia.

Vide, Luſcioſorum re-
media.

O B M V T E S C E
re facientia.

Mandragora.

OCVLO RV M epi-
phora remedia.

Aſarum

Malabathrum

Cotonea Sefamum

Lens Cucurbita

Anemone

Argemone

Myofotis

Gentiana

Baccharis Ruta

Apium Hemerocallis

C V R A T I V V S.

Rubus idæa	Populus alba	
Papauer sativum	Myrice	Acalis
Philomides	Ebenus	Rosa
Aster atticus	Lycium	Acacia
Viola purpurea	Salix	
Cici.	Olea sylvestris	
O C V L I S contraria.	Olea	
Lactuca	Olea Aethiopica	
Porrum	Ocymum	Palma Thebaica
Coriandrum	Cytinus	Myrtus
Anethum	Cerasia	
O C V L O R V M mor	Halicacabus	Mituli
borum remedia.	Cochlea terrestres	
Acorum	Cassa	Scorpius marinas
Cinnamomum	Vipera	
Amomum	Senecta serpentis	
Balsamum	Sepia	
Canchamum	Mullus piscis	
Crocum	Ouum	Hirundines
Crocomagma	Cervinum cornu	
Oleum ulgare	Lac humanum	
Elepmeli	Costus	
Oleum amygdalinum	Fuligo butyri	
Myrrha	Thus	Lana usta
Fuligo thuris & resina		Oesypus
& picis	Fel animalium	
Picea	Sanguis	
Cupressus	Vrina	Mel
Sabina	Platanus	Amylum

I N D E X

Faba	Lens	Ammoniacum	
Brassica sativa		Sarcocolla	
Portulaca		Chamedrys	
Seris	Pepo	Prasium	Stoebe
Lactuca sylvestris		Tribulus	Erinos
Ocimum	Cape	Gramen Parnasium	
Sinapi	Piper	Rubus	Elatine
Zingiber		Papaver sativum, &	
Cyclaminos		cornutum	
Asphodelus		Hyoscyamus	
Dracunculus maior		Mandragoras	
Dracunculus minor		Aconitum	Pard-
Argemone		lianches	
Anagallis		Aizoon maius	
Chelidonium maius		Helleborus albus	
Othonna		Cici	Chamaesyce
Centaurium minus		Capnos	
Tragacantha	Aloe	Lotus sativa	
Absynthium		Sesamoides maius	
Abrotonum		Aes ustum	
Ruta	Sampsuchus	Vua cenanthe	
Melilotus		Vinum Surrentinum	
Ruta Galatica, siue syl-		Acetum scilliticum	
vestris		Cadmia	
Panaces heracleon		Squama eris	
Foeniculus		Acrugo aurificum	
Libanotis		Plumbum elotum	
Sagapemon		Stimmi	Cinnabaris

CVRATIVVS.

Chalcitis lapis

ORIS VLCE=

Alumen

Pumex

rum remedia.

Sal

Flos salis

Cyperus

Aspalathus

Fex uini

Spongia

Puligo picis

Cyprus

Corallium

Tilia

Acacia

Pyrites

Olea syluestris

Hematites

Castanea

Calaetites

Thyites

Malum punicum

Morochthus

Mana

Sapphirus

Lac schiston Butyrum

Geodes

Plantago

Aloe

Samius.

Origanum

OPISTHOTONI

Leucoion

corum, id est, cernicis
rigore laborantium re
media.

Orchis serapias

Anthemis

Periclymenon

Acanthion

Rubus

Eryngion

Staphis agria

Laserpitium

Vua ænanthe

Sagapenon

Omphacium

Satyron

Coris.

Acetum scilliticum

OPII remedia.

Sandaracha

Sal

Alumen

Sal.

Diosc. lib. 6. cap. 17.

ORTHOPNOI=

ORIS HALITVS

cis, id est, difficulter

remedia.

spirantibus remedia.

Vide, Halitus oris re=

Helenium

media.

Myrrha

Capressius		extrahentia.
Daphnides		Aristolochia
Cotonea	Vrina	Ampelos leuce.
Struthion		OSSA fracta conso-
Cyclaminos		lidantia.
Dracunculus maior		Vetonica Xyris.
Abrotonum		OVES necantia.
Hyssopus		Nerion.
Calamintha		OXYPARA IN=
Thymus		gredientia.
Baccharis		Ligusticum
Seleli Masiliense		Caros Anethum.
Hieracium maius		PALPEBRA=
Smyrnion		rum remedia.
Sphondylium		Vnguentum rosaceum
Peucedanum		Mastiche Resina
Melanthion		Fuligo picis
Ammoniacum		Grossi
Melissophyllon		Lixivia ex ficu
Bechion		Vrina Alumen
Botrys		Chondrylla
Anemone		Vide supra, Genarum
Hippuris		morbi remedia.
Vrtica		PALPEBRARVM
Elaterium		pili euulsi ne rena-
Hippophaeston		scantur.
Vinum panacite.		Telline
OSSIVM squamas	Sanguis	Caput.

CURATIVVS.

PALLIDVM CO PARALYTICO

lorem facientia.

rum remedia.

Hieracium minus

Capparis

Aloe.

Erythrodanum

PANORVM remedia.

Colocynthis

Atriplex

Acetum

Ampelos melena

Bulbus esculentus

Vinum scilliticum

Coriandrum cum faba
fracta

Aphronitrum.

PARTVS necantia.

Coniza

Ficus

Daphnides

Galiopsis

Coagulum

Olea syluestris

Adeps hircinus & ouilo

Helxine

lus & bubulus

Ocymastrum

Nasturtium

Ammoniacum

Thlaspi

Ruta

Isatis

Plantago

Hedysaron

Xyphion.

Helleborus albus & nig

PANTHERAS

ger

necantia.

Colocynthis

Aconitum pardalian-
ches.

Ampelos leuce

Vinum phthorium.

PAPAVERIS

PARTVS QVI-

curatio.

bus iuuatur.

Dioscor. lib. 6. cap. 17.

Iris Illyrica

& 18.

Cinnamomum

PAPVLARVM

Balsamum

remedia.

Vnguentum telinum

Vrina

Flos aris.

Irinum

I N D E X

Amaracinum	Clinopodium
Myrrha	Ammoniacum
Picea	Fiber Chamædrys
Olea Aethiopica	Prasium
Oesypum	Bechion
Fimum	Artemisia
Cicer	Coniza
Lupinum sativum	Leucoion
Allium	Onosma
Cyclaminos	Anthemis
Dracunculus maior	Anchusa
Dracunculus minor	Mandragoras
Hedera	Laurus Alexandrina
Gentiana	Ampelos leuce
Centaurium maius	Heliotropium maius
Centaurium minus	Vinum panacite
Pulegium	Vinum helleborite
Elelisphacos	Alumen
Calamintha	Sulphur
Baccharis	Lapis laspis
Panaces heracleon	Aetites
Staphylinus	Samius.
Thynni salsi caro	P A R O N Y C H I A
Seseli Massiliense	rum, id est, unguinum
Smyrnion	morborum remedia.
Peucedanum	Thus cum melle
Sagapenum	Olea sylvestris
Galbanum	Myrtus

C V R A T I V V S.

Ebur		Videj, lumentorum sca-
Paronychia		biem
Vua cenanthe		PECORI utilia.
Aerugo ferri		Adiantum.
PAROTIDVM id		PECVS necantia.
est, aurium apostema=		Merion
tum remedia.		Aconitum lycoctonon.
Ficus		PECVS mortuum
Fimum		extrahentia.
Linum	Faba	Aristolochia.
Lapathum		PECTORIS morbi
Plantago		remedia.
Erysimon		Acorus Meu
Viscum	Althea	Costum Myrrha
Psyllium		Iuncus odoratus
Strychnon satium		Pityides
Vrtica		Terebinthina
Galiopsis		Iuniperus
Terra cimolia.		Ficus
Et in uerbo, Aurium me=		Pomum
dicine.		Nasturtium
PAVESCEN=		Piper
tium remedia		Chelidonium minus
Linum		Rhaponticum
Melicratum		Stichas
Hydromel.		Thymus
PECORIS scabiem		Ruta
emendantia.		Libanotis

I N D E X

Amaracinum	Clinopodium
Myrrha	Ammoniacum
Picea	Fiber Chamædrys
Olea Aethiopica	Prasium
Oesypum	Bechion
Fimum	Artemisia
Cicer	Coniza
Lupinum sativum	Leucoion
Allium	Onosma
Cyclaminos	Anthemis
Dracunculus maior	Anchusa
Dracunculus minor	Mandragoras
Hedera	Laurus Alexandrina
Gentiana	Ampelos leuce
Centaurium maius	Heliotropium maius
Centaurium minus	Vinum panacite
Pulegium	Vinum helleborite
Eleliphacos	Alumen
Calamintha	Sulphur
Baccharis	Lapis laspis
Panaces heracleon	Aetites
Staphylinus	Samius.
Thynni falsi caro	P A R O N Y C H I A
Seseli Massiliense	rum, id est, ungulum
Smyrnion	morborum remedia.
Peucedanum	Thus cum melle
Sagapenum	Olea sylvestris
Galbanum	Myrtus

C V R A T I V V S.

Ebur		Vide, lumentorum sca-
Paronychia		biem
Vua cenanthe		PECORI utilia.
Aerugo ferri		Adiantum.
PAROTIDVM id		PECVS necantia.
est, aurium apostema=		Merion
tum remedia.		Aconitum lycoctonon.
Ficus		PECVS mortuum
Fimum		extrahentia.
Linum	Faba	Aristolochia.
Lapathum		PECTORIS morbi
Plantago		remedia.
Erysimon		Acorus Men
Viscum	Althea	Costum Myrrha
Psyllium		Iuncus odoratus
Strychnon satium		Pityides
Vrtica		Terebinthina
Galiopsis		Iuniperus
Terra cimolia.		Ficus
Et in uerbo, Aurium me=		Pomum
dicine.		Nasturtium
PAVESCEN=		Piper
tium remedia		Chelidonium minus
Linum		Rhaponticum
Meliceratum		Stichas
Hy dromel.		Thymus
PECORIS scabiem		Ruta
emendantia.		Libanotis

100

From the

Wang, H. 2003. *China's Environmental Policy and the Role of the State*. Cambridge, MA: MIT Press.

PERCUTISSIS à fu

75 6212

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1998

1998

10

10



100

100

223 FLOPPY

1998

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

1870

10

10

10

100

100

53

Levi

CURATIVVS.

Beta	Malua
Cyclaminos	Asparagus
Dracunculus maior	Lactuca syluestris
Dracunculus minor	Hedera
Asphodelus	Abrotonum
Scilla	Daucus
Batrachion	Sphondylium
Arction	Aparine
Cotyledon prima	Phalangium
Aqua maris	Myrrhis
Alumen.	Aqua maris
PERIPNEVMO =	Dioscoridis libro 8. ca =
niacorum remedia.	pit. 58.
Abrotonum	PHAGEDAENAE
Tragoriganum.	morbi remedia.
PESTILENTIAE	Fel Finum
contraria.	Dracunculus minor
Myrrhis, id est celiso =	Ifatis
lium	Chameleon niger
Vinum omphacite.	Panaces
PHALANGIO =	Staphylinus
rum ictus remedia.	Petasites
Cinnamomum	Characias
Terebinthus	Ampelos lence
Myrica	Vinum
Myrtus	Acetum
Lixiua ex ficis	Alumen
Canceri	Sal
	Flor salis.

INDEX

PHARICO ueneno	Porrum
contraria.	Agaricum
Vinum Albanum	Rhaponticum
Diosc. lib. 6. cap. 19.	Acantha
PHLEGMATIS	Prasium
contraria.	Cestrum
Plantago.	Lapis Asi.
PHRENETICO=	PILI genarum ne
rum remedia.	defluant.
Crocinum	Spica nardi
Vitex	Cochleæ terrestres
Asparagus	Oesypus
Serpyllum	Chondrylla
Coniza tertia	Armenius lapis.
Leucoion.	PILI palpebrarum
PTHIRIASIS,	euulsi ne renas-
sive pedicularis mor-	cantur.
bi remedia	Telline
Strigmenta gymnasto-	Sanguis
rum	Canops.
Myrica	PILI alarum euulsi
Hedera	ne renascantur.
Staphis agria	Fabæ.
Sandaracha.	PITVITAE crassæ
PTHISCORVM	remedia.
remedia.	Iris Illyrica
Pix	Sesamum
Adeps	Hyssopus

C V R A T I V V S.

Thymoxalme.	Origanus
PITVITAE res	Tragoriganum
media.	Pulegium
Cinnamomum	Thymus
Styrax	Naphtha
Ulmus	Ruta
Auellana	Pyrethrum
Ouum	Sphondylium
Serum	Melanthium
Vrina	Parthenion
Hordeum	Clematis
Linum	Sideritis achilleos
Faba	Hyoscyamus
Lupinum sativum	Helleborum nigrum
Agriorhaphanus	Sesamoides maius
Portulaca	Cucumis
Cucurbita	Elaterium
Cepa	Staphis agria
Sinapi	Thapsia
Piper	Hippophaes
Cyclaminos	Hippophæston
Dracunculus maior	Cici
Capparis	Characias
Anemone	Lathyris
Anagallis	Scammonia
Centaurium minus	Thymelæa
Tragacantha	Ebulus
Hyssopus	Apios
	Colocynthis
	Epithymon

INDEX

Empetron	Naphtha
Ampelos leuce	Populus nigra
Polypodium	Amurca
Heliotropium maius	Salix
Vua passa	Ficus
Aqua maris	Cochlea terrestres
Vinum rhetinite	Mustela
Vinum aromatite	Marinus pulmo
Vinum mandragorite	Lac humanum
Vinum scammonite	Adipum medicine
Sulphus Peplus.	Sanguis scilicet mon-
PITYOCAMPA =	struus
rum curatio.	Fimum
Diosc. lib. 6. cap. 2.	Hordeum
PLAGARVM ubi-	Lens
ces emendantia.	Rapa sativa
Susnon.	Erasica sativa
PLANTAE quæ	Seru
perimunt.	Cucurbita
Diosc. lib. 6. in præfat.	Aros
PLEVRETICO =	Asphodelus
rum remedia.	Bulbus esculentus
Staphylinus	Pulegium
Laserpitium	Panaces Heracleon
Aethiopsis.	Libanotis
PODAGRÆ mor-	Scordion
bi remedia.	Lencion
Amomum	Androsaces

C V R A T I V V S.

Helxine		rum morbi remedia.
Papaver satium		Aloe.
Hyoſcyamus		PRAECORDIO
Lens paluſtris		rum remedia.
Aizoon maius		Scordion
Bryon thalaſſion		Vinum thymite
Phycos marinus		Vinum daucite.
Cucumis anguinus		PRAECIPITA
Balanus myreſtica		tis ex alto utilia.
Ebulus		Iris Illirica
Heliotropium maius		Vitex
Vua paſſa		Asparagus
Acetum	Ferrum	Aniſum
Sulphur	Sal	Cannabis ſatiua.
Lapis Aſius		PROFLUVII geni
Lapis gagates		tura remedia.
Teſta ſive terre fornacum.		Vide, Genitura profluuij in ſomno.
POLYPI morbi remedia.		PRVRIGINEM facientia.
Dracunculus maior		Scolopendra
Dracunculus minor.		Ephemeron
PRESTERIS ſerpentis morſus remedia.		Opium.
Omotarichos		PRVRIGINEM emendantia.
Rubus.		Vrina Eruum
PRAEPUTIO		Lapathum
		Aloe

I N D E X

Origanum
Pulegium
Elelisphacos
Melilotus
Balanus myrepfica
Acetum
Alumen
Sulphur
Sal.

PSILOTHRVM,
siue unguentum de=
pilatorium.

Lepus marinus

Hedera

Ampelos leuce

Dryopteris

Arsenicum.

PSORAE morbi
remedia.

Cardamomum

Oleum amygdalinum

Lycium

Olea

Palma elate

Ficus

Erinaceus marinus

Cicer

Lupinum satium

Batrachion

Chelidonium minus

Origanum

Pentaphyllon

Staphis agria

Balanus myrepfica

Ampelos leuce

Vitis salina

Aqua maris **Sal.**

PSYLLII curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 10.

PTERYGII morbi
remedia.

Acacia

Rhus

Malum punicum

Myrtus

Ficus

Glycyrrhiza

Aloe

Prasium

Pentaphyllon

Characias

Ampelos leuce

Vua cenanthe

Acetum

Alumen

Sal

Ferro

CURATIVVS.

Ferri rubigo.

PVBERTAS ne
erumpat.

Hyacinthus.

PVLMONIS mor-
bi remedia.

Iuncus odoratus

Balsamum

Cedria

Amygdalus amara

Ficus

Lac

Pulegium

Ruta

Sagapenum

Symphyton

Pentaphyllon

Chrysocome

Vrtica

Thapsia

Melicratum

Vinum hyssopite

Vinum aromatite.

PVLICES necantia.

Vnguentum telinum

Crocinum

Butyrum

PVTREDINVM

genitalium remedia.

Aspalathus.

PVTREDINES

purgantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QVADRVPE=
dum scabiem
emendat

Vide lumentorum sca-
biem.

QVARTANAE
febris remedia.

Vide, Febris quartana
remedia.

RADICES quae
perimunt.

Dios. lib. 6. in praefat.

RAVCEDANIS
remedia.

Tragacantha.

REDVVIAS

sanantia.

Ferri rubigo.

REFRIGERAN-
tes medicinae.

Faba	Lens	Ammoniacum	
Brassica sativa		Sarcocolla	
Portulaca		Chamedrys	
Seris	Pepo	Prasium	Stœbe
Lactuca sylvestris		Tribulus	Erinos
Ocymum	Cape	Gramen Parnasium	
Sinapi	Piper	Rubus	Elatine
Zingiber		Papaver sativum, &	
Cyclaminos		cornutum	
Asphodelus		Hyoscyamus	
Dracunculus maior		Mandragoras	
Dracunculus minor		Aconitum	Pardae
Argemone		lianches	
Anagallis		Aizoon maius	
Chelidonium maius		Helleborus albus	
Othonna		Cici	Chamaesyce
Centaurium minus		Capnos	
Tragacantha	Aloe	Lotus sativa	
Absynthium		Sesamoides maius	
Abrotonum		Aes ustum	
Ruta	Sampsuchus	Vua cenanthe	
Melilotus		Vinum Surrentinum	
Ruta Galatica, siue syl-		Acetum scilliticum	
vestris		Cadmia	
Panaces heracleon		Squama eris	
Fœniculus		Aerugo aurificum	
Libanotis		Plumbum elotum	
Sagapenon		Stimmi	Cinnabari

C V R A T I V V S .

Chalcitis lapis

ORIS VLCE =

Alumen

Pumex

rum remedia.

Sal

Flos salis

Cyperus Aspalathus

Fex uini

Spongia

Puligo picis Cyprus

Corallium

Tilia Acacia

Pyrites

Olea syluestris

Hematites

Castanea

Calaetites

Thyites

Malum punicum

Morochthus

Maua

Sapphirus

Lac schiston Butyrum

Geodes

Plantago Aloe

Samius.

Origanum

OPISTHOTONI

Leucoion

**corum, id est, cernicis
rigore laborantium re
media.**

Orchis serapias

Anthemis

Periclymenon

Acanthion

Rubus

Eryngion

Staphis agria

Laserpitium

Vua ænanthe

Sagapenon

Omphacium

Satyron

Coris.

Acetum scilliticum

OPII remedia.

Sandaracha

Sal

Alumen

Sal.

Diosc. lib. 6. cap. 17.

ORTHOPNOI =

ORIS HALITVS

cis, id est, difficulter

remedia.

spirantibus remedia.

Vide, Halitus oris re =

Helenium

media.

Myrrha

INDEX

Capressus		extrahentia.
Daphnides		Aristolochia
Cotonea	Vrina	Ampelos leuce.
Struthion		OSSA fracta consoli-
Cyclaminos		lidantia.
Dracunculus maior		Vetonica Xyris.
Abrotonum		OVES necantia.
Hyssopus		Nerion.
Calamintha		OXYPARA IN-
Thymus		gredientia.
Baccharis		Ligusticum
Seleli Massiliense		Caros Anethum.
Hieracium maius		P ALPEBRA-
Smyrnion		rum remedia.
Sphondylium		Vnguentum rosaceum
Peucedanum		Mastiche Resina
Melanthion		Fuligo picis
Ammoniacum		Grossi
Melissophyllon		Lixivia ex fico
Bechion		Vrina Alumen
Botrys		Chondrylla
Anemone		Vide supra, Genarum
Hippuris		morbi remedia.
Vrtica		PALPEBRARVM
Elaterium		pili euulsi ne rena-
Hippophaeston		scantur.
Vinum panacite.		Tellina
OSSIVM squamas	Sanguis	Caput.

CURATIVVS.

PALLIDVM CO PARALYTICO.

lorem facientia.

rum remedia.

Hieracium minus

Capparis

Aloe.

Erythrodanum

PANORVM remedia.

Colocynthis

Atriplex

Acetum

Ampelos melena

Bulbus esculentus

Vinum scilliticum

Coriandrum cum faba

Aphronitrum.

fracta

PARTVS necantia.

Conixa

Ficus

Daphnides

Galiopsis

Coagulum

Olea syluestris

Adeps hircinus & ouile

Helxine

lus & bubulus

Ocymastrum

Nasturtium

Ammoniacum

Thlaspi

Ruta

Isatis

Plantago

Hedysaron

Xyphion.

Helleborus albus & niger

PANTHERAS

necantia.

ger

Colocynthis

Aconitum pardalian-

Ampelos leuce

ches.

Vinum phthorium.

PAPAVERIS

PARTVS QVI

curatio.

bus iuuatur.

Dioscor. lib. 6. cap. 17.

Iris Illyrica

& 18.

Cinnamomum

PAPVLARVM

Balsamum

remedia.

Vnguentum telinum

Vrina

Flos aris.

Irinum

I N D E X

Amaracinum	Clinopodium
Myrrha	Ammoniacum
Picea	Fiber Chamædrys
Olea Aethiopica	Prasum
Oesypum	Bechion
Fimum	Artemisia
Cicer	Coniza
Lupinum sativum	Leucoion
Allium	Onosma
Cyclaminos	Anthemis
Dracunculus maior	Anchusa
Dracunculus minor	Mandragoras
Hedera	Laurus Alexandrina
Gentiana	Ampelos leuce
Centaurium maius	Heliotropium maius
Centaurium minus	Vinum panacite
Pulegium	Vinum helleborite
Elelisphacos	Alumen
Calamintha	Sulphur
Baccharis	Lapis lassis
Panaces heracleon	Aetites
Staphylinus	Samius.
Thynni falsi caro	PARONYCHIA
Seseli Massiliense	rum, id est, unguinum
Smyrnion	morborum remedia.
Peucedanum	Thus cum melle
Sagapenum	Olea sylvestris
Galbanum	Myrtus

C V R A T I V V S.

Ebur		Vide, lumentorum scabiem
Paronychia		
Vua cenanthe		PECORI utilia.
Aerugo ferri		Adiantum.
PAROTIDVM id est, aurium apostematum remedia.		PECVS necantia.
		Merion
		Aconitum lycoctonon.
Ficus		PECVS mortuum extrahentia.
Fimum		
Linum	Faba	Aristolochia.
Lapathum		PECTORIS morbi remedia.
Plantago		
Erysimon		Acorus Meu
Viscum	Althea	Costum Myrrha
Psyllium		Iuncus odoratus
Strychnon satium		Pityides
Vrtica		Terebinthina
Galiopsis		Iuniperus
Terra cimolia.		Ficus
Et in uerbo, Aurium medicinae.		Pomum
PAVESCEN = tium remedia		Nasturtium
		Piper
		Chelidonium minus
Iinum		Rhaponticum
Melicratum		Stichas
Hy dromel.		Thymus
PECORIS scabiem emendantia.		Ruta
		Libanotis

INDEX

Sagapenum
Ammoniacum
Scordion

Bechion

Vrtica

Isopyrum

Vinum cedrite

Vinum aromatite

Vinum nectarite

Vinum daucite.

PEDICVLOS

necantia.

Allium

Allumen

Mel

Cedria.

PEDVM qui à frigo=
re alserunt remedia.

Cyclaminos.

PEDVM rimarum
remedia.

Scilla

PERFRICTIO

nis medicine.

Iris Illirycæ

Cyperus

Balsamum

Oleum

Ficus Aegyptia

Vinum stichadite.

PERCVSSIS à fe=
ris utilia.

Balsamum

Paliurus

Mustela

Ouum

Argemone

Hippomarathrum

Coagulum

Sanguis

Piper

Elaphoboscon

Phylitis.

PERNIONVM

remedia.

Vnguentum melinum et
telinum

Thus cum saillo adipe

Acacia

Ficus

Cancri

Pulmo marinus

Vngues asini

Adeps

Eruum

Rapa satius

Lens

C V R A T I V V S.

Beta	Malua
Cyclaminos	Asparagus
Dracunculus maior	Lactuca syluestris
Dracunculus minor	Hedera
Asphodelus	Abrotonum
Scilla	Daucus
Batrachion	Sphondylium
Arction	Aparine
Cotyledon prima	Phalangium
Aqua maris	Myrrhis
Alumen.	Aqua maris
PERIPNEUMO-	Dioscoridis libro 8.ca=
niacorum remedia.	pit. 58.
Abrotonum	PHAGEDAENAE
Tragoriganum.	morbi remedia.
PESTILENTIAE	Fel Fimum
contraria.	Dracunculus minor
Myrrhis, id est celifo-	Isatis
lium	Chamaleon niger
Vinum omphacite.	Panaces
PHALANGIO-	Staphylinus
rum ictus remedia.	Petasites
Cinnamomum	Characias
Terebinthus	Ampelos leuce
Myrica	Vinum
Myrtus	Acetum
Lixiua ex fico	Alumen
Canceri	Sal
	Flos salis.

INDEX

PHARICO ueneno	Porrum
contraria.	Agaricum
Vinum Albanum	Rhaponticum
Diosc. lib. 6. cap. 19.	Acantha
PHLEGMATIS	Prasum
contraria.	Cestrum
Plantago.	Lapis Asius.
PHRENETICO	PILI genarum ne
rum remedia.	defluant.
Crocinum	Spica nardi
Vitex	Cochleæ terrestres
Asparagus	Oesyphus
Serpyllum	Chondrylla
Coniza tertia	Armenius lapis.
Leucoion.	PILI palpebrarum
PTHIRIASIS,	euulsi ne renas-
siue pedicularis mor	cantur.
bi remedia	Telline
Strigmenta gymnasto-	Sanguis
rum	Canops.
Myrica	PILI alarum euulsi
Hedera	ne renascentur.
Staphis agria	Fabæ.
Sandaracha.	PITVITAE crassæ
PTHISCORVM	remedia.
remedia.	Iris Illyrica
Pix	Sesamum
Adeps	Hyssopus

C V R A T I V V S.

Thymoxalme.	Origanus
PITVITAE res	Tragoriganum
media.	Pulegium
Cinnamomum	Thymus
Styrax	Naphtha
Vlmus	Ruta
Auellana	Pyrethrum
Ouum	Sphondylium
Serum	Melanthium
Vrina	Parthenion
Hordeum	Clematis
Linum	Sideritis achilleos
Faba	Hyoſcyamus
Lupinum ſatium	Helleborum nigrum
Agriorhaphanus	Sesamoides maius
Portulaca	Cucumis
Cucurbita	Elaterium
Cepa	Staphis agria
Sinapi	Thapſia
Piper	Hippophaes
Cyclaminos	Hippopheſton
Dracunculus maior	Cici
Capparis	Characias
Anemone	Lathyris
Anagallis	Scammonia
Centaurium minus	Thymelæa
Tragacantha	Ebulus
Hyſſopus	Apios
	Colocynthis
	Epithymon

I N D E X

Empetron	Naphtha
Ampelos leuce	Populus nigra
Polypodium	Amurca
Heliotropium maius	Salix
Vua passa	Ficus
Aqua maris	Cochlea terrestres
Vinum rhenitite	Mustela
Vinum aromatite	Marinus pulmo
Vinum mandragorite	Lac humanum
Vinum scammonite	Adipum medicinae
Sulphus Peplus.	Sanguis scilicet mens-
PITYOCAMPA =	struus
rum curatio.	Fimum
Diosc. lib. 6. cap. 2.	Hordeum
PLAGARVM ubi-	Lens
ces emendantia.	Rapa sativa
Susnon.	Erasica sativa
PLANTAE quae	Seru
perimunt.	Cucurbita
Diosc. lib. 6. in praefat.	Aros
PLEVRETICO =	Asphodelus
rum remedia.	Bulbus esculentus
Staphylinus	Pulegium
Laserpitium	Panaces Heracleon
Aethiops.	Libanotis
PODAGRAE mor-	Scordion
bi remedia.	Leucoion
Amomum	Androsaces

C V R A T I V V S.

Helxine		rum morbi remedia.
Papaver sativum		Aloe.
Hyoſcyamus		PRAECORDIO
Lens paluſtris		rum remedia.
Aizoon maius		Scordion
Bryon thalaſſion		Vinum thymite
Phycos marinus		Vinum daucite.
Cucumis anguinus		PRAECIPITA
Balanus myreſſica		tis ex alto utilia.
Ebulus		Iris Illirica
Heliotropium maius		Vitex
Vua paſſa		Asparagus
Acetum	Ferrum	Aniſum
Sulphur	Sal	Cannabis ſativa.
Lapis Aſius		PROFLUVII
Lapis gagates		tura remedia.
Teſta ſive terræ fornacis.		Vide, Genitura profluviū in ſomno.
POLYPI morbi remedia.		PRVRIGINEM facientia.
Dracunculus maior		Scalopendra
Dracunculus minor.		Ephemeron
PRESTERIS ſerpentis morſus remedia.		Opium.
		PRVRIGINEM emendantia.
Omotarichos		Vrina
Rubus.		Eruum
PRAEPUTIO		Lapathum
		Aloe

I N D E X

Origanum
 Pulegium
 Eleliphacos
 Melilotus
 Balanus myrepfica
 Acetum
 Alumen
 Sulphur
 Sal.

PSILOTHRVM,
 siue unguentum de-
 pilatorium.

Lepus marinus
 Hedera
 Ampelos leuce
 Dryopteris
 Arsenicum.

PSORAE morbi
 remedia.

Cardamomum
 Oleum amygdalinum
 Lycium
 Olea
 Palma elate
 Ficus
 Erinaceus marinus
 Cicer
 Lupinum satium

Batrachion
 Chelidonium minus
 Origanum
 Pentaphyllon
 Staphis agria
 Balanus myrepfica
 Ampelos leuce
 Vitis satina
 Aqua maris Sal.

PSYLLII curatio.
 Diosc. lib. 6. cap. 10.

PTERYGII morbi
 remedia.

Acacia
 Rhus
 Malum punicum
 Myrtus
 Ficus
 Glycyrrhiza
 Aloe
 Prasium
 Pentaphyllon
 Characias
 Ampelos leuce
 Vua cenanthe
 Acetum
 Alumen
 Sal

CURATIVVS.

Ferri rubigo.

PVBERTAS ne
erumpat.

Hyacinthus.

PVL MONIS mor-
bi remedia.

Iuncus odoratus

Balsamum

Cedria

Amygdalus amara

Ficus

Lac

Pulegium

Ruta

Sagapenum

Symphyton

Pentaphyllum

Chrysocome

Vrtica

Thapsia

Melicratum

Vinum hyssopite

Vinum aromatite.

PVLICES necantia.

Vnguentum telinum

Crocium

Butyrum

PVTREDINVM

genitalium remedia.

Aspalathus.

PVTREDINES

purgantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QVADRVPE=
dum scabiem
emendat

Vide Iumentorum sca-
biem.

QVARTANAE
febris remedia.

Vide, Febris quartana
remedia.

RADICES qua
perimunt.

Dios.lib.6.in praefat.

RAVCEDANIS
remedia.

Tragacantha.

REDVVIAS
sanantia.

Ferri rubigo.

REFRIGERAN-
tes medicinae.

I N D E X

Vnguentum melinum
 Cupressus
 Rhodides
 Rosa
 Acacia
 Onum
 Sonchos
 Seris
 Lactuca
 Caros
 Coriandrum
 Hieracium maius
 Polygonum duplex
 Clymenon
 Periclymenon
 Helxine
 Papauer satium
 Psvllium
 Cicuta
 Lens palustris
 Aizoon duplex
 Erigeron
 Phacos thalassion
 Potamogeton
 Cytisus
 Ebulus
 Acetum
 Omphacomele

Pompholyx
 Plumbum clotum
 Spuma argenti
 Cerussa
 Corallium
 Terra
 Lapis samius
 Terra ampelitis.

R E G I I morbi remedia.

Nardi spica
 Schistos
 Ceruinum cornu
 Fimum
 Cicer
 Lapathum
 Atriplex
 Asparagus
 Erysimon
 Scilla
 Chelidonium
 Aloe
 Absynthium
 Origanum
 Hippomarathrum
 Libanotis
 Sphondylium
 Laserpitium

CURATIVVS.

<i>Prasium</i>	<i>Calamus odoratus</i>
<i>Scordion</i>	<i>Cicer</i> <i>Casia</i>
<i>Asplenon</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Anthemis</i>	<i>Chamaepitys</i>
<i>Peonia</i>	<i>Passum</i>
<i>Erythrodanum</i>	<i>Glycyrrhiza</i>
<i>Chamaepitys</i>	<i>Iuncus odoratus</i>
<i>Pentaphyllon</i>	<i>Laurinum</i>
<i>Hyacinthus</i>	<i>Lac</i>
<i>Halicacabus</i>	<i>Lotus sativa</i>
<i>Chamaecissos</i>	<i>Men</i>
<i>Osyris</i>	<i>Pistacia</i>
<i>Myrtus sylvestris</i>	<i>Nardus Gallica</i>
<i>Elaterium</i>	<i>Nuclei pini</i>
<i>Vinum chamaedryte</i>	<i>Oleum amygdalarum</i>
<i>Vinum calaminthite</i>	<i>Palma elate</i>
<i>Vinum nardite</i>	<i>Portulaca</i>
<i>Sulphur.</i>	<i>Plantago</i>
<i>RENV M doloris</i>	<i>Porrum</i>
<i>remedia.</i>	<i>Petrofelinum</i>
<i>Amygdala amara</i>	<i>Peucedanum</i>
<i>Asparagus</i>	<i>Peonia</i>
<i>Anagallis</i>	<i>Rhaponticum</i>
<i>Agaricus</i>	<i>Saccharum</i>
<i>Anthyllis</i>	<i>Scandyx</i>
<i>Anchusa</i>	<i>Smyrnion</i>
<i>Halcyonium</i>	<i>Symphyton</i>
<i>Cardamomum</i>	<i>Stratiotes aquaticus</i>

INDEX

Tragacantha

Cordylon

Vrina

Vetonica

Vua passa

Vinum

Vinum cydonite

Vinum holosanthinum

Erinaceus terrestris

Fœniculus

Vinum absynthite

Vinum nardite

Vinum aromatite

Oleum baluninum.

RHAGADVM
remedia.

Pix

Lycium

Vitex

Gancri.

RHEVMATIS
mis utilia.

Acetum

Cupressus

Daphnoides

Ficus

Fex uini

Macer

Oleum oleastro

Ouum

Persica

Portulaca

Plantago

Staphis agria

Triticum

Vini qualitas

Vinum labruscæ

Vinum ex pyris

Vinum myrtite.

RIGINO S necantia.
Cedria.

RIGORES seu hor-
rores febrium ex-
cutientia.

Gleucinum

Piper

Panaces heracleon

Staphylinus

Vinum cedrite

Pyrethrum.

RIMARVM sedis
remedia.

Vide, Sedis rimarum.

ROSIONIS re-
media.

Lac schiston

EV R A T I V V S.

Peonia.

RVCTVM mouētia.

Mastiche

Rhaphanus

Anethum

Smyruion

Vinum daucite.

RVPTORVM

remedia.

Acorus

Cardamomum

Asarum

Calamus odoratus

Helenium

Bdellium

Iuniperus

Cedrides

Halimos

Lixiua ex ficu

Fel

Fimum

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Bulbus esculentus

Capparis

Rhaponticum

Gentiana

Aristolochia

Centaureum

Acantha

Leucacantha

Abrotonum

Origanum

Calamintha

Serpyllum

Baccharis

Panaces heracleon

Libanotis

Laserpitium

Sagapenum

Galbanum

Polycnemom

Chinopodion

Althæa

Cestron

Symphyton

Holosteum

Xyris

Hippuris

Heliochryson

Phlomidis

Ampelos leuce

Vinum daucite

Vinum tragoriganite

Vinum panacite

INDEX

Lapis schistos.

SAGITTAS infis-
xas extrahentia.

Vide, Spicula infixæ.

SALIVAM eno-
cantia.

Pyrethrum.

SALAMANDRAE
ueneni remedia.

Diosc. lib. 6. cap. 4.

SANGVINEM ex-
creantibus utilia.

Iuncus odoratus

Aspalathus

Thus in potu datum

Lentiscus

Mastiche potu data

Naphtha

Cupressus

Macer

Myrica

Hypocistis

Rosa

Lycium

Salix

Quercus

Palma

Malum punicum

Myrtus

Cichorium

Amygdalus amara

Ouum

Ceruinum cornu

Fimum

Coagulum

Triticum

Amylum

Portulaca

Plantago

Porrum

Erysimon

Agaricum

Aloe

Rhaponticum

Centaurium

Acantha leuce & Aræ

bica

Ferula

Althea

Cestron

Lysimachia

Symphytum

Polygonon mas

Symphytum alterum

Clymenon

Aethiopis

EV R A T I V V S.

Isopyrum	Serpyllum
Adiantum	Ruta
Vitis sativa	Cuminum sativum
Vua	Stæbe
Omphacium	Ferula
Vinum phœnicite	Clymenon
Corallium	Hippuris
Lapis hematites	Sideritis achilleos
Terra samia.	Pentaphyllon
SANGVINEM	Phoenix herba
sistentia.	Astragalus
Thus	Lichen in petris
Cupressus	Idea radix
Galla	Gallion
Persea	Stratiotes terrestris
Coclea terrestres	Vua cenanthe
Rane	Acetum
Araneus	Vinum terebinthinum
Ouum	Plumbum elotum
Coagulum	Stimmi
Sanguis	Cinnabaris
Fimum	Alumen
Faba	Sulphur
Plantago	Spongie
Porrum	Gypsum.
Isatis	SANGVINEM cō-
Eleisphacos	cretum discutientia.
Mentha	Lixivia ex ficu

I N D E X

Thymus

Heliochryson.

SANGVINEN per
urinam expellentia.

Eruum

Cantharides

Ammoniacum.

SANGVINEM per
nares expellentia.

Crocodilium.

SANGVINEM per
urinam reddentium
remedia.

Cuminum sylvestre.

SANGVISVGAS
necantia.

Oxalme

Diosc. lib. 6. cap. 32.

SANDARACHAE
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 29.

SARDONIAE
curatio.

Diosc. lib. 7. cap. 14.

SCABIE M iumen =
torum emendantia.

Vide, Iumentorum sca-
biem,

SCABIE morbi
remedia.

Argemone prima

Chamaeleon niger

Helleborus niger

Oesypum

Oleum oleastri

Sinapi

Sulphur

Vnguentum melinum.

SCOLOPEN-
dra morsus remedia.

Grossi

Scolopendra

Asphodelus

Sal.

Dioscorides libro. 6. ca-
pit. 59.

SCORPIONIS
ictus remedia.

Cyperus

Amomum

Cardamomum

Cinnamomum

Daphnoides

Myrtus

Ficus

Gancri

CURATIVVS.

Scorpius terrestris

Smarides

Mullus piscis

Locusta

Lacerta

Mures domestici

Fimum

Lapathum

Sonchos

Seris

Lactuca sylvestris

Ocymum

Abrotonum

Sampsuchum

Hieracium maius

Delphinion

Laserpitium

Atractilis

Lychnis utraq;

Millefolium

Phalangium

Polemonia

Chamaesyce

Heliotropium

Scorpioides

Aqua maris

Vinum tethalassome =

num

Vinum cydonite

Sulphur

Sal

Lapis sapphirus.

Diosc. lib. 6. cap. 60.

SCORPIONES

necantia.

Cancr.

SCORPIONIS

marini ictus reme

dia.

Vrina

Asphodelus

Plumbum syncerum &

crematum

Sulphur.

Diosc. lib. 6. cap. 61.

SCORPIONES

torpefacientia.

Delphinion

Lychnis sylvestris

Lens palustris.

SECVNDINAS

trahentia.

Balsamum

Sampsuchinum

Abrotonum

Picea

Sch 5708

INDEX

Fiber	Lens	Libanotis
Iecur mergi	Symphyton	
Linum	Erigeron	
Aristolochia tertia	SEDIS morbi res	
Thymus	media.	
Pulegium	Thus	
Prasium	Lentiscus	
Stachys	Pix	Rosa
Artemisia	Amurca	
Oenanthe	Malum punicum	
Hemerocallis	Myrtus	
Erythrodanum	Cancris	
Anagyris	Ouum	
Myrtus	Oesypum	
Adiantum	Adeps	Fel
Ampelos leuce	Iens	
Vinum dictamnite.	Malua	
SEDIS rimarum	Althea	
remedia.	Portulaca	
Strigmenta balneo	Sonchos	
rum	Anagallis	
Men	Aloe	Melilotus
Dipsacos	Laserpitium	
Leucoion.	Aster atticus	
SEDIS inflammatio	Viola purpurea	
nis remedia.	Cucumis anguinus	
Oleum cicinum	Colocynthis	
Amaracinum	Acetum	

C V R A T I V V S.

Oxalme.	Rhaponticum
Vinum terebinthium	Aristolochia tertia.
Flos aris	Origanum sylvestre
Plumbum elotum,	Baccharis
SEMINA que peris-	Ruta
munt.	Phlomos, siue uerba-
Diosc. lib. 6. in pæfat.	scum
SENSIBVS nocetia	Panaces chironium
Vinum annosum.	Staphylinus
SENSVS recreantia.	Smyrnion
Lapis Samius.	Aparine
SEPIS bestiole mor-	Chamedrys
sus remedia.	Lychnis sativa, siue coro-
Portulaca	naria
Oxymel.	Erythrodanum siue Ru-
SERPENTIVM	bia
uenenis contraria.	Sparganion
Paliurus	Polygonon mas
Vitex	Clematis daphnoides
Cancri	Polemonia
Hippopotamus	Anchusa
Fiber	Ocimoides
Mustela	Hyacinthus
Gallinaceus	Mandragoras
Cantharides	Nerion
Chondrylla	Adiantum.
Nasturtium	SERPENTES
Dracunculus	fugantia.
Asphodelus	

I N D E X

Iuniperus
Cornu ceruinum
Adeps
Nasturtium
Dracunculus maior
Abrotonum
Origanum
Calamintha
Pencedanum
Melanthion
Galbanum
Polium
Oenanthe
Lysimachia
Aster Atticus
Vinum conixite
Lapis gagates.

S E R P E N T I V M

morsus remedia.

Iris Illirica
Asarum
Cinnamomum
Balsamum
Pix
Iuniperus
Platanus
Erica
Pistacia

Naphtha

Glandes

Ficus Aegyptia
Pastinaca piscis
Rana
Gobius
Fel
Omotarichos
Fimum
Marinus pulmo
Mel
Eruum
Dictamnus
Rhaphanus
Agaricum
Brassica sativa
Cyclaminos
Ampeloprason
Dracunculus minor
Asphodelus
Anagallis
Acantha leuce
Abrotonum
Asclepias
Origanum
Lilium
Calamintha
Clinopodium
Serpyllum
Leontopetalon

CURATIVVS.

Lanaces heracleon &	Oxymeli
asclepion	Vinum confixite
Cuminum satium &	Vinum panacite
syluestre	Sal Cinis uitis
Ammi	Lapis ophites.
Fœniculum	SERPENTES ne
Daucus	feriant.
Libanotis	(erui medulla.
Sagapenor	SERPENTES ne
Prasion	cantia.
Phyllitis	Anchusa onocheles
Trifolium	Vinum cedrite.
Scordion	SICCANTES
Cestron	medicine.
Periclymenos	Ammi
Echion	Bromos
Ocymoides, siue ocy-	Cistos
mastrum	Cuminum satium
Rubus	Ebulus
Eupatorium	Aes ustum
Heliochryson	Arena litoris
Adiantum	Libanotis
Peristereon supinus	Mentha
Ebulus	Pompholyx
Ampelos leuce	Spodium
Vitis sativa	Rubus
Vinum	Terra Chia
Acetum	Rubrica synopsis

Fex vini	Vide, Taxo contraria.
Diphryges.	SOMNIFERAE
SINGULTUM	medicinæ.
pellentia.	Amygdala amara
Fiber	Halicacabus, siue solas-
Sisymbrium	num uesticarum.
Rhaponticum	Anisum
Mentha	Amomum
Aristolochia tertia	Cistos tertia, siue la-
Anethum	danum
Cuminum sylvestre	Baccharis
Alysson	Dorycnion
Asplenon	Hyoscyamus
Clymenon	Lactuca
Saxifragum.	Iris Illyrica
SIRIASIS re-	Opium
media.	Mandragoras
Cucurbita	Papauer rhæas, siue sa-
Pepo	tium
Heliotropium maius.	Porrum
SITIM generantia.	Styrax
Cape	Smilax hortensis
Allium	Strychnon hypnoticon
Capparis	siue solanum somnifi-
Vini qualitas.	cum
SITIM extinguentia.	Vitex
Glycyrrhiza	Vinum nouum
Symphytum.	Lapis memphiter.
SMILACI contraria.	

CURATIVVS.

SOMNVM discus-
tientia.

Sphondylium

Peucedanum.

SOMNIA imaginosa
& mala inducentia.

Faba

Lens

Pygnoكوم

Smilax levis.

SORDES purgātia.

Irinum

Cortex thuris

Sabina.

SPASTICORVM
remedia.

Fiber.

SPASMI remedia.

Vide, Convulsiois reme-
dia.

SPIRITVM id est,
flatum generantia.

Gentiana.

SPIRANTIBVS
difficulter utilia.

Vide, Orthopnoicis.

SPIRITVS discurs-
rentes coercentia.

Bdellium.

SPIRANTIBVS

uitam auferentia.

Cedria.

SPICVLA infixa cor-
pori extrahentia.

Anagallis

Harundo

Aristolochia

Dictamnus

Propolis

Narcissus

Oxyacantha

Silurus

Triticum

Tragion

Xyphion

Xyris

Lacerta.

SPISSANDI vim
habentia.

Acacia

Malus

Cotonea

Malum sylvestre

Amydalus amara

Baccharis

Britannica

Polygonon mas & fo-

INDEX

mina

Clymenon

Medion

Rubus

Helxine

Idea radix

Hippuris

Psyllium

Bryon thalassium

Potamo geton

Acetum

Vinum Hadrianum

Aerugo aurificum

Vinum nigrum labrus-
sca

Vinum Tyburtinum

Cadmia

Pompholyx

Squama eris

Pumex -

Corallium

Rubrica sinopis

Lapis hematites.

SPLENETICIS

utilia.

Vide, Lienis morbi reme-
dia.

SPVMAE argenti

contraria.

Vinum in commune.

SQVAMAS ossium
extrahentia.

Aristolochia tertia

Peucedanum.

STAPHYLOMA
tis remedia.

Palma Thebaica

Lapis schistos

Lapis sapphiros.

STERNVT A-
mentum mouen-

tia.

Iris Illyrica

Fiber

Sinapi

Ptarmice

Struthion

Batrachion

Daphnoides

Helleborus albus.

STERILES foemis
nas facientia.

Vide, Generationem de-
primentia.

STIGMATVM
remedia.

Batrachion

Mandragora.

Mandragora.

Aqua maris

STOMACO CON

Vinum tethalassome =
num.

traria .

Terebinthina

STOMACHI mor
bi remedia.

Cedrides

Melimela

Mew

Pruna

Nardi spica

Arbutus

Nardum Gallicum

Iuglans

Malabathrum

Auellana

Iuncus odoratus

Ficus

Agallochum

Hordeum

Helenium

Lens

Oleum balaninum

Malua

Mastichinum

Porrum

Vnguentum rosaceum

Brassica satina & mac
rina

Susinum

Cape

Nuclei pini

Nasturtium

Mastiche

Capparis

Cupressus

Absynthium

Juniperus

Absynthiū seriphium

Laurus

Balanus myrsica

Populus nigra

Vua

Rosa

Thymelæa

Oline colymbades

Ebulus

Palma

Prasium

Palma elate

Galbanum

Malum punicum

Silique

Myrtus	Portulaca
Cotonea	Sonchos
Mala Epirotica	Seris
Armeniaca	Cucumis
Mespilus	Lotus Lactuca
Pruna	Gingidium
Amygdale dulces	Scandyx
Pistacia	Aphace
Iuglans	Ampeloprason
Morus	Allium
Persea	Zingiber
Ficus Aegyptia	Scilla
Ionia	Bulbus esculentus
Cochlea terrestres	Agaricum
Ouum	Rhaponticum
Lac	Gentiana
Lac humanum	Acantha leuce
Caseus	Aloe
Lana succida	Absynthium
Oryza	Mentha
Lyncurion	Tragoriganum
Saccharon	Pulegium
Faba Aegyptia	Melilotus
Sifer	Ligusticum
Lupinum sativum	Caros Anethum
Lapathum	Cuminum sylvestre
Lampsana	Hieracium maius
Brassica sativa	Apium

C V R A T I V V S.

Petroselinum	Vinum omphacite
Smyrnion	Vinum nigrum ex labru
Fœniculus	sca floribus
Scordion	Vinum melitite
Artemisia	Vinum scilliticum
Nymphaea	Paonia Vinum cydonite
Cestron	Vinum apÿte
Polygonon mas	Vinum anethinum
Rubus	Vinum rhoite
Strychnon sativum	Vinum myrtite
Cotyledon prima	Vinum terebinthi
Erigeron	num
Adiantum	Vinum phœnicite
Aster Atticus	Vinum absynthite
Viola purpurea	Vinum bunite.
Chamedaphne	Vinum dictamnite
Colocynthis	Vinum calaminthite
Vitis samia	Vinum aromatite
Nuclei acinorum	Vinum nectarite
Vua cenanthe	Vinum nardite
Omphacium	Vinum ex sylvestri nara
Vini qualitas	do
Phalerum	Vinum selenite
Hydromel	Ferrum
Thymoxalme	Flos salis
Ompa comeli	Fax uini
Vinum	Lapis alabastrites
Vinum Surrentinum	Lapis Samius.

INDEX

STRUMAE GVT Pseudobunion

turis remedia.

Adiantum

Iris Illyrica

Teste siue terra fornacum

Grossi

STRANGULA

Vipera

tus remedia.

Mustela

Vnguis asini

Irinum

Fimum

Absynthium.

Hordeum

STRANGURIAE

Lolium

morbi remedia.

Fabe

Lens

Aspalathus

Lupinum satium

Cedrides

Lapathum

Locusta

Andrachne, siue portulaca sylvestris

Asparagus

Sisymbrium

Plantago

Medica

Piper

Panaces heracleon

Capparis

Seseli Massiliense

Argemone

Hipposechnon

Coriandrum

Hippomarathon

Eibanotis

Polycnemom

Laserpitium

Climopodium

Aparine

Oenanthe

Millefolium

Conixa

Scordion

Asplenon

Lithospermon

Cape

Cotyledon prima

Onobrychis

Galioysis

Polygonon mas

C V R A T I V V S .

Saxifragon	SVDORES EVO
Xyris	cantia.
Laurus Alexandrina	Metopium unguentum
Tragion	Smyrnion
Pseudobunion	Pyrethrum
Adiantum.	Onobrychis
STYPICAE ME=	Flos salis
dicina .	Anchusa
Vide , Adstrictoria me=	Lycopsis.
dicina.	SVES necantia.
SVCCI qui perimūt.	Chamaeleon albus.
Dioscorides libro . 6 . in	SVFFVSIONVM
præfat.	morbi remedia.
SVDOREM DE=	Fel
primentia .	Sanguis
Oleum	Sagapenum
Oleum omphacinum	Euphorbium
Oleum oleastri	Chamaesyce
Myrteum	Harena litoris.
Lentiscinum	SVGILLATORVM
Anguentum melinum	remedia .
Rhodides	Acetum
Myrtus	Sal.
Bulbus esculentus	SUPERCILIO=
Vinum myrsinite	rum raritati utilia.
Sulphur	Picea.
Gypsum	SVPERCILIIS
Terra samia.	glabris utilia.
	Fuligo resina.
	SVPPVRATIO=

INDEX

nis tuberculorum
remedia.

Crocomagna

Palimpissa.

S V P P V R A T I O =
num remedia.

Ficus Aegyptia

Mel Hordeum

Lolium

Cucurbita

Ligusticum

Smyrnion

Althea

Mandragoras

Vrtica

Narcissus

Ampelos leuce

Diphryges.

S V S P I R I O S O =
rum remedia.

Canchamum

Cyphi

Oleum amygdalarum

Pix

Ficus

Vulpinus pulmo

Eruum

Plantago

Agaricum

Rhaponticum

Aristolochia tertia

Hyssopum

Thymus

Acinos

Ruta

Galbanum

Ammoniacum

Prasium

Parthenium

Anagyris

Adiantum Thapsia

Ampelos leuce

Vinum passite

Vinum hyssopite.

T A B I D I corporis
remedia.

Vide, Phthysicorum re-
media.

T A B E S C E N T I =
bus utilia.

Daphnoides.

Vinum strobilite.

T A X O contraria.

Vinum in commune

Acetum.

Diosc. lib. 6. cap. 12.

CURATIVVS.

TELA infixa corpori= bus extrahentia.	Melilotos
Vide, Spicula infixa.	Ruta
TENASMI morbi remedia.	Cuminum
Lac schiston	Lilium
Pænogracum	Hyoscyamus
Linum	Erigeron
Eruum	Vua passa Sal
TEREDINEM sentientia.	Geodes lapis
Ficus Aegyptia	Terra samia
Hyoscyamus.	Cimolia.
TEREDINEM nō sentientia.	THAPSIAE contraria.
Tilia.	Diosc. lib. 6. in præfat.
Herm. Cor. cap. 133.	& cap. 33.
TEREDINEM necantia.	THERIACAM ingredientia.
Sal.	Rapa sativa
TESTIVM mor= bi remedia.	Zingiber
Vitex	Dictamnus
Myrtus	Apium
Cicer	THERIOMA= tum remedia.
Faba	Lupinum sativum
Erysimon	Elelisphacos.
Asphodelus	THORACIS re= media.
	Cerebrum gallinacei
	Glycyrrhiza.

INDEX

THYMOS AB-	Bryon thalassion
sumentia.	Pteris
Smaris	Fimum Thelypteris
Thymus	Ruta Vinum cedrite
Heliotropium maius	Chalcanthum
Vitis sativa	Sal. Anchusa tertia.
TIBIARVM VL-	TINEA S rotundae
cerum remedia.	generantia.
Hydropiper	Triticum.
Ampelos leuce.	TINEA S necantia.
TINEA S LATAS	Absynthium seriphion
pellentia.	Mentha
Cardamomum	Heliotropium minus
Costum	Cedria
Malicorium	Aizoon maius.
Melimela	TINELS contraria.
Iuglans	Morus Citria.
Heliotropium minus	TONSILLARVM
Vinum absynthite	morbi remedia.
Lupinum sativum	Pix
Brassica sativa	Cedria
Portulaca	Lycium
Chamaeleon albus	Pruna
Hyssopum	Morus
Calamintha	Ficus
Thymus	Hirundines
Coriandrum	Ruta Lac schiston
Melilotum	Mel
	Aloe
	Simapi

C V R A T I V V S.

Origanum		Sisymbrium	
Britannica		Piper	Scilla
Periclymenos		Agaricum	
Helxine		Rhaponticum	
Peristereon supinus		Centaurium maius	
Omphacium		Eryngion	
Vinum myrsinite		Calamintha	
Flos aris		Serpyllum	
Alumen	Sal.	Sampsuchus	Ruta
TORMINIS	res	Panaces heracleon	
media.		Acetum	
Iris Illyrica.		Cuminum sativum	
Acorus	Meu	Seseli Massiliense	
Cardamomum		Cuminum sylvestre	
Balsamum		Elaphoboscon	
Agallochum		Petroselinum	
Oleum		Daucus	
Iuniperus		Libanotis	
Halimos		Ferula	
Iuglans		Peucedanum	
Ficus		Asclepias	
Fiber		Melissophyllon	
Talus suis		Phalangion	
Triticum		Coniza	
Milium		Alisma	
Panicum		Chamaepitys	
Eruum		Cramen	
Atriplex		Pseudobunion	

INDEX

Chamedaphne

Vinum scillite

Vinum cedrite

Vinum hyssopite

Vinum tragoriganite

Vinum panacite

Aphronitrum

Et in uerbo, Dysentericorum remedia.

TORPORIS remedia.

Fagus.

TORSIONIS remedia.

Tragoriganum.

TOXICO contraria.

Glandes

Sanguis.

TREMOREM excutientia.

Vnguentum cinnamominum.

TREMORIS remedia.

Lepus terrestris.

TVBERCVLOSIS remedia.

Strigmenta gymnastorum

Morus

Cape

Asphodelus

Panaces Asclepion

Laserpitium

Viscum

Thapsia

Mandragoras

Ephemerum

Cucumis anguinus

Vrtica

Aerugo aurificum

Lapis Asius

Terra cimolia.

TVBERA extenuantia.

Triticum

Leontopodium

Scammonia

Vinum nigrum è labrusca.

TVMORVM remedia.

Anagyris

Platanus

Fagus

Ilex

Hordeum

Adeps

Faba

CURATIVVS.

Brassica sativa & syl-	Phlomis
uestris	Cucumis anguinus
Cucurbita	Thapsia
Nasturtium	Chamaesyce
Hydropiper	Pygnochomum
Bulbus esculentus	Aqua maris
Isatis	Indicus lapis
Chamaeleon	Fex vini
Tragoriganum	Spongia.
Sampsuchum	TVSSIS remedia.
Ligusticum	Amygdala amara
Daucus	Asphodelus
Libanotis	Apium satium
Melanthion	Bdellium
Orchis serapias	Bromos
Orminum	Cinnamomum
Buphthalmus	Calamus odoratus
Cannabis syluatica	Cupressus
Polygonon mas	Cedrides
Lagopus	Cistos
Helxine	Cacalia
Pentaphyllon	Chamaedrys
Peristereon supinus	Tragacantha
Hyoscyamus	Dracunculus
Psyllium	Faba
Xanthium	Helenium
Sesamoides	Hippuris
Ephemeron	Hyoscyamus
	Iris Illyrica
	Lycium
	Laserpitium
	Mel

I N D E X

Melicratum		Centaurium maius	
Origanum	Pix	Baccharis	
Paliurus	Piper	Seseli Maßiliense	
Peucedanum		Daucus	
Prasium		Sagapenon Galbanum	
Papauer satium		Scordion	
Ruta	Styrax	Bechion	
Struthion		Helxine	
Smyrnion		Phlomidis	
Sulphur		Acetum	
Triticum		Vinum hyssopite	
Tragoriganum		Sandaracha.	
Terebinthina		V AROS purgans	
Vua passa.		tia.	
TVSSIS ueteris		Oleum balaninum.	
remedia.		Myrrha	
Asarum		Lacerta	Linum
Myrrha		Porrum	Cape
Nuclei pini		Bulbus esculentus	
Mastiche		Pulegium	
Naphtha		Balanus myrepfica	
Cerasia		Cici	Sory.
Amygdala amara		Ampelos leuce.	
Auellana		V ARICES sanans	
Allium		tia.	
Ficus	Propolis	Cirsion.	
Rhaphanus		V ENEFICIIS	
Scilla	Hyssopus	medetur.	

C V R A T I V V S.

Scilla.		Orminum	
VENEREM cum uo-		Xiphium	
luptate expe-		Vrtica	Caliopsis.
dientia.		VENENATA	
Laurus Alexandrina.		fugantia.	
VENEREM co-		Vitex	
hibentia		Dictamnus.	
Portulaca		VENAS excitantia.	
Lactuca		Vinum Phalernum.	
Lactuca syluestris.		VENTRIS anima-	
VENEREM sti-		lia expellentia.	
mulantia.		Vide, Tineas latas.	
Costum	Crocum	VENTREM sol-	
Mastiche		uentia.	
Linum		Vide, Aluum soluentia.	
Rapa satina		VENENATO-	
Sifer	Eruca	rum ictus re-	
Porrum	Cape	dia.	
Nasturtium		Cardamomum	
Dracunculus maior		Nardum gallicum	
Dracunculus minor		Helenium	
Bulbus esculentus		Cinnamomum	
Mentha		Bdellium	Vitex
Staphylinus		Ficus	Propolis
Anisum	Orchis	Rhaphanus	Triticum
Orchis serapias		Eryngium	
Satyrium		Cuminum syluestre	
Satyrium alterum		Althaea	Tribulus

I N D E X

Passum

Smilax aspera

Aqua maris

Acetum.

VENENORVM

remedia.

Cinnamomum

Oleum

Paliurus

Olea Aethiopica

Iuglans

Lixivia ex ficu

Lepus terrestris

Fiber

Sanguis

Rapa sativa

Malua

Erysimum

Agaricum

Aristolochia secunda

Abrotonum

Ruta

Elaeagnus

Leucas

Polium

Pentaphyllum

Colchicum

Epipactis

Passum

Linum gypsatum

Rubrica lemnia

Terra samia.

VERMIBVS

contraria.

Cedria.

VERRVCAS

tollentia.

Batrachion

Clinopodium

Characias

Chamaesyce *Dipsacus*

Ficus *Grosb.*

Cicer *Lacerta*

Heliotropium

Fimum

Staphis agria

Scilla *Thymus.*

VERTIGINIS

morbi remedia.

Balsamum

Lac humanum

Peucedanum

Galbanum

Ampelos leuce

Ampelos melana

Acetum scilliticum

CURATIVVS.

Vinum scilliticum.	Lotus sylvestris	
VERTIGINEM	Plantago	Vua passa
adgenerantia.	Cucumis	
Cardamomum	Scandyx	Passum
Balsamum	Ochra	Porrum
Hyoscyamus	Bulbus uomitius	
Mandragoras	Rhaponticum	
Falernum	Glycyrrhiza	
Vinum rhetinite	Tragacantha	
Mandragorite	Panaces heracleon	
Aconitum	Cicuta.	Petroselinum
VESICAE morbi	Smyrnion	
remedia.	Peucedanum	
Mentha	Fœniculus	
Nardum Gallicum	Nymphaea	
Nuclei pini	Anthemis	Pœonia
Cupressus	Phalaris	
Laurus	Palma	Cepe
Palma etate		Halcyonium
Myrtus	Lac	Cestron
Ficus	Onum	Vinum terebinthinum
Cochleæ terrestres		Vinum scilliticum
Cicade	Napum	Vinum aromatite
Ceruinum cornu		Vinum halosanthite
Saccharum		Lapis morechibus.
Gramen	Malua	VESPARVM ictus
Hippuris		remedia.
Portulaca	Laurus	Malua

INDEX

Sisymbrium.

VESTIBVS ne

animalia no-

ceant.

Absynthium

Heliochryses.

VIBICES plaga-

rum emendan-

tia.

Susinum.

VIPERAE morsus

remedia.

Casia

Costum

Iuniperus

Macer

Fraxinus

Vrina

Caries lignorum

Triticum

Eruum

Ferula

Anchusa

Onocheles

Ocimoides

Dioscorides libro. 6. ca-

pit. 63.

Herm. Coroll. cap. 721.

VIRIVM infirmita-

tes roborantia.

Nuclei pini.

VISCO contraria.

Vinum in communi

Acetum

Vinum Absynthite

Diosco. lib. 6. cap. 21.

VISCERVUM mor-

bi remedia.

Thus.

VITILIGINIS

remedia.

Daphnoides

Myrtus

Ficus

Grossi

Cochlea terrestres

Lepus terrestris

Sepia

Faba

Beta

Lupinum satium

Chondrylla

Cepa

Allium

Piper

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Capparis

Argemone

Gentiana

Telephion

Ruta

Chamaeleon niger

Libanotis

Lilium

Nymphaea

C V R A T I V V S.

Nymphaea Cicuta VOCEM claram
Erythrodanum reddentia.

Helleborum nigrum Myrrha
Cucumis anguinus Styra Silurus.

Balanus myrseica VOLVPTATES
Narcissus animi auge
Sulphur scentia.

Halcyonium Buglossum.
Terra melia. VOLVCRVM mor
sus remedia.

VITRA fracta con
glutinantia.

Herm. Cor. cap. 254.

VMBILICIRE

lecur aprinum.
VOMITIONES

media.

Irinum Laurus

Lapis magnes.

Coclea terrestres

VNGVIBVS utilia.

Omotarichos

Pix Cupressus

Blatta Pepo

Daphnoides

Asphodelus

Olea Oryza

Capparis

Linum Lapathum

Bulbus vomitorius

Bulbus esculentus

Origanum

Batrachion

Cestrum

Chelidonium minus

Anagyris semen

Viscum Vua passa

Papauer spumeum

Sandaracha

Mandragoras

Alumen

Daphnoides

Sulphur

Helleborus albus

Fex nini.

Elaterion Silybon

I N D E X

Balanus myrepfica

Diosc. lib. 6. in prefat.

Narcissus

Cici

VRINAE harenosae & asperae re

Melicraturum

media.

Aes ystum

Chrysocolla

Papauer ceratitis.

Rubrica lemnia.

VRINAM cruentam mouentia.

VOMITIONES

cohibentia

Clymenon.

Atriplex

Acetum

VRINAM ar-

Apium

Faba

cessentia.

Mentha

Eruum Galbanum.

Eupatorium.

VRINAM mo-

VOMICAE mor-

uentia.

bi remedia.

Acorus

Mentha

Paulurus

Thlaspi

Cyperus

Struthion

Eryngion

Cardamomum

Bechion

Psyllion

Nardi spica

Mandragora

Nardum Gallicum

Acetum.

Asarum

Phu

VRENDI uim

habentia.

Malabathron

Misy

Melanteria.

Casia

VRENDINEM

Cinnamomum

facientia.

Costum

Trifolium.

Iuncus odoratus

VRINAE difficul-

Calamus odoratus

tatem generan-

Balsamum

tia.

Crocum

Crocomagna

C V R A T I V V S.

Helenium		Panicum	
Oleum amygdalinum		Cicer	Eruum
Vnguentum melinum		Rapa sativa	
Susinum		Rhaphanus	
Irinum		Raphanus agria	
Amaracinum		Sifer	Bunio
Bdellium		Brassica sativa	
Picea	Nuclei pini	Asparagus	
Lentiscus	Resina	Sisymbrium aquati-	
Terebinthus		cum	
Cupressus		Crithmon	
Iuniperus		Cucumis	Pepo
Populus alba		Lactuca	
Paliurus	Tilia	Gingidium	
Olea Aethiopica		Caucalis	Eruca
Glandes	Myrtus	Ocymum	
Palma elate		Smilax hortensis	
Siliqua	Cotonea	Porrum	
Mala Epirotica		Ampeloprasen	
Cornus		Cepa	Allium
Amygdala dulces		Piper	
Erinaceus marinus		Struthion	
Cimices lecti		Dracunculus	
Oves	Buprestis	Asphodelus	
Vermes terreni		Scilla	Capparis
Mel	Hordeum	Agaricum	
Zythum		Crocodilion	
Milium		Centaurium maius	

I N D E X

Chameleon albus		Anthemis	
Acantha leuce		Lithosperma	
Acantha	Anonis	Erythrodanum	
Eryngion		Lonchitis	Althæa
Abfynthium		Hypericon	
Abrotonum		Choris	
Tragoriganum		Chamæpitys	
Eleliphacos		Cestron	
Thymus		Polygonon mas	
Serpyllum		Polemonia	
Baccharis		Saxifragon	
Ruta	Moly	Xyris	Gramen
Ligusticum		Gramen parnasium	
Staphylinus		Phœnix herba	
Tordylon		Hippuris	
Sifum	Anifum	Oxyfœnos	
Caros Anethum		Heliocryfos	
Cyminum fylueftre		Astragalus	
Opium		Hyacinthus	
Oreofelinum		Papauer rhœas	
Petrofelinum		Strychnon hypnoticon	
Daucus	Libanotis	Cotyledon prima	
Melanthion		Vrtica	Arction
Ammoniacum		Vinum Lesbion	
Chamedris		Hydromel	
Trifolium	Scordion	Melicratum	
Androfaces		Vinum rhetinite	
Anthyllis		Vinum catorchite	

C V R A T I V V S.

Vinum è cedro	Omphacium
Vinum è lauro	Acetum
Vinum absynthite	Flos æris
Vinum calaminthite	Alumen Sal.
Vinum aromatite	VVL P E S necantia.
Vinum nectarite	Apocynon.
Vinum nardite	VVL N E R V M re=
Vinum asarite	media.
Vinum sylvestris nardi	Amurca
Vinum daucite	Allium
Vinum acorite	Argemone
Halcyonium	Aristolochia
Lapis hæmatites	Aloe Anthyllis
Lapis Iudaicus	Althæa
Corallium	Androsæmon
Vinum chamæpyteos.	Lycopsis Acetum
VRTICAE her=	Butyrum
be pruritus re=	Brassica
media.	Ceccus
Herm. Cor. cap. 707.	Chamæpitys
VSTIS utilia.	Centaurion
Vrtica siue acalyphe.	Cyclaminos
VVAE faucium	Cytinus
remedia.	Cupressus
Pix Galla	Dracunculus
Pruna	Dictamnus
Hirundines	Aerugo nuriscum
Vrtica	Oenanthe

I N D E X

Ficus Aegyptia

Fimum

Gentiana

Glycyrrhiza

Glutinum

Hippuris

Isatis

Lana succida

Ligusticum

Lilium

Lysimachion

Minium sinopicum

Myriophyllon

Picea

Palma

Portulaca

Porrum

Polycnemon

Polium

Polygonon mas

Polygonatum

Pentaphyllum

Phoenix herba

Pteris

Peristereon

Papauer

Plumbum clotum

Scordion

Symphyton

Sideritis

Stratiotes aquaticus

Spongia

Cochlea terrestres

Thus

Terra eretria

Vinum

Vinum œnanthe

Vnguentum citrinum

Vlmus

Vitex.

VVLVAE mulie-
ris remedia.

Meu

Cyperus

Nardi spica

Casia

Costum

Iuncus odoratus

Balsamum

Bryon

Nacaphthum

Oleum amygdalinum

Mastichinum

Vnguentum rosaceum

Melinum

Sampsuchinum


C V R A T I V V S.

Abrotoninum	Iuglans
Susinum	Cimices lecti
Narcissinum	Lac schiston
Crocium	Butyrum
Irinum	Oesypum
Gleucinum	Coagulum
Amaracinum	Adeps
Metopium	Fœnogrecum
Cinnamomum	Pinum
Myrrha	Malua
Styrax	Portulaca
Bdellium	Plantago
Lentiscus	Sonchos
Pix	Porrum
Naphtha	Sinapi
Iuniperus	Piper
Laurus	Agaricum
Myrica	Rhaponticum
Cistos	Pulegium
Rosa	Centaurium minus
Lycium	Melilotus
Acacia	Ruta
Amurca	Panaces heracleon
Vitex	Ammi
Galla	Sphondylion
Palma elate	Peucedanum
Myrtus	Sagapenum
Cotonea	Galbanum

I N D E X

<i>Asclepias</i>	<i>Vinum picatum, siue pis</i>
<i>Lilium</i>	<i>site</i>
<i>Circea</i>	<i>Vinum chamaedryte</i>
<i>Arthemisia</i>	<i>Vinum daucite</i>
<i>Geranion</i>	<i>Vinum helleborite</i>
<i>Anthyllis</i>	<i>Lapis gagates</i>
<i>Parthenion</i>	<i>Peristereon rectus</i>
<i>Paeonia</i>	<i>Hyoscyamus</i>
<i>Cestron</i>	<i>Mandragoras</i>
<i>Clematis daphnoides</i>	<i>Ebulus</i>
<i>Chrysocome</i>	<i>Ampelos leuce</i>
<i>Ageraton</i>	<i>Acetum</i>
<i>Vinum terebinthinum</i>	<i>Acetum scilliticum.</i>
<i>Vinum cedrite</i>	

I N D I C I S C V R A T I V I
F I N I S.



Sig & Polmonaria

Polmonaria - m. p. s.

Senbiose

Cal. - Ve.

Wronige

Nahrung mid sig

Lise rase

-5. Zentium

3 5

3 13

anion - yin

gastul

u - fir

Comun

Expre

er eine expressa Jure
Adde

Sein Cantin. L. j.
zur 15
von 15







Handwritten text, possibly a signature or name, written in cursive script across the top of the page.

